

504C
1884—1885.

№ 59.

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

HAUPT-PREIS-VERZEICHNISS

von

L. SPÄTH

BAUMSCHULE

bei Rixdorf - Berlin.

Gegründet i. J. 1758
durch C. F. Späth

Verkaufs-Bedingungen.

Man versteht sich in Reichswährung, 1 Mark (M) = 100 Pfennig (P). Ausländisches Gold und zum Tageskurse in Zahlung genommen.

Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen

unbekannte Besteller ersuche ich, *ihren werthen Aufträgen den Betrag*, einschliesslich *beizufügen*, oder mir *Nachnahme zu gestatten*, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht *angegangen* — ohne Berücksichtigung und bei kleineren bis zum Werthe von 20 Mark wird *keine besondere Ermächtigung*, dem Gute nachgenommen.

Bei Geldsendungen bitte ich zu *frankiren*.

Bei einzelnen Sorten bei der Ausführung eines Auftrags *bereits vergriffen sein*, so werde ich *möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben* zu *nicht besonders verboten* wird.

Bei ausnahmsweise starken Exemplaren tritt eine entsprechende *Preiserhöhung* ein. *Bei ähnlichem Aussuchen* der Pflanzen *in der Baumschule* durch den Besteller haben die *Angaben keine Gültigkeit*.

Die Preise des Cataloges werden von 25 Stück, die Tausend-Preise von 1000 Stück.

Die Verpackung, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die *Versendung geschieht auf Rechnung und Gefahr der Besteller* und kann ich für *Verzögerungen des Transportes*, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen *Reklamationen* nicht an mich, sondern an die *Speditoren Eisenbahnverwaltungen* etc. zu richten.

Ich bitte dringend, die Art des Transportes (*ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.*) anzugeben, sowie die *letzte Eisenbahn- oder Poststation* gefälligst zu vermerken und den *Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben*.

Etwas Reklamationen, welche nicht *sofort nach Empfang* der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Bemerkungen.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem dazu gut geeigneten Sandboden sehr leicht in jeder anderen Bodenart fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner bei Rixdorf-Berlin belegenen Baumschule, die *125 Hektar oder 500 preuss. Morgen* umfasst, machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen.

Die *Versendung beginnt* nach den ersten stärkeren Nachtrüsten, gewöhnlich *Anfangs October*, und dauert bis *gegen Ende April*. Bei Eintritt der stärkeren Fröste unterbreche ich die Expedition bis zum März, wenn sie nicht etwa speciell gewünscht wird.

Da im Frühjahr die *Versandzeit* oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen *möglichst im Herbst* zu machen. Uebrigens ist die *Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten, trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen* und wird noch lange nicht genug angewandt. Eine Ausnahme machen nur die immergrünen Gehölze, deren *beste Verpflanzzeit der Spätsommer* ist und der Zeitpunkt, in dem sie im Frühjahr zu treiben beginnen, also *Mitte April bis Mitte Mai* in unserem Klima.

Sollten Bäume oder Sträucher *in gefrorenem Zustande ankommen*, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder welk geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Adresse.

Am 1. October 1884 verlege ich mein Comptoir von Berlin nach der Baumschule und werden von derselben Zeit ab Briefe und Postsendungen nach „Späth's Baumschule“ nicht mehr, wie bisher, von Britz, sondern von Rixdorf-Berlin aus bestellt werden. Ich bitte daher dringend, um erhebliche Verzögerungen bei der Bestellung zu vermeiden, vom 1. October ab alle Briefe und Sendungen nur wie folgt zu adressiren:

L. Späth, Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Für meine in Berlin wohnenden geehrten Kunden bemerke ich, dass die Telephonverbindung meines Hauses Berlin, Köpnickstr. 154 mit dem Comptoir der Baumschule bei Rixdorf-Berlin, wie bisher, bestehen bleibt.

Handelsgehitner und Wiederverkäufer
erhalten auf Blumenzwiebeln und
Baumschulartikel
10% Rabatt.



Syringa vulgaris.

Andenken an Ludwig Späth.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Medaillen internationaler und grosser allgemeiner Gartenbau-Ausstellungen

für richtig benannte Obstsorten, besonders
schön gezogene Obstbäume, Alleebäume und Gehölz-Sortimente.
Berlin 1872, 1880, 1883.



3 Grosse silberne Staats-Medaillen.
Viele kleine silberne und bronz. Staats-Medaillen.



Grosse goldene Medaille. Ehrenpreis der Stadt Berlin.
Grosse und kleine silberne und bronz. Medaillen.

Cöln 1875.



6 erste Preise für Obstbäume.
Paris 1867.



Für Hyacinthen.

Petersburg 1869, 1884.



Grosse goldene und grosse silberne Medaille.
Hamburg 1869, 1883.



1 goldene, 12 silberne, 6 bronz. Medaillen,
4 Extrapreise.

Erfurt 1876.



Erster Preis für Gehölz-Sortimente.



A. Neuheiten des Etablissements!



- Acer dasycarpum* fol. albo-varieg. (Späth). Die Blätter dieser sehr schönen in hiesiger Baumschule entstandenen neuen Ahorn-Var. sind recht gut panachirt.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 3 M., p. 10 St. 25 M.
 2—5jährige " p. 1 St. 5 M., p. 10 St. 40 M.
- Acer dasycarpum longifolium*. " (Späth). Eine neue Varietät der Britzer Baumschule mit tief eingeschnittenem. langen Blatte.
 2—5jährige Veredlungen und junge Hochstämme . . . p. 1 St. 2 M., p. 10 St. 18 M.
- Acer dasycarpum lutescens*. (Späth). Die prächtig broncefarbenen Frühjahrstriebe und die zart gelbgrüne Belaubung im Sommer, machen diese in der hiesigen Baumschule aus Samen entstandene Ahorn-Varietät zu einer höchst schätzenswerthen Neuheit für die Landschaftsgärtnerei.
 1jährige Veredlungen à St. 1,25 M., p. 10 St. 10 M.
 2—4jährige " à St. 2,— M., p. 10 St. 16 M.
 Hochstämme " à St. 3,— M.
- Acer dasycarpum pendulum*. (Späth). Dieser prächtige neue Trauerbaum von zierlichem und stark hängenden Wuchse ist in Berlin aus Samen entstanden und bereits seit einer Reihe von Jahren vermehrt worden, so dass schon starke Exemplare abgegeben werden können. Bei geschlossenem Stande hängen die Zweige nicht, sondern nur wenn der Baum frei steht.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 2 M., p. 10 St. 16 M.
 2—4jährige " und Hochstämme p. 1 St. 4 M., p. 10 St. 30 M.
 Extra starke Hochstämme p. 1 St. 7 M.
- Acer dasycarpum pulverulentum*. (Späth). Aehnlich wie bei dem *Acer campestre pulverulentum* sieht das Laub dieser hübschen Neuheit der hiesigen Baumschule aus wie weiss bestäubt, während die Spitzen der jungen Triebe zart rosafarben angehaucht sind. Alle Zweige sind beständig bunt.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 3,— M., p. 10 St. 25 M.
 2—4jährige " p. 1 St. 4,50 M., p. 10 St. 40 M.
- Acer Negundo heterophyllum*. (Späth). Interessante hier entstandene Neuheit.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 1,— M.
 2—4jährige " p. 1 St. 1,50 M.
- Acer Pseudoplatanus* fol. purpur. Prinz Handjery. (Späth). Ein Sämling von dem auf der Unterseite der Blätter purpurrothen stumpfblättrigen Ahorn, dessen junge Triebe eine bei Bäumen vollständig neue Farbe auf der Oberseite der Blätter haben, die von rosa in ziegelroth übergeht und im Spätsommer mit grün und gelbgrau marmorirt erscheint, während die Blattstiele lebhaft roth und die Unterseite der Blätter purpurroth wie bei der Stammform bleiben.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 2 M.
 2—3jährige " p. 1 St. 3 M.
- Acer Pseudoplatanus* fol. atropurpureis. (Späth). Sämling von *Ac. Pseudopl. fol. purp.* Die Unterseite der Blätter ist bedeutend dunkler roth als bei der älteren Form.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 1 M.
 2—3jährige " p. 1 St. 2 M.
- Acer Pseudoplatanus insigne*. (Späth). Sehr hübsch bunt, die Blätter der jungen Triebe marmorirt.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 1 M.
 2—4jährige " p. 1 St. 2 M.
- Alnus incana monstrosa*. (Späth). Eine höchst interessante Form, hier aus Samen gezüchtet, deren Zweigspitzen regelmässig Fasciationen bilden.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 1 M.
 mehrjährige " p. 1 St. 2 M.
- Cornus alba* var. *Spaethii*. Diese unzweifelhaft schönste aller bunten *Cornus*varietäten entstand in hiesiger Baumschule durch den Einfluss der Veredlung des weissbunten *Cornus alba* auf die Unterlage unterhalb der Veredelungsstelle. Die Blätter sind im Frühj. bronzefarben, im Sommer gesättigt goldgelb gerandet, zum Theil vollständig goldgelb und leiden selbst bei der grössten Hitze nicht. Der Wuchs der Pflanzen ist sehr kräftig. Starke 1—3jährige Veredl. à St. 5 M.
- Corylus Avellana medio purpurea*. Eine neue hier entstandene Var. mit braunrother Zeichnung in der Mitte der Blätter.
 2jährige Ableger p. St. 1 M.
- Fraxinus alba* fol. argenteo marg. (Späth). Eine prächtige, hier entstandene Neuheit, welche die bisher bekannten weissbunten Varietäten von *Fraxinus* an Schönheit weit übertrifft. Die stark weiss gerandete und zierliche Belaubung stellt sie den besten der bekannten weissbunten Gehölze ebenbürtig zur Seite.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 2 M., p. 10 St. 18 M.
 Mehrjährige Veredlungen, Halb- u. Hochst. p. 1 St. 3 M., p. 10 St., 25 M.

Neuheiten des Etablissements.

Platanus occidentalis fol. argenteo-varieg. (Späth). Diese weissbunte Platane hiesiger Baumschule, seit mehreren Jahren als ganz constant beobachtet, kann wohl mit Recht als eine hervorragende Neuheit bezeichnet werden. Die jungen Blätter erscheinen zuerst weiss mit rosa getupft und dann schön weiss marmorirt. p. St. 4 M.

Populus alba Bolleana (Lauche), **Pyramiden-Silber-Pappel**, sogenannt zu Ehren unseres berühmten hiesigen Botanikers Herrn Dr. Bolle. Diese Pappel stammt aus dem westlichen Asien, wo auch unsere gewöhnliche Pyramiden-Pappel ihre Heimath hat, und ist eine grosse Bereicherung für unsere Gärten, da wir an pyramidal wachsenden Bäumen in dieser Färbung bis jetzt nichts aufzuweisen haben. Die Unterseite der Blätter ist ebenso intensiv weiss wie bei der „Pop. nivea“, der Wuchs kräftig und elegant pyramidal.

Wir verdanken diese herrliche neue Einführung wie auch die unten beschriebene **Ulmus camp. umbraculifera** dem um die Verbreitung westasiatischer Gehölze hochverdienten Kaiserl. Gartendirector Scharrer in Tiflis. Derselbe schreibt mir darüber: „Die Pyramiden-Silber-Pappel findet sich in wenigen alten schön entwickelten Exemplaren im Volksgarten von Tiflis, welcher seinen Ursprung einem persischen flüchtigen Prinzen verdankt und noch heute seinen Namen trägt. Deshalb ist es uns wahrscheinlich, dass sie aus Persien stammt. Sie ist vollkommen winterhart bei — 16° Reaum., nimmt in jedem feuchten Boden ein gutes Wachsthum an und zeichnet sich durch ihre gigantischen Formen besonders aus, so dass die neben ihr stehenden italienischen Pappeln (*Pop. fastigiata* oder *dilatata*), ein kümmerliches Ansehen haben. Der Stamm ist bis ins höhere Alter glatt wie polirt, hellblaugrün, ohne alle Flecken und Risse, das Gerüste der Aeste kräftig und versplittet sich nicht in kleine unansehnliche Nebentriebe. Das grosse, oben schwarzgrüne Blatt sitzt fest am Zweige und ist deshalb weniger beweglich. Die glänzend weisse Unterseite entfärbt sich auch im Laufe des Sommers nicht, sondern markirt den Baum von weitem mit immer gleichem Farbeffecte. Es ist ein Zierbaum erster Ordnung. Das Holz besitzt feinere Textur als das ordinäre Pappelholz und ist auch als Nutzholz jedenfalls bei weitem vorzuziehen. Wir empfehlen den Baum jedem Natur- und Gartenliebhaber aufs Wärmste.“

2—5jährige Veredlungen . p. 1 St. 2 M., p. 10 St. 15 M., Hochstämme p. St. 3 M.

Prunus cerasifera fol. purpureis. (Späth). **Purpurblättrige Kirschpflaume.** Diese den ganzen Sommer über prächtig rothblättrige Pflaumensorte erhielt ich, wie die vorstehende Pappelsorte, vor mehreren Jahren aus Tiflis. Sie gehört zu den werthvollsten Einführungen der neueren Zeit. Neuerdings ist dieselbe von Herrn Paillet in Chatenay, der sie auch aus ihrer Heimath erhalten haben soll, unter dem Namen **Prunus pissardii** offerirt worden.

1jährige Veredlungen à St. 0,75 M., 100 St. 50 M.

2- und mehrjährige Veredlungen und Hochst. à St. 1-2,50 M., 100 St. 120 M.

Salix vitellina Britzensis. (Späth). **Bluthrothe Goldweide.** Das 1jährige Holz dieser Weide hat im Winter eine leuchtend rothe Färbung, wie bei *Cornus sibirica*.

2—3jährige Pflanzen p. 1 St. 50 Pf. p. 10 St. 3 M.

1jährige Stecklingspflanzen p. 10 St. 1 M. p. 100 St. 7 M.

Sambucus nigra laciniata fol. aureo-varieg. Diese hübsche goldbunte Var. von *laciniata* ist eine Neuheit hiesiger Baumschule, an welcher die goldgelbe Färbung bald in ganz gelben Zweigen, bald in hübscher Zeichnung hervortritt p. 1 St. 1 M. p. 10 St. 7,50 M.

Sorbus aucuparia fol. luteo-varieg. Diese Varietät entstand hierdurch den Einfluss der Veredlung von *Sorbus auc. pendula fol. var.* auf den Wildl., an dem unter der Veredlung ein bunter Zweig hervorkam. 1jährige Veredlungen à St. 1,50 M.

2—5jährige Veredlungen à St. 2,— M.

Syringa vulgaris, Andenken an Ludwig Späth. (F. Späth). Diese unzweifelhaft schönste aller bis jetzt bekannten Fliedersorten ist eine Züchtung der hiesigen Baumschule. Sie wurde unter ca. 15000 Sämlingen der besten Varietäten gewonnen. Die einzelnen Blüten sowohl wie die Ripsen sind sehr gross und von prachtvoll dunkelpurpurrother Farbe, nicht nur als Knospen, sondern auch bei vollständig geöffneten Blüten.

Kräftige 1jährige Veredlungen à St. 5,— M. 10 St. 40 M.

Kräftige 2jährige Veredlungen à St. 7,50 M.

Syringa vulgaris, Frau Bertha Dammann. (Späth). Herrlich reinweisse Sorte mit enorm grossen Blütenrispen, die sich durch dankbares Blüten schon als ganz junge Pflanze auszeichnet und sehr zu empfehlen ist.

1jährige Veredlungen à St. 2,50 M., 10 St. 20 M.

2jährige Veredlungen à St. 3,— M.

Syringa vulgaris, Geheimrath Heyder. (Späth). Bouquet sehr gr., Knospe roth, Blume nach dem Aufbrechen hellblau, im Centrum weiss, reichblühend.

Kräftige Veredlungen à 1 St. 2,50 M., p. 10 St. 20 M.

Syringa vulgaris, Dr. von Regel. (Späth). Rispen s. gr., freistehend, Knospen hellroth, Blume innen schön himmelblau, in voller Blüthe bedeutend mehr blau als *Syringa Eckenholm*, Rispe freistehend. à 1 St. 2,50 M., p. 10 St. 20 M.

Taxus baccata albo varieg. (Späth). Eine sehr empfehlenswerthe Neuheit der hiesigen Baumschule,

als vollständig winterhart bewährt, welche ihre prächtig weissbunte Färbung ganz constant auch auf ganz sonnigem Standorte behalten hat. Die Nadeln sind hübsch gekräuselt.

Junge Pflanzen p. St. 2 M., stärkere Pflanzen, p. St. 3 M., 10 St. 20 M.

Ulmus campestris umbraculifera. Kugel-Rüster. Von den Persern Nalband d. h. Baum der Schmiede genannt, weil sich unter ihm, als dem besten Schattenbaum, der zugleich den sichersten Schutz gegen Regen giebt, mit Vorliebe die Schmiedewerkstätten etabliren. Diese Rüster wird in Persien und dem südlichen Kaukasus ein mächtiger Baum mit grosser, sehr dichter und kugelförmiger Krone. Sie ist eine Abart von „U. campestris“ und hält unsere Winter unzweifelhaft aus. Ihre Krone baut sich vollständig kugelförmig wie die einer Kugelakazie, ohne dass sie geschnitten zu werden braucht, und hat sicher in unserem nordischen Klima, wo die Kugelakazie oft leidet, eine grosse Zukunft. Das Laub hat ein lebhaft grünes Kolorit und hält sich im Herbst ebenso lange am Baum wie bei U. campestris.

Schöne Hochst. m. 2–6jähr. Krone p. 1 St. 3–5 M., p. 10 St. 24–40 M., p. 100 St. 210–350 M.

Niedrige 1–3jährige Veredlungen p. 1 St. 0,75–2 M., p. 10 St. 6–18 M.

Ulmus Heyderii. (Späth). Eine neue Ulme aus Turkestan mit grossem, länglichen, rauh behaarten Blatte. Sehr starkwüchsig. 1jährige Veredlungen p. 1 St. 1 M., p. 10 St. 8 M. 2- und mehrjährige Veredlungen p. 1 St. 2 M., p. 10 St. 15 M.

Ulmus montana atropurpurea. (Späth). Diese aus Samen in der hiesigen Baumschule entstandene Varietät ist die dunkelste und schönste von den bis jetzt bekannten rothblättrigen Rüstern. 2–3jährige Veredlungen à St. 1,50 M.

B. Neue, noch sehr wenig verbreitete Ziergehölze.

Acer Semenowii. Ein neuer Ahorn aus Turkestan mit äusserst zierlicher Belaubung.

2–4jährige Sämlinge à St. 4 M.

Acer dasycarpum Wieri laciniatum. Geschlitzblättriger Silber-Ahorn. Eine äusserst zierliche Form des amerikanischen Silber Ahorns.

2–4jährige Veredlungen p. 1 St. 1,50 M., p. 10 St. 10 M.

Hochstämme p. 1 St. 2,50 M., p. 10 St. 20 M.

Almus glutinosa aurea Hort. Goldgelbe Erle. Mit den constant leuchtend goldgelben Blättern von prächtigem Effect; wächst sehr kräftig und verdient grosse Verbreitung. à St. 5 M.

Crataegus Oxyacantha semperflorens. (Ernaut). Diese Var. blüht sehr reichlich bis zum Spätherbst und wird ihres ganz niedrigen compacten Wuchses wegen auch zur Topfcultur und zum Treiben empfohlen. à St. 1,50 M.

Fraxinus excelsior fol. aureis. Die Blätter sind leuchtend goldgelb, wie bei Sambucus nigra fol. luteis. Der Baum verdient die weiteste Verbreitung. 1jähr. Veredl. à St. 1,50 M., p. 10 St. 10 M.

Hochstämme à St. 3,— M., p. 10 St. 20 M.

Incarvillea Koopmanni. (Bignoniaceae). Im August und September in endständigen Rippen roth blühender Strauch von 1 m. Höhe aus Turkestan. à St. 1 M.

Ligustrum vulgare glaucum, fol. albo-margin. Ganz besonders schöne Varietät, deren Blätter sehr regelmässig weiss gerandet und weiss bestäubt sind. à St. 0,75 M.

Sambucus racemosa plumosa. Eine aus Russland erhaltene Form mit äusserst zierlich geschlitzten Blättern. Als Einzelpflanze auf Rasen von sehr guter Wirkung. à St. 1 M., p. 10 St. 8 M.

Sambucus racemosa serratifolia. Durch die schöne Form der Blätter äussert zierend. à St. 1 M., 10 St. 8 M.

Ulmus Dampieri Wredei. Pyramiden-Gold-Rüster. Die Farbe der Blätter ist intensiv goldgelb, die Form des Baumes die bekannte schöne Pyramidenform der Ulmus Dampieri, an der die Varietät als ein einzelner gelber Zweig in den Königl. Gärten zu Potsdam von dem Herrn Garteninspector Wrede aufgefunden ist. 1–3jähr. Veredl. 1 St. 1 M., 10 St. 8 M., 100 St. 70 M.

Ulmus myrtifolia purpurea. Myrtenblättrige Purpur-Rüster. Die Blätter dieses zierlichen Baumes sind sehr klein und viel dunkler rothbraun als bei der gewöhnlichen Purpur-Rüster. Sie behalten auch ihre rothe Färbung den ganzen Sommer über.

2–4jähr. Veredl. p. 1 St. 1 M., p. 10 St. 8 M., p. 100 St. 70 M.

Ulmus betulaefolia nigrescens, } Diese 3 Sorten bezog ich aus Belgien und ist von ihnen die

Ulmus corylifolia foliis purpureis, } erstere ähnlich der myrtifolia aber mit grösseren Blättern. Die

Ulmus latifolia nigricans, } zweite besitzt noch grössere Blätter und hat beim Austreiben

eine rothe Farbe, während die dritte, zur Abart der U. scabra (montana) gehörend, ganz grosse Blätter mit schwarzgrüner Färbung zeigt.

1–2jähr. Veredlungen p. 1 St. 0,75 M., p. 10 St. 6 M. Alle 3 Sorten zus. à 1 St. für 2 M.



Edelreiser. Veredelte Obstbäume. Aepfel.

Edelreiser, für Frühjahrs- und Sommerveredlung.

Für die Frühjahrsveredlung sind die Reiser spätestens im Februar zu bestellen.
Aepfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück 15 Pfg., 100 Augen derselben Sorte 1 M.
Pfirsiche und Aprikosen à Stück und Sorte 30 Pfg.
Rosen à Stück 20–30 Pfg., Gehölze à Stück 15–60 Pfg.
 Neue Sorten von Obst und Gehölzen ungefähr $\frac{1}{3}$ des Preises einer niedrigen Pflanze.
 Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.
 Ein Reis hat mindestens 5–8 gute Augen.

Veredelte Obstbäume.

In grösseren Mengen veredle ich nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen nach wiederholter sorgfältiger Prüfung als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind. Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topfbäumchen, ferner neue Obstsorten.

Die **in dieser Schrift (fett) gedruckten Sorten** sind von den deutschen Pomologen Versammlungen empfohlen.

Von hochstämmigen Obstbäumen sind in diesem Herbst über 150,000 Stück in sehr guter Qualität zum Verkauf vorrätig und von Zwergobstbäumen circa 70,000 Stück, so dass ich hoffe, alle Aufträge darauf zur vollsten Zufriedenheit der geehrten Besteller ausführen zu können. Trotzdem wird es im Frühjahr vorkommen, dass einzelne Sorten vergriffen sind und bitte ich daher, wenn nur ganz bestimmte Sorten verlangt werden, dieselben schon im October senden zu lassen.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* bedeutet Tafelfrucht, † Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.

S. bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;

H. bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang October bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;

W. bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.

Ferner bedeutet:

Fl. — Fleisch;

Fr. — Frucht;

gr. — gross;

kl. — klein;

mgr. — mittelgross;

schm. — Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).

Aepfel.

Die Hochstämme und Halbstämme sind auf Apfelfwildlinge, die Pyramiden und Palmetten auf Splittapfel (Doucin), die Cordons auf Johannisapfel (Paradies) veredelt.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als Hochstamm — H, Mittelstamm — M, Pyramide — P, Spalier — S, Cordon — C, 1jährige Veredlung — 1j. vorrätig ist.

Preise.

	pr. Stück	pr. 100 St.	pr. 1000 St.
	M.	M.	M.
Hochstämme , sehr schöne mit guten Kronen, ca. 6–8 cm. Stammumfang, auf 1 mtr. Höhe gemessen und von ca. 1,90 mtr. Stammhöhe	1,50	125	1200
do. extra starke, 8–10 cm. Stammumfang, 1 mtr. hoch gemessen	1,75–2,50	160	1550
Mittelstämme , mit ca. 1,25 mtr. Stammhöhe	1,—	80	750
Schnurbäumchen , (Cordons), einfache, zu Einfassungen v. Wegen besonders geeignet	0,75	65	
do. doppelte und kräftige einfache	1,25	110	
Spalierbäume , Palmetten mit einer Etage	1,50	125	
do. do. mit 2 Etagen	2,75	250	
do. do. mit 3 Etagen	4,—	375	
Pyramiden	M. 0,75 bis	3,50	65–300
1jähr. Veredlungen auf Doucin	0,50	45	

Aepfel.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
H. M. P. 1j.	76.	Alantapfel , (Grosser edler Prinzessinapfel), **†† W., sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.
H. M. P. 1j.	131	Ananasapfel , Rother, **†† Sept.—Oct. Fr. mgr. zart und saftig.
H. P. 1j.	455.	Weisser, **†† Oct.—Dec.; treffliche reichtragende Sorte.
H. P. C. 1j.	228.	Api , Kleiner †† W.—S.
H. M. P. S. C. 1j.	86.	Astrakan , Rother, *††. Ende Juli — Mitte Aug. Gute Marktfrucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung in rauhen Gegenden zu empfehlen. Wegen der Schönheit der Früchte nicht für Anpflanzungen an Landstrassen geeignet.
H. M. P. S. 1j.	89.	Astrakan , Weisser, Russischer Eis-A., (Pomme de glace transparente) *† August. Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfrucht sehr schätzbar.
H. S.	112.	August van Mons , **†† Oct.—Nov. I., Fr. gr., flachrund. Fl. fein und saftig, trägt früh und reich.
H. P. S. C. 1j.	127.	Belle de Boskoop , (Reinette de Monfort), *†† Nov.—Dec. I., Fr. mgr. auch gr. Fl. fein und zart, sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.
H. M. P. S. 1j.	120.	Bellefleur , Gelber **†† W.; feiner Tafelapfel, regelmässig tragend.
H. M.	75.	Blutapfel , †† Nov. Schätzbare Haushaltsfrucht.
H.	3.	Bohnapfel , Grosser, †††, W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte fest hängen und der Baum alle Jahre reich trägt.
H. P. S. 1j.	151.	Boikenapfel , **†† W. Für nördliche Gegenden sehr zu empfehlen.
H. M. P. S. C. 1j.	10.	Borsdorfer , Edel-, **††† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.
H. M. P. S. C. 1j.	183.	Borsdorfer , Rudolph's Zwiebel-, **†† Dec.—März, Frucht sehr fein, mürbe, von fein gewürztem, dem Edelborsdorfer oder auch der Orleansreinette ähnlichen Geschmack. Baum trägt früh und jährlich reich.
H. M. P. S. C. 1j.	66.	Cadeau du général , (Vaugoyeau), **†† Dec.—März, I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig; vorzügliche Frucht.
H. M. P. C. 1j.	589.	Calvill , Berliner weisser Winter-, **††. Eine vortreffliche Var. vom Weissen W. Calvill, die sich durch regelmässige und frühe Tragbarkeit vortheilhaft auszeichnet.
H. P. S. C. 1j.	162.	Calvill von Boskoop , **†† Jan.—April. Fr. gr. und fein.
P.	179.	des femmes, **† Febr.—Mai. I. Fr. mgr. Fl. locker und saftig; besonders schätzbar. Tafelfr.
H. M. P. S. C. 1j.	70.	Garibaldi's, *† Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht.
H. M. P. S. C. 1j.	99.	Rother Herbst- , (Edelkönig), *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für rauhe oder feuchte Lagen, wächst langsam.
H. P. S. C. 1j.	91.	Rother Winter- , **†† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschützte Lage.
H. M. P. S. C. 1j.	69.	von St. Sauveur, **†† Nov.—Dec. gr. mit weinbeerartigem Zucker- geschmack, fruchtbar, wächst lebhaft.
H. M. P. S. C. 1j.	78.	weisser Winter-, (Calville blanc), **†† W. Fr. gr. gehört zu den besten Tafeläpfeln. Wuchs als Hochstamm mittelgross.
H. M. P. S. C. 1j.	59.	Cardinal , Geflammt, *†† W. Fr. gr., zu ökonomischen Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich.
H. M. P. S. C. 1j.	163.	Cellini , *††† Oct.—Novbr. I., Fr. gr. und von sehr schönem Aussehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich reich und sehr früh tragbar; auf Paradies oder Doucin veredelt oft schon im zweiten Jahre mit Früchten besetzt.
H. M. P. S. C. 1j.	74.	Charlamowski , (Nalivia), *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für rauhe Lagen passend.
H. M. P.	28.	Citronenapfel , Winter-, **†† W., der Baum zeichnet sich durch Gesundheit und Tragbarkeit aus; verdient häufige Anpflanzung.
H. M. P.	390.	Cousinot , Geflammt, *†† Sept.—Oct., mgr. u. gr., Fl. locker v. weinartigem Zuckergeschmack, sehr fruchtbar.
H. P.	148.	Purpurrother , †† Nov.—Juni. Sehr schätzbarer Wirthschafts- apfel. Baum sehr fruchtbar.
H. M. P. S. C. 1j.	79.	Edelapfel , Gelber, (Golden noble), *†† H.—W. Fr. gr. schätzbar. Marktfr.

Aepfel.

Bezeichnung, d. vorräth. Form	No.	
P. S. 1j.	211.	Edelhöhermer , **† Nov.—Febr., einer der schönsten und zartesten Rosenäpfel aus Tyrol; bald und reich tragend.
H. M. P. S. 1j.	100.	Edelrother , *†† W., mgr., hübsch roth marmorirt, saftreich, sehr gewürzhaft u. delicat. Baum früh u. reichtragend, besonders für warme Lage geeignet.
H. M.	15.	Eiseraepfel, Rother , (Rother, drei Jahre dauernder Streifling. Pomme rouge rayée), †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet. Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
H.	115.	Emilie Müller , *†† W., mgr., gelblich grün, sehr saftreich, von köstlichem Reinettengeschmack, trägt reich.
H. M. P. S.	263.	Findling von Bedfordshire , †† Nov.—März. Ein vorzüglicher englischer Küchenapfel, gross und schön, gleicht im Geschmack den Reinetten. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. M. P. S. 1j.	552.	Fürst Bismark , edle neuere Sorte, vorzügliche Winter-Gold-Reinette.
H. M. P.	90.	Fürstenaepfel, Grüner , †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.
H.	24.	Gewürzapfel, Sommer , *†† Anf. Aug. Einer der frühesten Aepfel.
H. P. S. C. 1j.	46.	Gloria mundi , *†† Oct.—Dec., sehr gross und schön, fruchtbar.
H. M. P. S. C. 1j.	12.	Goldzeugapfel , (Drap d'or), **†† Novb.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Aepfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut aus-geschnitten werden
H. M. P. S. C. 1j.	1.	Gravensteiner , **†† Sept.—Decbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süss gewürzhaften ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauherem Klima.
H. M. P. S. C. 1j.	208.	Gravensteiner, Rother , **†† H., ähnlich dem gewöhnlichen Gravensteiner, aber viel mehr geröthet.
H. M. P. S. C. 1j.	284.	Hausmütterchen , †† Octbr.—Decbr., sehr gross, flachrund, saftreich, von süss-weinartigem Geschmack. Baum starkwüchsig.
H. M. P. S. C. 1j.	243.	Hawthornden-Apfel , †† Oct.—Nov., hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum Seinesgleichen.
H. M. P. S. C. 1j.	561.	Hawthornden, Rother , Sept., gross, abgeplattet, hellgelb, Sonnenseite roth, saftig, leicht säuerlich; sehr starkwüchsig.
H. M. P. S.	184.	Herbstapfel, Cludius , **† E. Sept.—Oct., delik. Tafelfrucht; Baum in jedem Boden gut wachsend u. reichtragend. Verdient d. weiteste Verbreitung.
H. M.	369.	Holländer, Doppelter , *†† Nov.—Jan.
H. M. P. S. 1j.	95.	Jansen von Welten , **†† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum trägt bald.
P. S. C. 1j.	132.	Jaquins-Apfel , **†† Nov.—Frühj. I. Fr. gr., Fl. locker u. saftig. Werthvolle Tafelfrucht.
H. M.	87.	Jungfernapfel, Rother , (Roths Hähnchen), *† H.—W.
P.	109.	Jungferschönchen , **†† E. Oct.—W.
H. M. P. S. C. 1j.	39.	Kaiser Alexander , *†† E. Oct.—Jan., Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen.
H. M. P. S. C. 1j.	587.	Kaiser Wilhelm , W., sehr gross, sehr gut, hält sich bis zum Frühjahr, ähnlich einer Goldparmäne. Baum tragbar und starkwüchsig.
H. M. P. S. C. 1j.	2.	Kantapfel, Danziger , **†† Oct.—Dec., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürben, saftreichen, fast schmelzendem Fleische und von gewürzigem süssen Weingeschmacke, verlangt guten Boden.
P.	548.	Karantil Alma , Oct.—Nov., (tartarische Sorte), trug hier reichlich, mgr., ange-nehm säuerlich.
H.	673.	Karthhäuser, Sommer .
H. M. P.	565.	Kernloser, Sommer . (Menochers Noscote); Winter; mgr., ausgezeichneter Qualität. Aus Amerika. Ohne alle Kerne.
H.	675.	Kohlapfel .
H. M.	282.	Königs-Fleiner , **† Anf. Oct.—E. Nov. gr.
H. M.	238.	Köstlicher von Kew , *† bis **†† Dec.—Apr.
P. S. C. 1j.	102.	Köstlichste, Der , (Lazzarola, Cossensa in Süd-Tyrol), **† W., mgr., rundlich, ausserordentlich saftreich und gewürzt, für wärmere Lagen und für Formbäume geeignet.
H. M.	72.	Krummstiel, Rheinischer , †† Nov.—März. Frucht saftreich, von süss wein-säuerlichem Geschmack. Baum kräftig.
H.	436.	Küchenapfel, Keswicker , †† Aug.—Sept., 6 Wochen. Ausserordentlich reich-tragender werthvoller Kochapfel.

Aepfel.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
H. M. P. S. 1j.	167.	Küchenapfel, Mank's, (Mank's Codlin). *†† Ende Aug., mgr. u. gr., wachsgelb, sehr saftreich, von süßweinigen Geschmack, reichtragend.
H. M. P. S. C. 1j.	18.	Kurzstiel, Kgl. , (K. rother K., Courtpendu rouge royal), *†† W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauhen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hängen müssen.
H. M.	4.	Luiken-Apfel , *††! Oct.—Jan., vorzüglicher, besonders in Württemberg hoch geschätzter Apfel, sehr spät blühend.
H. M. P. S. C. 1j.	588.	Milchapfel, Braunschweiger, Ende August, s. gr., fast rund, milchweiss.
P. S. 1j.	118.	Morgenduft-Apfel, *†† Dec.—Mai, Fr. gr.; trägt bald und sehr reich.
H. M.	336.	Nalivia, Possart's, *†† Nov.—W.
H. M.	450.	Nonpareil, Alter, *†† Jan.—Mai.
H. P. S. 1j.	553.	Olga Nicolajewna, W.—Mai, prachtvolle Borsdorfer Reinette aus d. Ukraine; starkw. und tragbar, vollständig pyramidal.
H. P. S. 1j.	554.	Parmäne, Henzen's, W., sehr schöner und guter Apfel für Tafel und Most, Baum mittelstark, gesund, sehr reichtragend.
H. P. S.	35.	Parmäne, Herefordshire, *†† Dec.—März, Fr. mgr., delik., ausserordentlich fruchtbar.
H. M. P. S. C. 1j.	73.	Parmäne, Scharlachrothe , (Engl. sch. P., Oxford peach apple), *†† H. Der Baum wächst in schwerem und leichtem Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.
H. M. P. S. C. 1j.	135.	" Schwarzenbach's, *†† Nov.—Febr. I., Fr. gr., Fl. fein u. locker, gewürzt.
H. M. P. S. C. 1j.	38.	" Sommer , (Gestreifte S.-P.), *†† Sept.—Oct., der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.
H. M. P. S. C. 1j.	8.	" Winter-Gold- , (Engl. W.-Goldp.), *†† Dec.—März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht und springt nie im Regen auf. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.
H. M. P. S. C. 1j.	140.	Pepping broad eyed, *†! Sept.—Oct., Fr. sehr gr. und schön.
H. M. P.	80.	Pepping, deutscher Gold- , (Herrenhäuser deutsch. Gldp.), *†† W., Fr. muss bis Ende Oct. am Baume hängen. Baum gesund und fruchtbar.
H. M.	93.	" Duquesne's, *†† Dec.—März.
H. P.	489.	" Gelber Lavendel-, fast *†† E. Aug.—Sept.
H. M. P. S. C. 1j.	124.	" London , *†† ausserordentlich reichtragend, W.
H. M. P. S. C. 1j.	31.	" Parker's , (Parker's grauer Pepping), *†† Dec.—März, sehr zu empfehl. Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.
H. M.	89.	" Punktirter Knack-, *†† W., verdient besonders in nördl. Gegenden angepflanzt zu werden; gedeiht in leichtem und schwerem Boden. Fr. verträgt ziemlich frühes Brechen. Reife tritt im Januar ein.
H. M. P. S. C. 1j.	32.	" Ribston , (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.), *†† W., sehr empfehlenswerth, besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh und reich.
H. M. P. S.	230.	" Scharlach-, *† Aug.—Sept., mgr., schön roth gefärbt, reichtragend.
P. S. C. 1j.	188.	Pojnik, *†† Decbr.—Mai, Fr. gr.
H. M. P. S. C. 1j.	164.	Pomona, Cox's, *†† Oct.—Nov. II. Fr. s., gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelziede und für Haushalt sehr branchbar.
H. M. P. S. C. 1j.	14.	Prinzenapfel , (Nonnen-, Melonenapfel, Hasenkopf v. Lübben), H., mgr., walzenförmig, saftreich und locker, wird im Oct. am Baum reif, hält sich bis Weihnachten, wächst in allerlei Boden und ist sehr tragbar.
P. S. C.	183.	Prinz Nicolaus von Nassau.
H. M.	82.	Quittenapfel, Winter-, (Quince-apple, Rein. coin.), *†† W.
H. M.	77.	Rambour, Lütticher *† W. Fr. gr., für den Landmann recht passend.
H. M. P. S. C. 1j.	11.	Reinette, Ananas- , *†† Nvbr.—Frühj., ein sehr saftvoll mgr. Apfel von angenehm gewürzhaftem, weinigen Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen und gedeiht auch in magerem Sandboden.
H. P. S. C. 1j.	37.	" Baumann's , (Baumann's rothe Winter-R.), *†† Dec.—März, ziemlich grosse werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.
H. M. S. C. 1j.	9.	" Carmeliter , (Lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truite, Franz. Gold-R., Limonen-R.), *†† Jan.—Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süßem Geschmack und ausgezeichneter Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt

9 Aepfel.

Bezeichn d. vorrath Form	No.	
H. M. P. S. C. 1j.	16.	Reinette, Champagner-, (Herrnappf., Loskrieger, Fürstl. Taf.-A., Glas-Rein etc.) *†† W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung, und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hängen, auch an Strassen pflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt u. die Früchte bis zur Kartoffelernte hängen bleiben können. Er dauert ein Jahr.
H. P. S. 1j.	334.	" Coulon's, *†† Nov.—März.
H. M. P. S. 1j.	501.	" Cox's, Orangen-, *†† Nov.—März, sehr delikate, reichtragende Sorte.
H. M. P. 1j.	92	" Frede's Quitten-, *†† W., der Baum liebt trocknen Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.
H. 1j.	43.	" d'Angleterre, *†† Nov.—März.
H. M. P. S. C. 1j	17.	" Engl. Spital-, *†† Nov.—Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.
H. M. P. S. 1j.	84.	" Fromm's Gold-, *†† Nov.—Jan., Fr. gr. und schön goldgelb; Baum gross und sehr fruchtbar.
H. M. S. C. 1j.	33.	" Gäsdonker, *†† Decbr.—Mai, Fr. mgr., delikat; gedeiht auch in rauheren Lagen.
H. M. P. S. C. 1j.	41.	" Gold-, von Blenheim, (Blenheim Pepping), *†† Winter, Fr. hält bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.
H. M. P. S. C. 1j.	6.	" Grosse Casseler, (Deutsche Goldrein., Dutch Mignonne, Holland. Gold Rein.), *†† März-Juli, einer der vorzüglichsten Aepfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzüglich zur Mostbereitung.
H. M. 1j.	669.	" kleine Casseler.
H. M. P. S. 1j.	327.	" Graue, französische, *†† W., fein gewürzt.
H. M. P. S. C. 1j.	20.	" Harbert's (Harb. Rambourrein.), *†† Dec.—April, gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Garten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.
H. P. S. 1j.	556.	" Heuzen's gestrickte, W., sehr guter Apfel. Baum sehr tragbar.
H. M. 1j.	507.	" Köstliche von Newton, *†† Jan.—April.
H. M. P. S. C. 1j.	376.	" Landsberger, *†† Nov.—Jan. mgr.—gr., Fl. gelbl.-weiss, saftreich, von recht gutem süssweinigen Geschmack. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend.
H. M. 1j.	239.	" Luxemburger, *††, Fr. gr., sehr saftreich. Baum starkwüchsig und dauerhaft. Febr.—Sommer.
P. 1j.	510.	" Molly-, *††, W.
H. 1j.	366.	" Multhaupt's, *†† W.
H. M. P. S. C. 1j.	103.	" Muscat-, *†† W., mgr., zart, äusserst gewürzhalt, als Handelsobst sehr beliebt. Baum trägt gewöhnlich reich, liebt aber keine warme Lage.
P. S. 1j.	130.	" Norwegische Wachs-, *† W.
H. M. 1j.	524.	" Normännische, *†† Oct.—Dec.
H. M. P. S. C. 1j.	285.	" Oberdieck's, *†† Jan.—März, mgr., sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.
H. M. P. S. C. 1j.	19.	" Orléans, (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Gold-Rein.), *†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8–10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.
H. M. P. S. C. 1j.	7	" Pariser Rambour-, (Rein. von Kanada), *†† Dec.—Frühj., Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät, wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniessbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.

Aepfel.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No	
H.	671.	Reinette, Princess Auguste.
H. M. P. S.	1j. 206.	„ Röthliche , ***†† Winter. Sehr edler Tafelapfel I. Rang, trägt sehr gut.
H. M. P. S.	1j. 398.	„ Schmidberger's rothe , ***†† Dec.—Apr. Vortreffl. Frucht, volltrag.
H. M. P. S.	1j. 81.	„ von Breda, ***†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.
H.	528.	„ von Madeira, ***†† Dec.—März.
H. M. P. S.	1j. 356.	„ Scott's , ***†† W. mgr. Baum sehr früh fruchtbar. Fl. gelblich, fein, saftig, gewürzhaft.
H. M. P. S.	1j. 88.	„ von Sorgvliet, ***†† Dec.—Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum.
H. M. P. S. C.	1j. 280.	„ Willy's, ***†† W. Fl. sehr fein, von einem sehr aromatischen weinartigen Zuckergeschmack.
H. P. S.	1j. 129.	„ Weidner's Gold-, ***†† Nov.—März, mgr., flachrund, saftreich, etwas citronenartig gewürzt, Baum wächst rasch und ist tragbar.
H. M.	527.	„ weisse englische, ***†† Dec.—April.
H. M. S.	1j. 205.	„ Woltmann's, ***†† Ende Octbr.—W. Fl. sehr fein, weiss, von sehr edlem gewürzreichen Geschmack.
H. M. P. S. C.	1j. 110.	Richard, Gelber , ***†† Nov.—Dec.; ziemlich gr., eine werthvolle Frucht aus Meklenburg.
H. M. P. S. C.	1j. 13.	Rosenapfel, Virginischer , (Virg. Sommer-Rosenapfel.), (*†† Anf. Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.
H. M.	530.	„ München's, ***†† Anf. Sept.—Octbr., mgr., flachkugelförmig, Fleisch schneeweiss, weich, saftreich, von sehr angenehm-erdbeerartigem Geschmack. Ist für die Tafel und die Wirthschaft vortrefflich.
P.	1j. 467.	Rosmarinapfel, Rother, ***† Dec.—März.
H. M. P. S. C.	1j. 61.	„ Weisser, (Italienischer Rosm.-A.), ***† Nov.—Febr., mgr., sehr fein.
P. S.	60.	Schöner aus Kent, (Beauty of Kent), *†† Oct.—Dechr. Fr. gr., schön gefärbt, angenehm schmeckend.
H. M. P. S.	1j. 535.	Sommerapfel, Pfirsichrother , ***† Mitte Aug. — Anf. Sept.; einer der besten Sommeräpfel, prächtig gefärbt, früh und ausserordentlich voll tragend; auch für rauhere Gegenden.
H. M. P. S. C.	1j. 262.	Sondergleichen, Langton's , *†† Oct.—Jan. Vortreffliche Weinfrucht, welche wegen der Härte des Baumes und Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.
H. M. P.	250.	Stettiner, Gelber Herbst-, *†† H.—W.; mgr., sehr saftig.
H. M.	71.	Stettiner, Rother, (Rother Herrenapfel, Rostocker), *†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich in manchen Gegenden nicht gesund.
H. M.	417.	Streifling, Echter Winter-, *†† W. gr., Fl. locker, weinsäuerlich. Für Strassenanpflanzung zu empfehlen.
H. S. C.	1j. 47.	Taffetapfel, Weisser, (Taffetas blanc d'hiver), *†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.
H. M. P. S. C.	1j. 126.	Taubenapfel, Neuer englischer, *†† Nov.—Febr. (Neuer englischer Pigeon); gr., glänzend roth von sehr schönem Ansehen. Fl. ziemlich fein, etwas zimmtartig und süssweinig schmeckend. Baum wächst gut.
H. M. P. S. C.	1j. 5.	Taubenapfel, Rother Winter- , (Pigeon rouge, Mandel-A.), ***† Nov.—Früh, nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in zu feuchtem, trägt so reich, dass er ausgeplückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hängen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktfucht I. Ranges. Wuchs mässig.
H. M. P. S. C.	1j. 128.	„ Schiebler's, ***† Nov.—Febr., gr., mattgelb, von zart gewürztem, kalmusartigem Geschmack, mit feiner Säure. Baum wächst nicht stark.
H. P. S. C.	1j. 108.	„ von St. Louis, ***† H.; mgr., weinsäuerlich, sehr saftreich, eine wahre Zierde für die Tafel, hält sich jedoch nur etwa 3 Wochen. Baum kräftig, fruchtbar.
H. M.	458.	„ weisser Winter, ***† W.
H.	674.	Transparentapfel, rother.
S.	139.	Wagener-Apfel, ***†† Nov.—Febr.; Amerik. Sorte, gr., flach, ziemlich saftreich, stark gewürzt, fein säuerlich, fault nicht leicht. Baum fruchtbar.
H.	666.	Walze, rothe, †† guter Wirthschafts- und Mostapfel, Oct. gr.; Baum wächst lebhaft und wird bald fruchtbar.
H. M.	160.	Warraschke, Gubener, †† Dec.—Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbar.

Russische Aepfel. Neue oder dem Sortim. neu hinzugefügte Sorten.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
H. M. P. S. 1j.	98.	Zimmetapfel, Sommer- (Gestreifter Sommer-Z. Pigeon rouge d'automne, Couleur de chair), **†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen und gehört zu den schätzbarsten Sommer-Aepfeln.



Russische Aepfel.



Meist Sommer- und Herbstfrüchte, für rauhes Klima besonders passend; bezogen von dem um die Pomologie Russlands hochverdienten Director des bot. Gartens, Staatsrath Dr. von Regel in St. Petersburg.

Nachstehende Sorten sind als 1 — 3jähr. Veredlungen auf Wildl. abzugeben; die als Hochstamm vorrätigen sind mit H. bezeichnet.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
H.	298.	<i>Antonowka</i> , bekannter ausgezeichnete Winterapfel.
H.	301.	<i>Aport</i> , vorzüglicher Herbst- und Winterapfel.
H. M.	294.	<i>Barkowskoje</i> , *†† Ende Sept.—Oct. mgr., grün, mit rothen Backen, sehr guter Süßapfel.
H.	308.	<i>Bergamotnoje</i> , *†† Sept., mgr., sehr bald und reich tragend, braunroth gestreift und gefleckt, schöner ansehnlicher Apfel, Ist Mitte Sept. am Baume reif.
H. M.	296.	<i>Borkowskoje</i> , *†† Aug.—Sept., mgr., grün. Ein guter Süßapfel.
H.	299.	<i>Borowinka</i> , *† vorzüglicher Herbst- und Winterapfel; gelbl. grün mit schwachen rothen Streifen u. besonderem weinsäuerlichen Geschmack.
H. M.	302.	<i>Kalwil krasny betny</i> , (Rother Sommer <i>Calvill</i>), E. Sept., ausgezeichnete Sommer-Tafelapfel, wachsweiß mit schwacher Röthe, von angenehmem, gewürzhaltigen säuerlichem, fremdartigem Geschmack.
H.	303.	<i>Karitschnewoje</i> , **† Anf. Sept., vorzügl. Herbstapfel, mgr., weißlich grün, karmin gestreift und geflammt, mit feinem, süßsäuerlichen, sehr gutem Geschmack.
H.	300.	<i>Plodowitka</i> , **†† Mitte Sept.—Oct., sehr schön und von gutem Geschmack, dem Charlamowsky ähnlich; reichtragend.
H.	295.	<i>Repka rozowaja</i> , Winter, rosenrother Repka; schöner Tafelapfel.
H. M.	304.	<i>Serinka</i> , (Lehmapfel), guter Herbstapfel von der Küste des baltischen Meeres.
H.	306.	<i>Skrischapfel</i> , **† Winter, ausgezeichnete Tafelapfel mit weinsäuerlichem angenehmen Geschmack.
H. M.	305.	<i>Swinzowka</i> , *† Anf. Sept., ziemlich gross, grün, etwas gestreift, starksäuerlich, darf nicht zu früh gepflückt werden.
H.	297.	<i>Titowka</i> , **† Sept.—Oct., eine sehr beliebte und viel verbreitete Sorte, dem Graveustein ähnlich.
H. M.	403.	<i>weisser</i> , *†† Aug.
H. M.	307.	<i>Tschernoje Derevo</i> , Winter, vorzüglicher Tafelapfel von sehr angenehmem weinsäuerlichen gewürzhaltigen Geschmack.



Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

<i>Einfährige Veredlungen</i> (in allen Sorten)	p. 1 St. 1.— M.
<i>Pyramiden</i> oder 2—3jährige Veredlungen (in den mit P. bezeichneten Sorten)	p. 1 St. 1,50 M.
<i>Mittelstämme</i> in den mit M. bezeichneten Sorten	p. 1 St. 1,50 M.
<i>Hochstämme</i> " " " H. " " " " " " " " " " " "	p. 1 St. 2,50 M.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
P.	544.	<i>Aga Alma</i> , tartarischer Apfel, (diese wie die anderen von dort stammenden Sorten erhielt ich von Herrn Garten-Inspector Scharrer in Tiflis.)
H. P. S. 1j.	606.	<i>Åkerö</i> , Nov.—März. Fr. gr., von fein gezuckertem, gut gewürztem Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. P. 1j.	605.	<i>Api rose</i> , Jan.—Mai, sehr gewürzhaltig; schön gefärbter kleiner Dessertapfel.
H. P. 1j.	568.	<i>Beauty of Hants</i> ; Sämling der GoldreINETTE von Blenheim, herrliche Frucht. I. Qualität, Farbe dunkelroth, Gestalt kegelförmig.
H.	669.	<i>Birnappel</i> , Dr. Kuhn's.
H. P. S.	642.	<i>Birnappel</i> , Winter, **†† eigenartig gewürzt.
H. P. S.	602.	<i>Calvill</i> , Holmers.
H. P. S. 1j.	614.	<i>Calvill</i> , Holmers, Herbst.

Aepfel.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No	
H. M. P. S. 1j.	601.	<i>Cossonnet</i> , Kienast's, mgr., Fl. zart, reinweiss, angenehm, süss-säuerlich; Baum spät blühend und sehr fruchtbar.
H. M. P.	590.	<i>Daru-Apfel</i> , ungarischer Winter-Apfel recht guter Qualität, ansehnlicher Grösse und guter Haltbarkeit.
P.	545.	<i>Dasch Alma</i> , tartarische Sorte.
H. M. P.	636.	<i>Devonshire</i> quarrenden.
H. M. P. S. C. 1j.	540.	<i>D. T. Fish</i> , Nov.—Jan., enorm gross, bis zu 40 Centim. Umfang.
P.	546.	<i>Dschanat Alma</i> , tartarische Sorte.
II.	659.	<i>Duches of Oldenburgh</i> , mgr., sehr saftig, mit feinstem Ananasgeruche.
II.	660.	<i>Early Hawest</i> , Herbst-, mgr.-gr. gelb. zart, etwas säuerlich, ausgezeichnete Qualität, Wachstum mittelstark. Amerik. Varietät.
II. P. 1j.	634.	<i>Evening Porty</i> , W. Amerik. V., mgr. s. gut.
II. P. S. 1j.	622.	<i>Fallawater</i> (Tulpehocken), Nov.—März, ein grosser, schöner Apfel aus Pennsylvanien, von guter Qualität. Baum starkwüchsig, früh und reichtragend.
P. S. 1j.	616.	<i>Fall Pippin</i> , Oct.—Dec., ein in der Gegend um New-York sehr verbreiteter und beliebter, ausgezeichneter Tafel- und Küchenapfel. Frucht sehr gross. Baum starkwüchsig und reichtragend.
H. P. S. 1j.	623.	<i>Fameuse</i> , Nov.-Jan., im Norden der Vereinigten Staaten besonders verbreitet, dort einer der werthvollsten Dessert- und Markt-Aepfel. Fr. mgr. mit schneeweissem Fleische. Baum starkwüchsig.
H. M. P. 1j.	576.	<i>Frühapfel, Schmidtman's</i> , E. Juli—Anf. August, mgr. von angenehmen Geschmack; ausserordentlich reichtragend. Ich erhielt die Sorte von Dr. Schmidtman, der sie aus Samen erzogen hat.
H.	657.	<i>Gallwyler</i> , ähnlich dem Borsdorfer.
H.	655.	<i>Goldpepping, Dechant Giersbergs</i> , W., mgr., von ausgezeichnetem Geschmacke.
H. P. 1j.	591.	<i>Gulderling, Henzen's</i> , *†, mgr., schön goldgelb, ungemein reichtragend.
P.	547.	<i>Gunuss Alma</i> , tartarische Sorte.
H. M. P.	603.	<i>Haferapfel, Osnabrücker</i> , sehr gr., Frucht von Nov. bis tief in den Winter brauchbar.
H. M. P.	579.	<i>Hampus</i> , Aug.—Oct., mgr., kugelförmig, hellgelb mit braunroth verwachsen, saftreich, fein säuerlich, Wuchs gemässigt, sehr fruchtbar.
H.	665.	<i>Hermannsapfel</i> .
H. M.	653.	<i>Herzogin Olga</i> , mgr, ausgezeichneter Herbstapfel.
H.	641.	<i>Jacobsapfel</i> , *††.
P. 1j.	617.	<i>Jefferis</i> , Sept.—Oct., aus Pennsylvanien, mgr. — g., soll einer der besten Dessert-Aepfel sein. Baum fruchtbar.
P. S. 1j.	624.	<i>Jonathan</i> .
H. M. P. S. 1j.	637.	<i>Irish Peach</i> .
H. M. P. S. 1j.	638.	<i>Juncating red</i> , (Rother Juniapfel), *† E. Juli.
P.	548.	<i>Karanfil Alma</i> , tartarische Sorte.
P.	549.	<i>Kirmissi Alma</i> , tartarische Sorte.
H. P. S. 1j.	625.	<i>Königsapfel</i> , (King), Nov.—März, amerik. Sorte, soll einer der grössten Aepfel u. bester Qual. sein. Baum starkwüchsig, reichtrag. u. hart.
H.	658.	<i>Königin Olga</i> , W.—Mai, sehr gute Borsdorfer Rtte. aus der Ukräne. S. starkwüchsig.
P. 1j.	619.	<i>Kürbisapfel, Süsser</i> , (Pumpkin Sweet), Oct.—Nov., ein sehr grosser amerikanischer Apfel; süss, schön gewürzt, werthvoll. Baum pyramidal und sehr stark wachsend.
H. P. S.	555.	<i>Kurzstiel, Schwarzer</i> , Winter—Mai, tief blutroth, platt. Tafel- und Zierfrucht.
II. M. P. S. C. 1j.	562.	<i>Lady Henniker</i> , Oct.—Jan., sehr gross, rund, oben spitz, kantig, gelb mit roth gestreift, zart und gewürzreich.
H. M. P. 1j.	585.	<i>Liebling, Heyder's</i> .
P. S. 1j.	621.	<i>Liebling, Sherwood's</i> , (Sherwood's Favorite, Chenango Strawberry). Sept., in d. Ver. Staaten als Tafel- und Marktapfel wegen seiner Schönheit und Güte sehr geschätzt. Frucht gr., länglich; Baum sehr starkwüchsig und fruchtbar.
H. P. S. 1j.	635.	<i>Lord Grosvenor</i> , sehr gross und reichtragend.
H. M. P. 1j.	639.	<i>Lord Suffield</i> .
H. M. P. 1j.	586.	<i>Madame Granger</i> , Nov.—Jan., sehr gross, stark gerippt. I. Qualität. Baum ausserordentlich fruchtbar und starkwüchsig.
H. M. P.	570.	<i>Monsieur Gladstone</i> , sehr früh, Sonnenseite scharlach, Fleisch fest und saftig, reichtragend.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
P.	626.	<i>Mother</i> , W. Amerikan. Var.
H. M. P. S.	1j. 604.	<i>Nelson's Ruhm</i> , M. Oct.—E. Nov., ein auffallend grosser Küchenapfel, in Gestalt dem Hausmütterchen ähnlich.
H. M.	644.	<i>Nonnenapfel</i> , doppelter.
H. P. S.	627.	<i>Northern Spy</i> , Dec.—Juni, gr., roth gestreift.
H.	654.	<i>Orbai-Apfel</i> , gr. Markt- und Wirthschaftsfrucht, wächst aus Stecklingen.
P. S.	1j. 610.	<i>Parmäne</i> , <i>Mabbot's</i> , Oct., mgr., fein gewürzt, reichtragend.
H. M. P.	1j. 573.	<i>Parmäne</i> , <i>Worcester-</i> , Aug.-Dec., ausgezeichnet durch ein glänzendes Roth und durch die Vollendung seiner regelmässigen länglichen Form, abknackend, saftreich, Geschmack milde und angenehm.
P. S.	609.	<i>Pepping</i> , <i>Cheshunt-</i> , Nov.—Febr., mgr., I. Qualität.
H. M. P. S.	1j. 592.	„ <i>Dr. Seelig's Orangen-</i> , ein sehr delikater Apfel, schön goldgelb wie eine Orange; allerersten Ranges.
H. P.	1j. 558.	„ <i>Geneva-</i> , Jan.—Mai, grosse, sehr schöne und ausgezeichnet gute einfarbige Reinette aus Nordamerika.
H. P.	1j. 577.	„ <i>Galloway-</i> , sehr gr., von schönem Aussehen und langer Dauer.
H. M. P. S.	1j. 593.	„ <i>Heuzen's Gold-</i> , ein sehr edler Winter-Apfel allerersten Ranges; sehr fruchtbar.
H. P. S. C.	1j. 569.	„ <i>Missouri-</i> , W., gross, roth, schön. Gute Marktf Frucht.
P. S.	1j. 633.	„ <i>Weisser</i> (White Pippin), Jan.—März, in Ohio und anderen d. westlichen Ver. Staaten viel gebaut und sehr geschätzt; dem Newtown Pippin ähnlich. Baum sehr starkwüchsig und tragbar.
H. P. S.	1j. 563.	<i>Peter Smith</i> , W., ausserordentlich fruchtbar, sehr haltbar, von ausgezeichnete Qualität.
P. S.	1j. 615.	<i>Primate</i> , amerikanische Sorte, soll ein ausgezeichnete mgr. Sommer-Dessert-Apfel sein; Baum fruchtbar und mässig stark wachsend.
H. P.	640.	<i>Quetier</i> , ein grosser weisser Apfel, ähnlich dem Weissen Calville.
H.	712.	<i>Rambour Papelen</i> , Nov. Febr.
H. M. P. S. C.	574.	<i>Rambour</i> , <i>Schorradt's</i> , extra gross.
P.	1j. 628.	<i>Red Canada</i> , mgr., roth, sehr zart, saftig und wohlschmeckend Wuchs mittelstark. Amerik. Sorte. Nov.—Mai.
H. M.	594.	<i>Reinette</i> , <i>Baseler-Gold</i> .
H. M. P. S.	1j. 598.	„ <i>Elsener pigeonartige</i> , Winter Apfel I Qualit mgr., süss-weinig.
H. M. P.	564.	„ <i>Hochfeine</i> , (R. superfine), Nov.—Mai; mgr., von sehr guter Qualit., als Hochstamm sehr fruchtbar.
H. M.	654.	„ <i>Kolvenbachs-Gold</i> , mgr., haltbarer später Winterapfel bester Qualit.
H.	652.	„ <i>Limperts-Gold</i> , schöner, mgr., wohlschmeckender Apfel. W.
H. M. P.	1j. 595.	„ <i>Lucas' Rambour-</i> , ein grosser ausgezeichnete Winter-Apfel. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
M. P. S.	1j. 596.	„ <i>Melcher's Rambour</i> , Wtr., gross, sehr haltbar; das dunkelgelbe Fleisch von ausgezeichnetem Wohlgeschmack.
H. P. S.	1j. 557.	„ <i>Neue Ananas</i> .
H. P.	584.	„ <i>New-Yorker</i> , **† W. mgr., Fl. gelb-weiss, fein, fest, von gutem weinigem Zuckergeschmacke; Baum sehr starkwüchsig
H. M. P. S.	1j. 597.	„ <i>Peter Heusgen's Gold-</i> , W., vortrefflich, nach Lucas eine der besten und schönsten Goldreinetten.
H.	711.	„ <i>Pigeonartige</i> .
H.	523.	„ <i>von Madeira</i> , **†† Dezbr.—März, Fl. gelblich weiss, fein, saftreich, von delicatem. gewürztem, süssweinigem Zuckergeschmack.
H.	656.	„ <i>Wein- von Binsfelds</i> , W., grosser, guter, länglicher Tafel- und Mostapfel.
H. P.	1j. 629.	<i>Rhode Island Greening</i> , Decbr., grosser guter Apfel.
H. M. P. S.	1j. 559.	<i>Rosenapfel</i> , <i>Hohenstaufener</i> , H., überaus schön bandirt, Ausstellungsfrucht
P.	1j. 630.	<i>Roxbury Russet</i> , Nov.—Juni, mgr., grünlich, säuerlich, sehr gute amerikanische Sorte.
H. M. P. C.	1j. 581.	<i>Safranapfel</i> , *†† Wtr., sehr schöner, haltbarer, vortrefflicher Winterapfel.
H. P.	1j. 611.	<i>Sämling</i> , <i>Thompson's</i> , Dec.—Febr., guter Dessertapfel.
H. M. P. S.	1j. 286.	<i>Sämling</i> , <i>Späth's</i> , Fr. mgr. Geschmack sehr süss und edel. Baum schwachwüchsig; die Sorte ist von meinem Vater aus Samen gezogen und vom Oberförster Schmidt, dem bekannten Pomologen benannt.
P. S.	1j. 620.	<i>St. Lawrence</i> , Octobr.
P.	551.	<i>Scaba Alma</i> , Herbst, eine tartarische Sorte.
P.	550.	<i>Schakar Alma</i> , tartarischer Apfel.
H. M. P.	575.	<i>Schöner aus Werder</i> , ein lebhaft roth gestreifter Herbstapfel von der Form der Berliner Schafsnase.

Äpfel. Birnen.

Bezeichn. d. vorrätb. Form	No.	
H. P. 1j.	613.	<i>Schöner aus Wiltshire</i> , (Wiltshire Beauty), Nov.—April, gr., ausgezeichnete Qualität.
H. P. S. 1j.	631.	<i>Seck-no-further</i> , Nov.—Febr., ein amerikanischer Apfel von ausgesuchter Güte, mgr.-gr., Baum starkwüchsig, alljährlich schöne Früchte bringend.
P. S. 1j.	621.	<i>Sherwood's Favorite</i> , gr., roth m. gelb, sehr gut.
H. M. P. 1j.	599.	<i>Siculai-Äpfel</i> , stammt aus Ungarn; nach Lucas zu den Rambouren gehörig; ein grosser, schön gefärbter Winterapfel.
H. M. P. 1j.	578.	<i>Säfstaholm</i> , Sept.—Oct., gr., länglich kegelförmig, stark carminroth gestreift, leicht abknackend, süss-säuerlich gewürzt. Baum fruchtbar und wuchshaft.
H. S. 1j.	571.	<i>Sondergleichen, Peasgood-</i> (P.-Nonsuch), Oct.—Dec., sehr gr. und sehr schön wie eine schöne Goldreinette von Hlenheim! ¹⁴
H. P. S. 1j.	572.	<i>Sondergleichen, Welfort-Park</i> , Nov., I. Qualität, erhielt ein Certificat I. Klasse durch die Londoner Gartenbaugesellschaft.
H. P. S. 1j.	607.	<i>Stenkyrk</i> , Nov.—April, mgr., rund, Fl. saftig, zart, von ausgezeichnetem Geschmack, Baum sehr fruchtbar, mässig starkwüchsig.
H. P. S. 1j.	618.	<i>Süsser aus Jersey</i> (Jersey Sweet), Sept. Oct., mgr., roth gestreift, zart, saftig und süss; guter Tafel- und Küchenapfel; reichtragend.
H. P. S. 1j.	600.	<i>Täubling, Graf Haller's Winter-</i> , Febr.—Mai, ein sehr schöner, edler Tafelapfel.
H. P. C. 1j.	632.	<i>Twenty-Ounce</i> , Winter, s. gr.
H. P. S. 1j.	612.	<i>Washington</i> , Sept.—Oct., gross, saftig, fein gewürzt.
H. 1j.	643.	<i>Wohlschmeckender</i> , Sommer, reichtragend.
H. M. P. 1j.	580.	<i>Yorkshire Beauty</i> , Aug.—Sept., 3 Zoll hoher und 3½ Zoll breiter Apfel für Küche und Markt. Gerippt, abgeplattet, gelb. Sonnenseite geröthet. Fl. zart, saftig, angenehm säuerlich.



Birnen.



Die Hochstämme sind alle auf Birnenwildlinge veredelt.

Von Formbäumen sind alle Sorten, welche auf Quitte gedeihen, auf diese Unterlage veredelt, die übrigen auf schwachtreibende Wildlinge.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hochstamm, M. = Mittelstamm, P. = Pyramide, S. = Spalier, C. = Cordon, 1j. 1jährige Veredlung auf Quitte abgebar ist.

Preise.

Hochstämme , sehr schöne mit guten Kronen, ca. 1,90 mtr. Stammhöhe und ca. 6—8 cm Stammumfang auf 1 mtr. Höhe gemessen	
do. extra Auswahl, ca. 8—10 cm. Stammumfang	
Mittelstämme , 1,25 mtr. Stammhöhe	
Schnurbäumchen , (Cordons) M. 0,90 bis	
Pyramiden M. 0,75 bis	
Spalierbäume , Palmetten mit 1 Etage	
do. mit 2 Etagen	
do. mit 3 Etagen	
Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend	
do. do. auf Wildling	

pr. Stück	pr. 100 St.	pr. 1000 St.
M.	M.	M.
1,50	135	1300
2—2,50	170	1600
1,20	110	1000
1,25	80—100	
4,—	65—300	
1,50	125	
2,75	250	
4,—	—	
0,50	45	
0,70	—	

Bezeichn. d. vorrätb. Form	No.	
P. S. 1j.	184.	<i>Alexandrine Douillard</i> , * Oct.—Nov.
P.	710.	<i>Amandine de Rouen</i> .
H. 1j.	293.	<i>Ambrette-Sommer</i> , **† September.
P.	677.	<i>America</i> , **† Nov.—Dec.
P.	266.	<i>Andenken an Bouvier</i> , *† Ende Oct.—Nov.
H. M. P. S. C. 1j.	768.	<i>Andenken an den Congress</i> , (Souvenir du Congrès), ** Aug.—Sept. Fr. s. gr., auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe, Fl. weiss, saftreich, hlbschm., fein parfümirt, Dauer der Frucht 5—6 Wochen.
S.	712.	<i>Angélique Leclerc</i> .
H. M. P. 1j.	235.	<i>Angevine, Schöne</i> , (Belle Angevine), † Dec.—Jan., Fr. gr., Fl. abknackend, Baum kräftig und fruchtbar, verlangt nahrhaften Boden.
H. M. S.	701.	<i>Anna Audusson</i> , * bis ** Oct.—Nov., zieml. gr.
H. M. P. 1j.	23.	<i>Annabirne</i> , **† Aug., Fr. mgr., schm.; Baum kräftig und reichtragend,

Birnen.

Bezeichn. d. vorräth. Form	Nr.	
M	296	Apothekerbirne , Sommer, *†† Anf.—Mitte Sept. gr. ist zu allen Zwecken sehr gut zu verwenden und gekocht ganz delicat.
H. M.	10	" Winter- , (Winter-Gutechristbirne), † Decbr.—März. gute grosse Haus-haltsfrucht; Baum wächst lebhaft und ist sehr fruchtbar. will aber nahrhaften, leichten Boden und warmen Stand.
H. M. P. S.	1j. 773	Augustbirne , Diel's, *†† Anf.—Ende Aug. mgr.
H. M. P.	46	" Baronsbirne , †† Jan.—April. Fr. gr., abknackend, saftreich, von zimmt-artigem Zuckergeschmack, wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft und trägt sehr reich.
H. M. P.	1j. 81	" Bergamotte , Deutsche National-, (Belle et Bonne), **† Oct. Fr. gr., von erhabenem Geschmack; wird schnell mehlig und teig, muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut.
P.	407	" Donauer's , *† M.—E. Oct., mgr.
H. M. P. S.	1j. 122	" Esperen's , (Bergamotte d'Esperen), ** März—Mai. Fl. schmelzend, stark gewürzt; Baum pyramidal.
H. M.	67	" Hertrich , ** Jan.—Mai.
H. M.	824	" Lübecker , Sommer, **† Sept.—Oct. Fl. fein, von bestem Geschmack.
H. M. P.	250	" Poiteau , **†† Herbst. Fr. ausserordentlich schmelzend, fein gezuckert.
H. M.	1j. 68	" Rothe , *†† Anf. Oct. 3 Wochen, für alle Lagen empfehlenswerth.
H. M. P.	1j. 850	" Sannier , mgr., Fl. fein und köstlich, hält sich bis zum Mai.
P. S.	1j. 851	" Beurré amandé , mgr., zartschalig; Fl. ausserordentlich fein, nach Mandeln schmeckend, reift im November.
P. S.	1j. 852	" Henri Courcelle , mgr., graugrün, Fl. sehr fein, von ganz eigenthümlichem und ausgezeichneten Geschmack.
H. M. P.	1j. 879	" Brockworth-Park , Nov.—Dec. schöne und gute Birne aus England.
H. M. P. S. C.	1j. 158	" Butterbirne , Amanlis -, (Beurré d'Amanlis), *†† Sept. Fr. gr., fein schmekend, Baum treibt kräftig und trägt reichlich.
H. M. P. S.	1j. 284	" Bachelier's , ** Oct.—Nov. S. schätzenswerthe feine Tafelfrucht.
P.	650	" Bennert's , * oder ** Dec.—Febr.
H. M. P. S. C.	1j. 59	" Blumenbach's (Soldat Laboureur), *†† Nov., Fr. gr. u. schmelzend; Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann.
H. M. P. S.	1j. 47	" Clairgeau's , (Beurré Clairgeau), **† Nov., zuweilen bis Jan. Fr. gr. von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage.
H. M. P. S.	1j. 4	" Coloma's Herbst- , (Beurré Coloma, Coloma d'automne, Poire Urbaniste), **† Oct. Fr. mgr., saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist besonders für Pyramiden zu empfehlen.
H. M. P. S. C.	1j. 25	" Diel's , (Beurré Diel), **†† Ende Nov.—Decbr., sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagt von ihr: „Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen.“
H.	39	" Englische Sommer -, **† M.—Ende Septhr.
P. S.	1j. 779	" Februar -, ** Frühjahr.
H. M. P. S.	1j. 77	" Gellert's (Beurré Hardy), ** Oct. mgr. schm.
H. M. P. S. C.	1j. 118	" Ghelin's (Beurré Ghélin), **† Nov.; Fr. mgr. von delikatem Geschmack.
H. M. P.	1j. 100	" Giffard's , ** Juli—Aug. Fr. mgr., Fl. sehr fein, saftreich, schm. und angenehm süss; Baum schwachwüchsig. gedeiht nur in leichtem, nahrhaften Boden.
P.	321	" Goubault's , *† Sept.
H. M. P.	692	" Graue Herbst -, (Beurré gris), **†† Oct., eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überfliegend butterhaft mit feiner Muscatellersäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden, wird leicht krank.
H. M. P. S.	2	" Grumkower , (Grumkower Winterbirne), **† Nov. Fr. gr., saftig und angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeinen Anpflanzung sehr zu empfehlen, auch für Alleen geeignet.
H. M. P. S.	1j. 8	" Hardenpont's Winter -, (Hardenpont d'hiver, Beurré d'Hardenpont), **†† Novbr.—Jan. Fr. gr., eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten nahrhaften Boden.
H. M. P. S.	1j. 220	" Hochfeine , (Beurré superfin), *†† Oct.—Nov.; mgr., butterhaft, fein gewürzt.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
H. M. P.	1j. 76.	Butterbirne, Holzfarbige , (Fondante des bois), **†† Oct. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross.
P. S.	1j. 704.	" Konning's , (Beurré de Konning), ** A.—E. Oct.
H. M. P. S.	1j. 7	" Liegel's Winter- , (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne), **† Decbr.—Jan. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut und ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
H. M. P. S.	1j. 49.	" Knight's Herbst-
P.	560.	" Millet's , (nicht — Millot de Nancy).
H. M. P. S.	1j. 5.	" Napoleon's , (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon), **†† Ende Oct.—Nov. Fr. mgr., sehr saftig, von erhabenem Geschmacke. Baum ist ausserordentlich fruchtbar und zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.
P.	649.	" Paridan's , ** Nov.
P.	673.	" Robert's , **† E. Oct.
H. M. P.	1j. 267.	" Six's , ** Novbr.—Decbr.
H. M. P. S. C.	1j. 149.	" Sterkmans , (Beurré Sterkmans), ** Novbr.—Jan.; mgr., saftreich, von gewürztem, weinigen Zuckergeschmack; Wuchs kräftig.
S.	121.	" Van Mons , (Poire Van Mons) **! H. gr., stark rothbraun berostet, schmelzend, angenehm gewürzt. Für Formbäume und warme Lagen geeignet.
P.	431.	" von Montgeron , * E. Sept.—Oct.
H. M. P.	1j. 1.	" Weisse Herbst- , (Beurré blanc), **† Oct., Fr. gr., saftreich und butterhaft. Baum wird mittelgross und wächst auch auf feuchtem, sandigen Boden.
H. M. P. S.	1j. 91.	" Weisse Sommer- , (Beurré blanc d'été), **† E. Sept.—Oct.
H. M. P. S.	3.	Capiaumont , (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont, Carthäuserin), **†† Octbr., Fr. mgr. und sehr wohlschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet.
H. P.	230.	Charles de Basiner .
P.	1j. 221.	Charlotte von Brouwer , ** Octbr.—November, ist als gute Tafel- und Haushaltungsf Frucht zu empfehlen.
H. M. P. S. C.	1j. 41.	Christbirne, Williams' , (Bonchrétien Williams), **† Sept., Fr. gr., sehr feinschmeckend; Baum bleibt in jed. Bod. ges. u. liefert reiche Ernten.
H. M. P. S.	1j. 181.	Colmar Arenberg's , **†† Nov., gr. citronengelb, schmelzend, delicat; besonders für leichten nahrhaften Boden und als Formbaum passend.
P.	686.	" Delahaut's , * Dec.—März.
H. M.	441.	Comperette , **† Herbst, Fl. sehr butterhaft, von herrl. Zimmetgeschmack.
H. M. P.	1j. 873.	Comtesse Clara Frijs , Sept., neue und vorzügliche Tafelbirne aus Dänemark; Baum sehr kräftig, dauerhaft und tragbar.
P.	738.	" de Chambord .
H. M. P.	919.	Confesselsbirne, Rothe (Isambert) , Novemb., Fleisch mattweis bis gelblich, saftreich, schmelzend, von fein weinig gezuckertem, alantartigen delie. Geschmack. Baum ges. u. kräft., auch im Sandboden s. fruchtbar.
H. M. P. S.	74.	Crasanne , (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne), **† Oct.—Nov., Fr. platt, Fl. butterhaft von delic., fein säuerl. Geschmack; Wuchs kräftig.
H. M. P. S.	1j. 167.	" Neue , (Surpasse Cras.), * E. Oct. 3 Wochen.
P.	448.	Dechantsbirne, Defai's , ** Oct.
P.	150.	" Goubault's , * Nov.—März, Fl. fest doch schm., von gewürzreichem weinigen Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar.
H. M. P.	70.	" Jamin's .
H. M. P.	1j. 829.	" Juli- , (Doyenné de juillet), ** Ende Juli.
H. M. P.	1j. 65.	" rothe , **†† Herbst, eine der schätzenswerthesten Tafelfrüchte von köstlichem zuckerartigen Geschmack, gewürzhafter als bei der weissen Herbstbutterbirne. Selbst in ungünstigen Sommern bildet dieselbe sich vollkommen aus.
H. M. P. S.	1j. 12.	" Schmidt's Sommer- .
H. M. P. S.	1j. 206.	" Vereins- , (Doyenné du Comice), ** Oct.—Nov.
P. S.	1j. 742.	" von Alençon , **†† Nov.—März, Fl. zimmetartig süss, von bergamottartigem Geschm. Sehr fruchtbar, darf nicht zu spät gebrochen werden.
H. M. P. S.	1j. 19.	" Winter- , (Pastorale, Doyenné d'hiver, Pentecôte, Grüne Winterherrenbirne), **† Dec.—März, Fr. gr., saftig, von Muskatellergeschm. Anf. Oct. zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.
P.	572.	Delvigne , (? — Kampervenus).

Birnen.

Bezeichn. d. vorrath. Form	No.	
P.	222	Dix (Madame Dix) * Oct.
P.	1 j. 744	Doyenné erotté (Graue oder Beschmutzte Dechantsbirne).
H. M.	796	Eierbirne, Sommer-, **† S.
H. M.	331	" Woltmann's, **† Aug.
H. M.	88	Eifersüchtige, Französische, ** Oct.—Nov., Fl. s. fein, saftreich, angenehm, weinigsüss mit viel Gewürz. Baum für alle Lagen brauchbar.
P.	806	Enghien, *† S.
H.	248	Erzbischof von Hons, ** M.—E. Aug.
P.	335	Erzherzogsbirne, **† S.
H. M. P.	1 j. 136	Esperine , ** Ende October, schätzbare Tafelfrucht.
H. M.	766	Feigenbirne, Holländische, **† Ende September.
P. S.	1 j. 168	" von Alençon, * bis ** Nov.—Dec.
H. M. P.	20	Flaschenbirne, Bose's, (Beurré d'Appremont, Calabasse Bose), **† Oct.—Nov., Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark und ist fruchtbar, verlangt leichten warmen Boden.
P.	1 j. 72	Fleur de neige, Nov., sehr schön gefärbt.
P.	854	Fondante des emmurées, M. Sept., mgr., hellgelb, schmelzend parfümirt.
H. M. P. S.	1 j. 6	Forellenbirne , (Poire Truite), **† Nov.—Jan. Fr. mgr. und sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.
H. P.	1 j. 921	Franzmadame, **† Ende Juli, vorzügliche Tafel- und Marktrucht.
H. M.	1 j. 147	Fulvie, Neue, ** Nov.—Jan., Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.
H. M.	64	Gaishirtenbirne, Stuttgarter , (Langgestielte Stuttgarter Russelet), **† Aug. Fl. butterhaft, vollaftig mit zimmetartigem Geschmack, eine der feinsten Sommerbirnen. Baum pyramidal, reichtragend.
H. M.	1 j. 73	General Tottleben, ** Decbr.—Febr., Fr. sehr gross, saftreich.
H. M. P.	1 j. 877	Graf Moltke, October, sehr grosse, edle Birne, zimmetgelb mit feinem Rost überdeckt. Baum sehr tragbar.
H. M.	1 j. 970	Grunbirne, Späte, ** Sept.—Oct., sehr gute Wirthschaftsbirne zum Kochen und Backen.
H. M. P. S.	1 j. 14	Gute Graue , (Sommer Beurré gris, Schöne Gabriele), **†† Sept., Fr. kl. von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar, Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.
H. P.	1 j. 875	Gute Louise, Späte, Jan.—April, Fr. ziemlich gr., von guter Qualität, Baum sehr fruchtbar, verlangt warmen Boden.
H. M. P. S.	1 j. 139	Gute Louise von Avranches , (Louise bonne d'Avranches), ** Sept.—Oct., Fr. gr., sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar, verdient im Grossen angepflanzt zu werden. Unempfindlich gegen strenge Kälte.
H. M.	584	Hasenkopf, Rother, †† W.—F.
H.	586	Henriette Bonvier, ** Nov.—Jan.
H. M. P. S. C.	1 j. 43	Herrenbirne Esperen's , (Seigneur d'Esperen, Oberdieck's Butterb.), **† Sept.—Oct., Fr. mgr., delikat schmeckend, Baum wächst schön pyramidal, rasch und gesund, wird früh tragbar.
H. M. P. S.	1 j. 128	Herzogin von Angoulême , (Duchesse d'Angoulême), ** Nov.—Dec., sehr gross , butterhaft, v. süßem zimmetartig gewürzten Geschmack. Eine wegen ihrer Grösse sehr geschätzte Birne; doch wird sie in schlechten Jahren und an jungen Bäumen oft grobkörnig.
H. M. P. S.	1 j. 450	Herzog von Nemours, ** Oct.—Nov.
H. M.	1 j. 874	Himmelfahrtsbirne, (de l'Assomption), Aug., gr., neu und vortreflich, Baum trägt bald und reich.
H. M. P. S.	1 j. 154	Hofrathsbirne , (Conseiller de la cour), ** Oct.—Nov., mgr.; eine ausgezeichnete Tafelfrucht.
H. M.	868	Honigbirne, Ostpreussische, **†† Aug.—Sept., eine mgr., in Ostpreussen sehr verbreitete Birne. Baum sehr starkwüchsig und winterhart.
P.	108	Houx de Fortune.
H. M. P. S.	1 j. 38	Hoyerswerdaer, Grüne, **†† Aug.—Sept., Fr. mgr., Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.
H. M.	346	Jacobsbirne, Hannover'sche , †† Aug., sehr reichtragend.
P.	45	Jamiette, † W.
P. S.	1 j. 253	J. J. Gilain, ** Sept.—Dec., sehr gross.
H.	643	Johann de Witte, (Passe Colmar français), * Jan.—Febr.
H. M. P. S.	1 j. 153	Josephine von Mecheln , ** Jan.—März, Fl. fein saftreich, wenig süßer, schwach gewürzter Geschmack.

Birnen.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
P. S. 1j.	112.	Jules de Liron d'Airoles, (Leon Leclerc). **! Fr. mgr., von ausgesucht feinem Geschmack.
H. P.	604.	Martin, (Martin Sire). † Jan.—Febr.
H. M.	22.	Kampervenus , (Kamper Peer), †† Nov.—Febr., mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich und kommt in jedem Boden fort.
H. M.	9.	Katzenkopf, Grosser , (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac). †† Nov.—Mai, Fr. sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.
H. M.	82.	Klevenower; *† M. Aug., 3 Wochen, mgr., muskatellerartig, in Pommern vielfach zum Einmachen benutzt. Baum sehr starkwüchsig u. bart.
H. M.	969.	Knausbirne, †† Sept., ausgezeichnete Backbirne.
H. M. P. S. 1j.	104.	Königin der Birnen, (Reine de poires), ** Oct.—Decbr., mgr., saftreich, etwas körnig, halbschmelzend, von angenehm gewürtem Zuckergeschmack.
H. M. P. S.	16.	Köstliche von Charneu , (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delices de Charneu). **† Oct.—Nov., Frucht gr. u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen, nährhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet.
H. M. S.	21.	Kuhfuss †† Sept., Frucht gross, für den Haushalt schätzbar u. die beste Birne zum Backen. Baum wächst sehr stark, wird gross und alt, gedeiht in schwerem und leichtem Boden
P. 1j.	750.	Laberond.
H. M. P. S. 1j.	61.	Leckerbissen. Hardenpont's, (Délices d'Hardenpont). **! Oct., Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.
H. M. P. S. 1j.	127.	Leckerbissen von Jodoigne, (Délices de Jodoigne). ** E Sept.—Oct., Fr. mgr., schmelzend und gezuckert
H. M. P. 1j.	116.	Léon Grégoire , ** Decbr.—Jan., vorzügliche Tafelbirne. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. M. P. 1j.	881.	Liebling, Morel's, Nov., gr. I. Qual., Baum sehr kräftig und fruchtbar.
H. M. P.	881.	Louis Dupont, (hier nicht Coloma's Butterb.)
S.	855.	Louise- bonne Sannier, Jan.—Febr., später als die gute Louise von Avranches, sonst ebenso schön und gut.
H. M. P. S. 1j.	866.	Lucy Griève, Oct., gr., citronengelb, Sonnenseite geröthet, überall rostfleckig, sehr saftreich und schmelzend.
P. S.	106.	Madame Elisa. ** Oct.—Nov., Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.
H. P.	942.	(249.) Madame Treyve , **† Septbr., früh- und reichtragend, delicate Frucht, die selbst in trockenem Boden an Fülle und Süssigkeit des Saftes der „Köstlichen von Charneu“ gleich steht.
H. M. P. S. 1j.	29.	Magdalene, Grüne, (Grüne Margarethenbirne), **† Juli, wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.
H. M. P. S. 1j.	109.	Maibirne, de Jonghe's, **† Mai, eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbar.
H. M. P. 1j.	871.	Schmidtman's.
H. M. P. 1j.	924.	(801.) Marie Luise , (Duquesne), **† Oct.—Nov., Fr. gr. u. delicat. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas empfindlich.
H. M. P. S. 1j.	92.	Markgräfin, (Marquise d'hiver), **† A. Nov.
H.	832.	Marotte, (? — Regentin).
H. M.	979.	Mangelbirne.
H. M.	878.	Marschall Vaillant, Jan.—März, gr., und der Diel's Butterbirne ähnlich, fein schmelzend; Baum sehr kräftig und fruchtbar. Vortrefflich!
P.	658.	Mary von Borchers.
H. M. P. 1j.	490.	Melonenbirne, Hellmann's , **† Herbst—Winter.
P.	834.	Meuris, Winter-, (Nec plus Meuris), ** W.
P.	491.	Millot von Nancy, *† H.
H. M. P. S. 1j.	102.	Mundnetzbirne, Runde , **† End. Aug.
H. M. P. S.	26.	Muskateller, **† vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.
H. M. P. S. C. 1j.	357.	„ Französische, *† S.
H. M. P. S. 1j.	18.	Nelis, Winter- , (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines), ** Dec.—Jan., Fr. mgr., schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh und reichlich.
H. M. P. S. 1j.	48.	(361.) Nina, (Butterbirne von Yelles), ** Aug., als Tafelfrucht sehr schätzbar.
P. S. 1j.	130.	Pastorenbirne, (schöne Andrine), *† Novb.—Febr., sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.

Birnen.

Bezeichn. d. vorrätth. Form	No.	
P. S.	1j.	767. Pennsylvania, A. Oct., ziemlich gross.
H. M.		959. Petersbirne, Aug., sehr gute sächsische Localsorte.
H. M. P.		870. Pfalzgräfin, Kleine, *†† M. Sept., sehr gute Marktf Frucht, in der Gegend von Meiningen ausserordentlich beliebt; starkwüchsig.
H. M. P.		503. Pfundbirne, Grüne, †† A., Oct., 14 Tage.
P.		636. Philadelphia, Aug., Fr. gross.
H. M. P. S.	1j.	69. Philipp Goes, (Baronne de Mello) , ** Oct.—Dec., Fr. mgr., von gewürzreichem Geschmack. Baum wächst lebhaft und ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort.
H. M. P. S.	1j.	177. Philippsbirne, Doppelte, (nicht Beurré de Mérode), Double Philippe, ** Oct., Fr. gr., vortrefflich im Geschmack.
H. M. P. S. C.	1j.	57. Poiteau, Neue , ** Oct.—Nov., Fr. gr., delikater; auch für nördlichere Gegenden.
H. M.		611. Pommeranzenbirne, Winter.
P. S.	1j.	245. Präsident Müller.
P. S.	1j.	246. " Royer.
P. S.	1j.	244. " d'Osmonville. ** Nov.—Dec., Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
H. M. P. S.	1j.	887. " Drouard, März—Mai, gr. bis sehr gr., allerbesten Qualität und sehr fruchtbar; Baum starkwüchsig auf Wildling wie auf Quitte.
P. S.	1j.	111. Princesse impériale de France, ** Oct., Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
H. M. P.	1j.	141. Prinzessin Marianne, **† H.
P.	1j.	247. Professor Henau.
H. M. P.	1j.	941. Queenbirne , ††, Nov.—Apr., gute Wirthschaftsfrucht. Baum bildet schöne Kronen.
H. M. P.		17. Regentin , (Passe Colmar, Colmar souverain), **†† Dec.—Febr., Fr. gr., schätzenswerthe Winterbirne, Baum wächst mässig. eignet sich für geschützte Lagen.
H. M.		75. Rettigbirne, Leipziger, *††† E. Aug.—M. Sept.
H. M.		78. Rietbirne, Grosse, † gr., E. Sept.
H. M.		971. Rommelter, Grosse, †† Oct., eine der besten Most- und Wirthschaftsbirnen.
S.		279. Rostiezer, **† Aug.—Sept.
H. M.		613. Rouse Lench, * W., kreiselförmig, sehr reichtragend.
P.		507. Russelet, Bivort's, ** Oct.—Nov.
P.		759. " Van der Wecken, ** Oct.—Nov.
H.		614. " Winter.
H. M. P. S. C.		156. St. Germain, (St. Germain d'hiver), **† Nov.—Jan., Fr. gr., von angenehmem erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden.
H. M. P. S.	1j.	24. Schmalzbirne, Römische, (Tafelbirne, Beurré romain), **††† Aug.—Sept., Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross und trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.
H. M. P.	1j.	522. Schwesterbirne , (deux soeurs), ** Oct.—Nov.
H. M. P.	1j.	35. Seckelsbirne , **† Oct., eine der besten Tafelfrüchte. Baum trägt gern und sehr reichlich.
P. S.		698. Siebenbürgerin, (Transsylvanienne), * Sept.
P.		620. Soeur Grégoire.
H.	1j.	377. Sommerbirne, Grosse britische, *† Sept.—Oct.
P.		381. " Zartschalige, *†† Aug. 14 Tage.
H. M. P. S. C.	1j.	13. Sommerdorn, Punktirter , (Epine d'été), **††† Sept., Fr. mgr. und delikater; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.
P.		856. Souvenir de Sannier père, Oct., mgr., dunkelgelb mit rosa geflammt; herrliche und feine Frucht.
H. M. P. S.	1j.	239. Späte von Toulouse, (Tardive de Toulouse, Duchesse d'hiver), **† März—April, Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüten sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte. Reift nur in sehr warmer Lage.
H. M. P.	1j.	922. Sparbirne, **† Aug., schätzbare frühe Tafel- und Marktf Frucht.
H. M.		40. Sylvester, Herbst-, (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Würtemberg, König von Württemberg), **†† Oct., Frucht gr., eine feine Tafelbirne. Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.
H. M. P. S.	1j.	11. Tafelbirne, grüne , (Fürstliche Tafelbirne), **†† S.
P.		524. Theodor van Mons, *† Oct.—Nov.
H. M. P. S.	1j.	255. Thompson, **† Oct.—Nov., Fl. delikater süssweinig; Baum v. mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.

Birnen. Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Bezeichn. d. vorrätth. Form	No.	
H. M. P.	1j. 87.	Tongres, Birne von, (Poire de Tongres), **! Oct.—Nov. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süßem Geschmack und schmelzendem Fl.; Fr. gr.
H. M. P. S	137.	Triumph von Jodoigne, ** Nov.—Dec. Fr. gr., vortrefflich.
P.	762.	Tygrée Janvier.
P.	718.	Victoria.
H. M. P. S.	1j. 94.	Virgouleuse, ** oder *† W.
H. M.	79.	Volkmarsen, *†† E. Sept.—Oct.
H. M. P.	84.	Wildling von Montigny, (Besi de Montigny), ** Oct., Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.
H. M. P. S.	1j. 15.	„ von Motte, (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte), **† Octbr.—Novb, Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
P.	1j. 758.	Winterbirne, Königliche, (Royale d'hiver), † — * Nov.—Dec.
P.	633.	Schönste, † Dec.—März.
H. M. P. S.	1j. 103.	Zéphirin Grégoire, **†† Nov.—Jan., delikate Tafelfrucht.
P.	1j. 390.	Zuckerbirne, Heyer's, *†† Sept.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

<i>Einjährige Veredlungen (in allen Sorten)</i>	p. Stück M.	1.—
<i>Pyramiden oder 2—3jähr. Veredlungen (in den mit P. bezeichneten Sorten)</i>	„	1.50
<i>Spaliere</i>	„	2.—
<i>Mittelstämme</i>	„	1.75
<i>Hochstämme</i>	„	2.50


Bezeichn. d. vorrätth. Form	No.	
H. M.	891.	<i>Alexandrine Mas</i> , Febr.—März, gr., I. Qual., Form wie „William's Christbirne“, Baum starkwüchsig.
H. P. S.	931.	<i>Anna de Bretagne</i> , Nov.—Jan., mgr.—gr.; schön gefärbt, Fleisch schmelzend, pikant gewürzt; allererster Qual.
H. M.	1j. 932.	<i>Armand Morel</i> , März—April, diese ausgezeichnete, stets zarte und schmelzende Frucht ähnelt in Geschmack und Consistenz d. Fleisches d. Hardenpont's Butterb. Baum starkwüchsig, sehr fruchtbar.
H. M.	961.	<i>Auguste Droche</i> , Jan.—März, sehr schöne Fr., fein schmelzend.
H. P. S.	1j. 950.	<i>Bartlett</i> , Sept.
H. M. P. S.	1j. 889.	<i>Belle des abrés</i> .
M. P.	888.	„ <i>de Beaufort</i> .
M.	893.	„ <i>d'Ecully</i> , Sept., gross.
H. M. P. S.	1j. 908.	„ <i>de juillet</i> , M. Juli, vortreffliche frühe Birne.
H. M.	1j. 933.	<i>Bergamotte tardive Collette</i> , März—Mai, I. Qual., stammt von der Dechantsbirne von Alençon.
H. M.	918.	<i>Beurré Chaboccean</i> .
H. M.	960.	„ <i>Chaudy</i> , ** Oct.—Dec., s. gr., Fleisch s. fein schmelzend.
H.	984.	„ <i>de Mérode</i> , Oct., sehr gross.
H. M. P.	899.	„ <i>Hugé</i> , Frucht mittelgross, schmelzend, saftreich, allerersten Ranges.
H. M. P.	934.	„ <i>perpétuel</i> , Sept., mgr., Fl. fein und schmelzend, soll stets zweimal blühen; zweite Frucht jedoch nicht so vollkommen wie die erste.
H. M. P.	894.	<i>Bijou</i> , August—Sept., s. schön gefärbt.
H. P.	944.	<i>Bonchrétien Frédéric Baudry</i> , Febr.—März, mgr., fein gewürzt und gezuckert, I. Qual.
H.	945.	<i>British Queen</i> , **† Oct.—Nov. allerersten Ranges
H. M. P.	927.	<i>Butterbirne, Dilly's</i> , Oct., Fr. gr., Fleisch fein butterhaft, von s. gewürzreich weinartigem Zuckergeschmack.
H. M. P.	928.	„ <i>Dumont's</i> , ** Oct., Fr. gr., fein, gleichfalls sehr gewürzhaft und süß.
H. M.	1j. 968.	„ <i>van Geerts</i> , **† Oct., Fleisch gelblich, fein, saftreich, schmelzend, Wuchs rasch und schön pyramidal.
H. M.	1j. 966.	„ <i>von Alagér, schwarze</i> , eine neue aus Persien erhaltene Sorte.
H. M. P.	935.	<i>Calixte Mignot</i> , ** Oct.—Nov., Fr. gr., schmelzend.
H. M. P. S.	910.	<i>Canada, du</i> .

Birnen. Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
M. P.	903.	<i>Charles Delatin</i> , Nov., kegelförmig, dunkelgelbgrün, heller marmorirt und punktirt; schmelzend, saftreich, gezuckert, delikat. Allerersten Ranges!
H. M. P. S.	909.	<i>Chaumontel d'été</i> , Aug., gr.—s. gr., dunkelgrün mit braun, an der Sonnen-seite dunkelroth; Fl. schmelzend, saftig gezuckert, angenehm parfümirt. Sehr fruchtbar.
H. M. P. S.	906.	<i>Chevalier Everard</i> , Nov., grün, in völliger Reife goldgelb, rostfarbig punktirt und marmorirt; saftreich, butterhaft, von ausgezeichnetem Gewürz.
H. M. S.	880.	<i>Claude Blanchet</i> , Juli, kl.—mgr.; gute, reichtragende Frühbirne.
H. M. P.	905.	<i>Conseiller Pardon</i> .
H. M.	895.	<i>Courte queue d'hiver</i> , Ende Winter, gr. oder s. gr., rundl.-oval, von sehr guter Qualität. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. P.	1j. 946.	<i>Curé Carnoy</i> , Dec., mgr., schmelzend, von sehr fein gewürztem Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. P.	936.	<i>Délices d'Avril</i> , April, mgr., schmelzend, fein gezuckert u. saftig; aus-gezeichneter Qual.
H. M.	977.	<i>Duchesse Pitmaston</i> , sehr grosse Frucht.
H.	973.	<i>Doctor Lucas</i> , Herbst, s. schön u. gut; sehr saftreich, vorzügliche Qualität.
H. M.	1j. 963.	<i>Docteur Reeder</i> , Nov., mgr.
H. M. S.	1j. 900.	<i>Dorothee Couvreur</i> , Oct.—Jan.; mgr., saftreich, I. Qual.
H. M. P. S.	937.	<i>Fertility</i> , ein Sämling von Goubault's Butterb., Frucht grösser und besserer Qualität als die letztere. Auf Quitte sehr starkwüchsig und reich-tragend.
H. M. P.	1j. 957.	<i>Frederick Clapp</i> , eine neue amerikanische Sorte; M. Oct.—A. Nov., mgr.—gr., citronengelb, sehr saftig und schmelzend, von erfrischendem, reich aromatischen Geschmack; wird als von vorzüglicher Qual. empfohlen, p. St. 2,50 M.
H. P.	925.	<i>Fromental</i> .
P.	860.	<i>Gulabi</i> , buttrige
P.	861.	„ späte
H. P.	862.	„ <i>Wandami</i> ,
H. M. P.	1j. 958.	<i>Hoosie</i> , Oct. Fr. gr., gleicht einer Diel's Butterb., Fl. fein schmelzend, s. saftig, eine der besten Einführungen aus Amerika.
H. M. P.	1j. 948.	<i>Ingenieur Wolters</i> , **! October, Frucht allererster Qual.
H. M. P. S.	1j. 896.	<i>Jonas d'hiver</i> , Winter, aus Ost-Tennessee. Gross, braun, länglich; aus-gezeichneter Qualität.
H. M. P.	1j. 955.	<i>Jones</i> , Jan., mgr., Fleisch butterhaft, süss und saftig. Baum starkwüchsig, pyramidal. Eine auf den Märkten von Philadelphia und Boston sehr gesuchte und theuer bezahlte Frucht.
H. M. P.	1j. 915.	<i>König Christian</i> , Oct.—Nov., gr., Fl. gelb, schmelzend, von angenehm süss-säuerlichem Geschmack, I. Qual. Baum sehr fruchtbar, starkwüchsig, schöne Pyramiden bildend.
H. M. P. S.	1j. 907.	<i>Köstliche von Svijan</i> , diese neue Birne erhielt ich vom Baumschulbesitzer Rosenthal in Wien, der sie mit ganz besonderer Empfehlung in den Handel gab. Frucht mgr., December.
H. M. P.	956.	<i>Lawrence</i> , W.
H. M.	938.	<i>Lehon-Grignon</i> , ** Febr.—April, gr., einer Vereins-Dechantsbirne ähnlich.
H. M. P.	1j. 929.	<i>Lieblingsbirne, Clapp's</i> **††! Aug., gr., s. schön, fruchtbar, vortreffliche Sommerbirne.
H. M.	1j. 972.	<i>Mudame Hutin</i> , ** mgr. W.
H. M. P. S.	911.	<i>Mademoiselle Blanche Sannier</i> , Oct., gr., länglichkegelförmig, fein, schmelzend. Baum sehr starkwüchsig.
H. M. P.	1j. 871.	<i>Maibirne, Schmidtman's</i> W.
H. M. P.	897.	<i>Solange</i> . Die früheste Birne.
M. P.	952.	<i>Manning's Elizabeth</i> , Sommer, Fr. mgr., Fl. saftig u. schmelzend.
H. M. P.	902.	<i>Monseigneur Gravez</i> , Nov.-Febr., mgr. oder gr., sehr schmelzend und saftig, von herrlichem Gewürz.
H. M. P. S.	1j. 930.	<i>Olivier de Serres</i> , **† Febr.-März, mgr., s. gut, Fleisch schmelzend, fein gewürzt, riechend.
H. M. P.	920.	<i>Pfingstbirne, Hecke's</i> .
H. M. P.	1j. 901.	<i>Philipp Couvreur</i> , Winter, mgr., saftig, schmelzend, I. Qualität.
H. M. P.	912.	<i>Président d'Estaintot</i> , ausserordentlich fruchtbar, I. Qual., Frucht in Büscheln. Sämling von Blumenbach's Butterb.
H. M. P.	913.	<i>Président Pouyer-Quertier</i> .

Birnen. Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
H. M. P. S. 15.	290.	Minister Dr. Lucius , (Späth)., **†† Oct. – Nov., ausserordentlich grosse und sehr schöne Frucht von vorzüglichem feinen Gsschmack. Muss zeitig gepflückt werden. Baum sehr fruchtbar, à St. 1 M. theurer als vorn angegeben.



Minister Dr. Lucius. (Späth.)

H. P.	882.	Prinz Waldemar , Oct.—Dec., ziemlich gr., längl. grünl.-weiss, leicht gelb gezeichnet, Fl. ausserordentlich schmelzend, von fein gezuckerter Säure.
H. M. P. S.	914.	Prud'homme , Sept.—Dec., ähnlich der Guten Louise von Avranches, fruchtbar und starkwüchsig.
H. M. P.	939.	Reine des vergers , grosse, schöne Frucht, ähnlich der Dechantsbirne von Mérode; in Büscheln und sehr reichtragend. Gedeiht nicht auf Quitte.
H. M.	964.	Sabine Vermorel , Sept.—Dec. Fr. kl., saftig, schmelzend, zuckerartig mit etwas Säure.

Birnen. Japanische Sorten. Kaukasische Sorten. Kirschen.

Bezeichn. d. vorrätig. Form	No.	
H. M. P.	940.	<i>Saint Swethin</i> , Juli, sehr frühe Sorte von der Calebasse Tougard abstammend; mgr., saftig, fein gewürzt. Wegen der frühen Reife und grossen Fruchtbarkeit zur Markfrucht geeignet.
H. M.	1j. 962.	<i>Sarah</i> , Oct., neue Züchtung von Fr. Clapp; mgr., Fl. fein, schmelzend und gewürzt.
H. M.	954.	<i>Sheldon</i> , Oct.—Nov., eine nordamerikanische Sorte, grossfrüchtig, schmelzend, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum starkwüchsig, schön pyramidal und reichtragend auf Wilding, auf Quitte schlecht gedeihend.
H. M. P.	1j. 904.	<i>Souvenir de l'évêque</i> , E. Dec., gelblich, fein punktiert und marmorirt, Fleisch fest, fein butterhaft mit reichlichem süss gewürzigem Saft. I. Qualität. Wuchs mittelstark, sehr fruchtbar.
H. M. P.	926.	<i>de l'Exposition</i> .
H. M.	1j. 965.	<i>du vénérable De la Salle</i> , Oct.—Nov., Fleisch fein, schmelzend, zuckerig, s. empfohlen.
H. M. P.	916.	<i>Therese</i> , Sept.—Oct., zieml. gr., schmelzend, von herrlichem Gewürz, allerbesten Qualität.
H. M.	C. 872.	<i>Triumph von Vienne</i> , H.
H. P.	953.	<i>Tyson</i> , Ang., eine der feinsten Sommerbirnen.
H. M. P.	917.	<i>Viceprésident Delbée</i> , Jan., gr., von der Form. d. Passe-Crasanne. Fl. schmelzend, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum fruchtbar und starkwüchsig.
H. M. P.	1j. 949.	<i>Victoria, Williams'</i> , E. Oct., gr., citronengelb; von Dr. Hogg, dem bekannten englischen Pomologen, als eine ausgezeichnete Frucht empfohlen.
H. M.	1j. 898.	<i>Zoë</i> , Dec.—Jan., sehr schöne Frucht, circa 15 cm hoch und 6 cm breit, dunkelgrün, braun verwachsen mit rosa Backen, zart schmelzend ohne die mindeste Spur von Herbe. Wuchs kräftig.
P.	913.	<i>Zwergbirne, Grüne</i> , (Nain vert), Oct., von zwergigem, compactem Wuchse.

Japanische Sorten.

Dieselben sind winterhart und zeichnen sich durch ihre Blattform vor allen übrigen Sorten aus.

H. M. P. S. 883. *Daimyo*. H. M. P. S. 884. *Madame v. Siebold*. H. M. P. S. 885. *Mikado*.
H. M. P. S. 886. *Sieboldi*.

Kaukasische Sorten.

P. S. 842. *Abassi-Armud*. — P. 843. *Beg-Armud*. — P. 844. *Bildirtshin-Budi*. — P. 845. *Kabach-Armud*. — P. 846. *Kal-Armud*. — P. 848. *Nar-Armud*. — P. 849. *Zmernück-Armud*.



Kirschen.



Nachstehende Sorten sind sämtlich in Hochstämmen abgebar; im Uebrigen in den bezeichneten Formen. M. = Mittelstämme, P. = Pyramide, S. = Spalier, 1j. = 1jährige Veredlung. Die Zahl hinter dem Namen bedeutet die Reifezeit in der 1. 2. etc. Woche der Kirschenzeit.

Preise.

Hochstämme , veredelte Süsse und Saure, sehr schöne 7—9 ctm. Stammumfang, auf 1 mtr. Höhe gemessen, Stammhöhe 1,90 mtr.	
do., veredelte Süsse und Saure, sehr schöne 9—13 ctm. Stammumfang, auf 1 mtr. Höhe gemessen, Stammhöhe 1,90 mtr.	
do., gewöhnliche Sauerkirschen, s. schön gezogene 6—8 ctm. stark	
do. do. do. 8—10 ctm. stark	
Mittelstämme , veredelte Süsse und Saure	
Spalierbäume , (Palmetten) von Schattenmorellen und anderen mit einer Etage	
do. do. mit 2 Etagen	
do. do. mit 3 Etagen	
do. do. mit 4—5 Etagen	M 3,50 bis
Pyramiden	M. 0,75 bis
1jähr. Veredlungen auf Weichsel (Mahaleb)	

pr. Stück	pr. 100 St.	pr 1000 St
M.	M.	M.
1,25	110	1000
1,50—2,50	140	1300
0,75	65	600
1,—	85	800
0,80	60	550
1,25	110	—
2,—	—	—
2,75	—	—
4,50	—	—
2,—	50—150	—
0,60	50	—

Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Kirschen.

Süsskirschen.

Schwarze Herzkirschen.		Schwarze Knorpelkirschen.	
Bez. d. vorrath. Form	No.	Bez. d. vorrath. Form	No.
M.	9.	M. S.	199.
M. P.	76.	M.	88.
M.	4.	M. S.	16.
M.	77.	M.	213.
M. S. 1j.	78.	M.	214.
M. P. S.	6.	M.	91.
M.	1.	M.	92.
M.	79.	M.	94.
M.	80.	M. S.	215.
M. S. 1j.	3.		121.
M.	206.		95.
M.	7.	M.	217.
M.	81.	M.	23.
M.	10.	M.	59.
M.	83.	M.	152.
M.	84.	M.	227.
M.	8.		55.
M.	85.		218.
M. S. 1j.	192.		15.
M. P. S.	2.		201.
M. P.	45.		82.
M.	75.	M.	207.
M.	5.		
Bunte Herzkirschen.		Bunte Knorpelkirschen.	
	100.	98.	Agathe, schöne, (Belle Agathe de Novembre), * Sept., kl.—m.
M.	101.	120.	Bigarreau marbré, (? Büttner's späte rothe Knorpelkirsche), ** 4. gr.
M. S. 1j.	47.	17.	Grosse Prinzessin-kirsche , (Lauermannskirsche), **† 4. gr.
M.	123.	126.	Knorpelk., Büttner's späte rothe , **† Ende d. 5. gr.
M.	203.		" Drogans, weisse, **† s. gr.
M.	200.		" Dunkelrothe, **† 4. gr.
M. S.	11.		" Hildesheimer späte, ** Ende Aug.—Anf. Sept.
M.	107.		" Lieke's bunte, ** 6. 7. m.
M.	110.		" Meininger späte, **† 6. gr.
M.	216.		" Punktirte, (Punkt. Süßkirsche mit festem Fleisch), **† 5. m.
M.	12.		
M.	197.		
M. S.	13.		
M.	113.		
M. P. S. 1j.	99.		
	109.		
Gelbe Herzkirschen.			
M.	139.		
M. S.	138.		

Kirschen.

Bez. d. vorrath. Form	No.		Bez. d. vorrath. Form	No.	
	133.	Marmorkirsche, Gemeine, **†† 3 gr.			Gelbe Knorpelkirsche.
M.	134.	Schöne v. Rockmont, ** 3. gr.	M. P. S.	20.	Knorpelk., Doenissens, gelbe, **† 5. mgr.
M.	132.	Spanische, weisse, **† 4. gr.			„ Drogan's gelbe, **† 5. gr.
	58.	Speckkirsche, **† 3. m.	M.	142.	— s. gr.
M. P.	136.	Süsskirsche, runde marmorirte, **† 4. gr.	M.	143.	„ Meissener, weisse, ** 5. gr.

Sauerkirschen.

Süssweichseln.					
Bez. d. vorrath. Form	No.		Bez. d. vorrath. Form	No.	
M. P.	144.	Folgerkirsche, **†† 3. gr.	M. P. S. 1j.	26.	Amarelle, Königl., **†† 2. m.
M.	22.	Frühkirsche, Spanische, **†† 2. mgr.			„ Sood-, **† 4. gr.
M. P. S. 1j.	21.	Maikirsche, rth., **† 2. gr.	M. P. S. 1j.	173.	„ Späte-, **†† 3. mgr.
	148.	Königskirsche.	M. P. S. 1j.	29.	„ Süsse, **† 3. gr.
M. P.	25.	Süssweichsel, Provencer, **† m. 5.	M. P. S. 1j.	28.	Glaskirsche, Doppelte, **† 3. gr.
H.	205.	„ von Chaux, **† 5. mgr.	H. M. P.	1j. 154.	„ Bettenburger, **† 4. gr. für Tafel und Haushalt brauchbar.
Weichseln.					„ Grosse, **† 5. gr.
M.	1j. 70.	Branne, Brüsseler, (Brune de Bruxelles), †† 6 od. 7 m.	M. P.	1j. 156.	Gobet, Grosser, (Kurzstiel, Glaskirsche, Kurzstiel, Montmorency) **†† 4. gr.
M. P.	1j. 34.	Grafenkirsche, Henneberger, **† 4. m.	M. P. S. 1j.	30.	Herzogin von Angoulême, **† 3. gr.
M.	162.	Jerusalemskirsche, **† 5. h 6 gr.	M. P. S. 1j.	27.	Herzogin von Paluan, ** 4 mgr.
M. P.	74.	Kirsche v. d. Natt, (Doppelte Natt), **†† 3. m.	M. P.	1j. 175.	Schöne von Brügge, **† 3.— 4. mgr.
M. P. S. 1j.	37.	Lothkirsche, Grosse lange (Schattenmorelle), **† 5. od. 6. gr.	P. S. 1j.	196.	„ Chatenay's, ** 6 od. 7 gr.
M.	193.	Weichsel, Herzförmige, **† 4 mgr.	M. P.	153.	„ von Choisy, ** 2. m.
M. P.	1j. 35.	„ Neue engl., **† gr. 4.	M.	44.	(228) Kaiserin Eugenie, ** 2—3 gr. purpurroth. Trägt sehr reichlich als Formbaum. Wuchs mässig.
M. P. S. 1j.	187.	„ Ostheimer, **†† 4 m.	P. S. 1j.	212.	Kirsche von Planchoury, **† 7 gr.
M. P.	1j. 168.	„ Schwarze Mai-, **† 1. kl.	M. P. S. 1j.	164.	Morelle, Frühe, **† 4. gr.
M. P. S. 1j.	33.	„ Spanische, Früh-, **† 2. kl.	M. P. S. 1j.	63.	„ Späteste, doppelte.
M. P.	1j. 169.	„ Strauss-, **† fast ** 2. mgr.	M. P.	165.	Nonnenkirsche, Grosse, **†† 5 mgr.
M. P. S.	32.	„ SüsseFrüh-, **† 2. kl.			
M.	195.	Weinkirsche, Grosse, **† 4 mgr.—gr.			
Glaskirschen und Amarellen.					Glaskirsch-Hybriden.
P.	1j. 170.	Allerheiligenkirsche, Oct.—Nov., kl.	M. P. S. 1j.	40.	Königin Hortensia, (Hybride de Laeken) ** 4. s. gr.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Kirschen.

Hochstämme u. Pyramiden 2 M.
1 jähr. Veredlungen 1 „

Bez. d. vorrath. Form	No.	
P.	222.	<i>Agh Gilas</i> , eine persische Sorte zu den bunten Herzkirschen gehörend; zeichnet sich durch besonders süsse, saftige und zartfleischige Frucht aus.
H. M. P.	238.	<i>Herzkirsche, Frühe von Mathere.</i>
P.	223.	<i>Kara Gilas</i> , stammt ebenfalls aus Persien; schwarze Herzkirsche, auch ausserordentlich süss und saftig.

Kirschen. Pflaumen.

Bez. d. vorräth. Form	No.	
H. M.	1j.	229. <i>Knorpelkirsche, Champvans.</i>
H. M. P.	1j.	230. „ <i>Frühe aus der Champagne, Juni, grosse, schwarzbraune, süsse Frucht.</i>
		231. „ <i>Frühe von Frogmore.</i>
M.		237. <i>Schöne von Montreuil.</i>
H. M. P.	1j.	232. „ <i>von St. Tronc, eine früh reifende, saftige Herzkirsche erster Güte.</i>
M.		234. <i>Sparhawk's Honey, amerikanische Sorte.</i>
H. P. S.	1j.	224. <i>Süssweichsel von Olivet, grosse frühe schwarze Weichsel, grösser und früher als die „Doppelte Natte“ I. Qual.</i>
H. P.	1j.	236. <i>Toronto.</i>
H. M. P.	1j.	226. <i>Wachskirsche, gelbe, ** E. B. Fr. gr., hellgelb, saftreich, angenehm süss. Hauptsächlich für die Tafel.</i>



Pflaumen.

Die Buchstaben H. M. P. S. 1j. gehen an, ob die Sorte als Hochstamm, Mittelstamm, Pyramiden, Spalier oder 1 jährig abgebar ist.

	pr. Stück M.	pr. Stück M.	pr. Stück M.
Hochstämme , sehr schöne Stammhöhe, 1,90 m., Stärke 6–8 cm. auf 1 m. Höhe	1,25	110	1000
do. do. do. do. do. 8–10 „ do. 1,50 bis	2,50	140	1300
Mittelstämme mit Kronen	1,—	85	800
Pyramiden	3,—	65–250	—
Spalierbäume , Palmetten mit 1 Etage	1,25	110	—
„ „ 2 Etagen	2,—	175	—
„ „ 3 „	2,75	—	—
„ „ 4–5 „ nur in einigen Sorten	4,50	—	—
Einjährige Veredlungen	—,60	50	—

Bez. d. vorräth. Form	No.	
H. M. P. S.	257.	<i>Anna Späth, **†† E. Sept., diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders in Bezug auf den wirtschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit.</i>
H.	816.	<i>Anna Lawson, **†† Aug.—Sept., vorzügliche Zwetsche mit zarten saftreichen Fleische und sehr angenehm süssem, etwas weinartigem Geschmacke.</i>
H. P. S.	291.	<i>Admiral Rigny, *† E. Aug., Fr. gr., grün.</i>
H.	137.	<i>Angeline Bardett.</i>
H. M. P.	221.	<i>Anglesio.</i>
H. M. P. S.	17.	Aprikosenartige Braunauer, ** A. Sept., gr., gelb; s. werthv. reichtragende Sorte.
H. M.	211.	<i>Aprikosenpflaume, Frühe, ** E. Aug.—A. Sept., mgr., grünlich-gelb.</i>
H. P. S.	157.	„ <i>Gelbe, ** E. Aug., mgr., gelb.</i>
H. M. P. S. 1j.	34.	„ <i>Roth, ** A.—M. Sept., mgr., rothbunt, rund.</i>
P. S. 1j.	279.	<i>Aprikosenzwetsche, Roth, schöne und gut lösliche Frucht mit aprikosenähnlichem Fleisch.</i>
H. M. P.	245.	<i>Blau von Belgien, ** E. Aug., gr. schwarzblau, sehr angenehm schmeckend.</i>
H. P. S.	255.	<i>Cochet père, **† M. Aug., Fr. s. gr., oval, goldgelb mit carmin, sehr feine und zugleich sehr schöne Frucht.</i>
H. P.	193.	<i>Columbia.</i>
H.	194.	<i>Damascene, Frühe Leipziger.</i>
H.	138.	„ <i>Lange violette, ** E. August, gr. dunkelviolet.</i>
P.	26.	„ <i>Koch's späte, ** E. Sept.—Oct., mgr., goldgelb.</i>
H. M. P.	33.	<i>Dattelszwetsche, Grosse gelbe, * E. Sept.—Oct., gr., für warme Lagen.</i>
H. M.	69.	„ <i>Violette, fast ** M. Sept., mgr., s. lang, blau, sehr reichtragend.</i>
H. P.	60.	<i>Decaisne's Pflaume, (Prune Decaisne), **† gr. gelblich. M. Sept.</i>
H.	218.	<i>Denniston's Superbe, ** mgr. E. Aug.</i>
H. P. S.	109.	<i>Diamantpflaume, **†† A. Sept., schwarzblau, sehr reichtragend.</i>
H. M.	131.	<i>Diaprée, Kook's neue, ** M. Aug. Fr. mgr. gelb.</i>
H.	162.	„ <i>Weisse.</i>
H. M. P. S.	11.	„ Violette, **† E. Aug., mgr., schwarz-blau; ausgezeichnete, delikate Frucht, ausserordentlich reichtragend; verdient einen Platz in jedem Garten.
H. M. P. S.	19.	<i>Durchsichtige, ** M. Aug., mgr., grünlich gelb, sehr saftreich und süss.</i>

Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Pflaumen.



Anna Späth.

Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Pflaumen.

Bez., d. vorrätth. Form	No.	
H. P. S.	23.	Eierpflaume, Grosse Britzer, **† M.—E. Aug., gr., gelb, stark roth marmorirt und punktirt, sehr reichtragend, vortrefflich.
H. M. P.	84.	" Blaue, ** E. Sept., gr., blau, Geschmaek vorzüglich.
H.	70.	" dunkelblaue, **† Anf.—M. Sept.
H. M. P.	95.	" Gelbe, *† Sept., Fr. sehr gr., gelb.
H. M. P. S.	8.	" Nienburger , ** M. Sept., Fr. gr., roth.
H. M. P. S.	7.	" Rothe, ** E. Aug., Fr. sehr gr., roth.
H. M. P. S.	227.	Emperor of Japan, (Kaiser von Japan), *† A. Sept., mgr. blutroth, rund.
H. P.	244.	Fruchtbare, Frühe, (Early Prolific), **† A. Aug., mgr., rundlich, schwarzblau.
H. M.	238.	Frühpflaume, Edle, ** Aug., Fr. kl., braunroth mit goldfarbenen Punkten.
H. M.	259.	" Freudenberger, fast ** E., Juli—Auf. Aug., dunkelviolet, fast schwärzl. an der Sonnenseite.
H. M. P. S. 1j.	118.	Frühzwetsche, Biondeck's , ** A.—M. Aug., mgr., hellroth, oval, von sehr edlem süßweinigen Geschmaek.
H. M. P. S.	2.	" Fürst's , mgr., M. Sept., sehr süß und gewürzt.
H. P. 1j.	278.	" Reutlinger, **† M. Aug., gr., sehr tragbar und gut
H. M. P.	1.	" Wangenheim's, *†† Sept., mgr., dunkelviolet.
H. P. S.	163.	Goldpflaume, Esperen's , * A.—M. Sept., gr., gelb, reichtragend.
H. M. P. S. 1j.	10.	Goldtropfen, Coë's, (Coë's rothgefleckte Pl.), ** E. Sept., gr., gelb.
H. M.	178.	Goliath, Sept. grosse, schöne und gute Damascene, dunkelviolettblau, mit saftigem Fleische und süßem erhabenen aromatischen Geschmaek.
H. M.	44.	Grosse, Cooper's, (Cooper's large red), ** M. Sept., Fr. gr., blau.
H. M.	185.	Herrenpflaume, **† M. Aug., Fr. schwarzblau, gr.
H. M. P.	243.	" Gelbe, **† E. Aug., delikat.
H. M. P.	196.	Hyacinthpflaume, fast ** und wohl †, Anf. Sept., dunkelblau, mit grossen goldartigen Punkten an der Sonnenseite.
H. P. S.	288.	" Berliner.
H. M. P. S.	20.	Jefferson , ** Fr. gelb mit braunroth, roth gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süß, Baum reichtragend.
H. P. S.	6.	Jerusalemspflaume, Violette , *† M. Sept., Fr. zwetschenförmig; Baum reichtragend.
H. M. P. S.	119.	Isabella, ** E. Aug.—Sept., gr., rothblau, gut.
H. M.	16.	Jungfernpflaume, Weisse, ** A. Sept., Fr. mgr., gelb.
H. M. P. 1j.	88.	Kaiserin, Violette, ** E. Sept.
H. M. P. S. 1j.	231.	Kaiserpflaume, Sharps, (Sharps Emperor), ** Anf. Sept., Fr. gr., gelb mit roth.
H. M. P.	41.	Katharinenpflaume, Blaue, **† E. Sept., Fr. gr., blau.
H. M. P. S.	295.	" Gelbe, **† E. Sept. mgr., wird um Paris vielfach zur Bereitung der Prünellen angebaut.
H. M. P. S. 1j.	14.	Kirke's , (Kirke's plum), ** A. Sept., Fr. gr., dunkel-violet.
H. M. P. S.	123.	Königin Victoria , (Queen Victoria), **† E. Aug., Fr. s. gr., roth.
H. M. P. S.	197.	Königspflaume, (Royale), ** E. Aug., mgr., blauroth, sehr angenehm schmeckend.
H. M. S.	198.	" Buchner's, **† E. Aug., mgr., dunkelbraun.
H.	200.	" frühe, Aug., gute mittelgr., braune Frucht, von süßem angenehm angesäuertem aromatischen Geschmaek.
	254.	" Koch's, *† gr., E. Aug., blauroth.
H. M. P. S.	202.	" Mayer's, ** E. Aug., mgr., braunroth.
H. M. P. S. 1j.	22.	" von Tours , **†† M. Aug., gr., violettroth; vortrefflich für Tafel und Küche.
H. M.	199.	" Violette, **† E. Aug., Fr. mgr., s. saftreich von ganz reineclaudenartig süßem, durch feine Säure gehobenen delikaten Geschmaek.
H. M. P. S.	188.	Lepine , fast **†† Oct.—Nov., kl.—mgr., schwarzblau; Geschmaek süß-weinig; Baum alljährlich reichtragend. Sehr gut zum Welken.
H. P. S. 1j.	283.	Mae Laughlin, A. Sept., s. gross, rund, grünlichgelb. Neuere amerikanische Sorte.
H. M. P. S.	296.	(256.) Mirabelle, Gelbe , *†† E. Aug.; klein, besonders zum Trocknen beliebt.
H. M.	318.	" Grosse von Nancy.
H. M. P.	240.	" Herrenhäuser, doppelte, **† M. Aug., mgr., goldgelb
H. M. P. S.	15.	" Rangheri's , **†† M. Aug., Fr. mgr., hellgelb, roth angelaufen oder punktirt, höchst schätzbar.
H. M.	87.	" rothe, *† M. Aug., Fl. süß und angenehm.
	284.	Nectarine, Rothe, ** A. Aug., rothbraun; nur für Formbäume. Haut abzuziehen.
H. M. P. S. 1j.	177.	Perdrigon, Bunter , ** E. Aug., gr., violettroth.
H. P. 1j.	191.	" Normännischer, ** M. Sept., gr., breit, schwarzblau, mit starkem Duft. Sehr feine aromatische Frucht von sehr schönem Ansehen. Löst gut und springt gar nicht auf.

Pflaumen.

Bez. d. vorräth. Form	No.	
H.	242.	Pflaume , Crüger's rothe, **† E. Aug.—A. Sept., mgr. Bunte Frucht, sehr hübsch, mit röthlich-bläulichem Duft. Fleisch fein, goldgelb, auch in kalten Jahren vollkommen lösend, sehr saftreich, angenehm süßsäuerlich, s. gut!
H. P. S.	286.	Pfirsichpflaume , (Pêche), A. Aug., gr., reichtragend; gute Marktf Frucht.
H. M. P. S.	281.	Pfirsichzwetsche , Frankfurter , **† M. Sept., gr., schwarzblau.
P.	261.	Procureur , ** E. Aug., mgr., roth. Schätzbar.
H. M. P. S.	282.	Reineclaud , Althann's , **† A. Sept., mgr., braunroth, heller marmorirt.
H. M. P. S.	64.	Bavay's, ** M. Sept., gr., grün mit etwas Röthe.
H. M. P. S.	25.	" Frühe , **† M. Aug., oft früher; Fr. gelblich-grün mit roth, Fl. zart von zuckersüßem Geschmack. Sehr empfehlenswerth!
H. M. P. S.	233.	" Boddaert, **†† E. Aug. Fr. sehr gr., gelb, zuckersüß u. äusserst saftig.
H. M. P. S.	59.	" Durchscheinende, (Reineclaud Diaphane), **† Mitte Sept., Fr. gr.
H.	248.	" Bollweiler, **† M. Aug. gr., sehr süß.
H. M. P. S.	68.	" Grosse , **† A. Sept., Fr. gr., grün.
H.	219.	" Lawrence's, **† M. Aug., gr., gelbgrün.
H. M. P. S.	18.	" Meroldt's , **†† M. Sept., gr., gelb.
H. M. P. S.	154.	" Prince's, rothe, (Prince's red gage), **† Aug., rothbr.
H. P.	247.	" von Jodoigne, ** M. Sept., gr., hellrothbraun.
H. M.	250.	Rothe , Denniston's, **† E. Aug., mgr., hellroth, früh und reichtragend; sehr empfehlenswerth.
H.	235.	Schöne von Löwen , **† E. Aug., gr., violett, angenehm süß.
H.	132.	Spilling , Catalonischer, **† E. Juli, gelb, Baum bleibt klein.
H.	236.	Thomaspflaume , **† E. Aug., gr.—sehr gr., bräunlich gelb, roth punktirt; werthvolle Tafel- und Marktf Frucht.
H.	213.	Unvergleichliche , Lucombes, Aug., Frucht gross, saftreich, süß, aromatisch.
H. M. P. S.	24.	Washington , ** A. Sept., Fr. sehr gr., gelb.
H. M. P.	103.	Waterloozwetsche , ** M. Sept., mgr., gelb, gut; Stein fast lose.
H. M. P. S.	12.	Zuckerzwetsche , Grosse , (Jacobi-Zw.), ** E. Aug., Fr. gr., blau.
H. M. P. S.	114.	Zwetsche , Bazalicia's, ** E. Aug., mgr., schwarzblau, früh und reichtragend.
H. M. P. S.	118.	" Biondek's, ** Anf. Aug., mgr., hellroth, s. schöne und gute Frühzw.; s. fruchtbar, Fl. vollkommen lösend!
H.	99.	" Blane, ** A. Sept., gr., Fl. gelblich von erhabenem, süßem Geschmack.
P.	50.	" Bremer.
H. P.	1j. 232.	" Grosse blaue Haus- , (Bauerpflaume), **†† Sept.
H. M. P.	93.	" Grosse gelbe Dattel, * E. Sept.—Oct. gr., länglichoval. Als spät reifende Fr. ihrer schönen Farbe wegen eine Zierde der Fruchtschale.
P.	1j. 279.	" Aprikosen, Rothe, M. Sept., bunte Fr. von angenehm., süßem Geschmack.
H. M. P.	4.	" Grosse englische, **†† M. Sept., Fr. gr., blau.
H. M. P. S. 1j.	9.	" v. Hartwiss' gelbe , **† A. Sept., mgr.—gr., gut.
H. M. P. S.	3.	" Italienische , **†† E. Sept., Fr. gr., blau.
H. M.	13.	" Reizensteiner, gelbe, ** gr., gelb mit roth punktirt, saftig, süß-angenehm gewürzt, gut vom Stein lösend.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Hochstämme in den mit II. bezeichneten Sorten	pr. St. M. 2.—
Mittelstämme " " " M. " " " " " " " "	1,50
Pyramiden " " " P. " " " " " " " "	1,50
Spalierbäume " " " S. " " " " " " " "	1,75
1jährige Veredlungen in den mit Ij. bezeichneten Sorten	1.—

Bez. d. vorräth. Form	No.	
H. M.	1j. 314.	Ambre tardive , eine sehr schöne Pflaume zum Trocknen, s. reichtragend.
H. M.	1j. 310.	Baronne Helene Trantenberg, eine sehr empfohlene Zwetsche.
H. P.	1j. 292.	Belvoir , ** A. Sept., gr., eirund, gelb, sehr saftig und süß, von ausgezeichneter Qualität.
H.	1j. 297.	Damascene Rivers' frühe , kl., dunkel-blau, saftreich und süß; sehr reichtragend und früh reifend.
H. P. S. 1j.	293.	Damson Farleigh Prolif , eine kleinfrüchtige Zwetsche von ausserordentlicher Fruchtbarkeit.
H.	1j. 306.	De Caradeuc , soll ein Bastard zwischen der amerikanischen Chickasaw-Pflaume und einer europäischen Varietät sein. Wird als eine frühe, delikate Frucht I. Ranges empfohlen.

Pflaumen.

Bez. d. vorräth. Form	No.	
H. P. 1j.	285	<i>Dumiron</i> , ausgezeichnete Frucht für Mass, bedarf keines Zuckers beim Kochen.
H. M. P. S. 1j.	290.	<i>Dunkelrothe Douane's</i> , gr., sehr tragbar und starkwüchsig. Ausgezeichnete Fr.; von einem Pflaumenliebhaber als eine seiner besten Pflaumen bezeichnet.
H. M. P. 1j.	287.	<i>Hasard</i> , Sept., länglich, violett, saftig; Stein lose, besser als die Violette Reineclaud.
H. 1j.	298.	<i>Herzog von Edinburg</i> , gr., purpurroth, oval; eine als beste Qual. empfohlene englische Sorte.
H. M. P. 303		<i>Lombard</i> , Sept., amerikanische Sorte. Grosse roth-violette Frucht von ausgezeichnete Qualität.
H. M. 1j.	307	<i>Miner</i> , Sept., amerikanische Var., mgr., roth.
H. P. 1j.	294	<i>Montford</i> , ** M. — E. Aug., gr., rund-oval, blauschwarz, sehr delikat, reichtragend.
H. 308.		<i>Newmann</i> , Aug. u. Sept., roth mit purpur Duft. Fl. s. saftig, delikat.
H. M. 1j.	311.	<i>Ontario</i> , ** Aug., Fr. gr., rund, gelb marmorirt.
H. 304.		<i>Peters Yellow Gage</i> , (Peters gelbe Reineclaud), gross, durchsichtig gelb, sehr saftreich und aromatisch. Amerikanische Sorte. Sept.
H. M. 1j.	313.	<i>Pond's seedling</i> , Sept., Fr. roth in violett übergehend, eine der besten Sorten.
H. M. 1j.	305.	<i>Reineclaud, Gelbe</i> , (Yellow Gage), M. Aug., gr.; eine ausgezeichnete, reichtragende amerikanische Sorte.
H. M. 302.		<i>Reineclaud, Kaiserliche</i> , (Imperial Gage), M. Aug., gr., grün, Fl. saftig, delikat, vom Stein gut lösend. Wird in den Ver. Staaten als eine der besten Pflaumen geschätzt.
H. 300.		<i>Sämling, Dry's</i> , gr., purpurroth, eine delicate, saftige Tafelfrucht I. Ranges.
H. M. 1j.	312.	<i>St. Lawrence</i> , E. Aug., gr. dunkelpurpur.
H. M. P. S. 277		<i>Schüttelpflaume, Lindow's</i> , eine der frühesten Pflaumen, löst gut vom Stein und trägt sehr dankbar. Wird in Werder bei Potsdam viel angebaut.
H. M. P. S. 276.		<i>Stengelpflaume, Werdersche</i> , eine frühe, M. August reife, wohlschmeckende und saftige rothe Zwetsche. In Werder viel angebaut.
H. 1j.	301.	<i>Sultan</i> , eine neue englische Varietät von ausgezuchter Güte; grossfrüchtig und früh reifend.
H. P. 1j.	262.	<i>Washington, Rothe</i> , A. Sept., gross, dunkelbraunrothe sehr tragbare Zwetsche. Geschmack vorzüglich, Stein lose.
H. 1j.	309.	<i>Weaver</i> , eine für nördliche Gegenden sehr werthvolle Fr. aus N.-Amerika.
H. 1j.	299	<i>Wyedale</i> , Oct., mgr., purpurroth, schätzbare englische Sorte.
H. M. P. 1j.	289.	<i>Zuckerzwetsche, Ungarische</i> , vorzügliche Zwetsche, die ich unter diesem Namen mit grosser Empfehlung erhielt.
H. M. P. 1j.	264.	<i>Zwetsche, Gisborne's</i> , ** E. Aug., mgr., wachsgelb; nach Oberdieck eine treffliche frühe Zwetsche mit völlig lösendem Stein, im Regen nicht platzend.
H. 317.		<i>Zwetsche, Grüne</i> , ** A. Sept., Fl. zart, saftvoll von süss-säuerlichem, s. gutem Geschmack, gut vom Stein lösend.
P. 1j.	500.	<i>Prunus Simoni</i> , Sept., eine neue Gattung von Pflaumen aus China mit glänzendem Laub. Sie trug hier mehrere grosse blutrothe Früchte, an Form den Reineclauden ähnlich. Zierpflaume! Der Geruch der Früchte ist ganz vortrefflich.

Kaukasische Sorten.

Bez. d. vorräth. Form	No.	
H. P. 273.		Agh Ali.
H. P. 274.		Alibuchara, Gelbe.
H. P. 267.		Alutscha-Arik.
H. P. 269.		" aus der Bucharei.
H. P. 266.		" Gelbe, E. Sept. Fr. gr., schön gelb mit carmoisinbraun überzogen. In voller Reife fast durchsichtig. Auffallend saftig, zuckersüß.
P. 275.		" Späte September, ebenfalls sehr süß und ungemein saftreich.
P. 268.		" weisse, späte.
H. P. 270.		Malassi, E. Oct., eine prachtvoll zinnoberroth gefärbte Fr., ebenfalls sehr saftig und angenehm schmeckend.
H. P. 271.		Wisir Ali, Sept., Form oval, gr., Fl. saftreich. Auf der Sonnenseite dkl.-röthl.-purpur, Schattenseite hell grünl.-gelb. Duft dünn, bläulich-weiss.



Pfirsiche.



Pfirsiche.



Einjährige Veredlungen

Spaliere in Fächer- und Palmettenform 1jährige 1 St. M. 1,50.
do. stärkere (nur in einigen Sorten) 1 " " 2—3.
do. 1 " " 4—8.

Diejenigen Sorten, welche auch als Hochstämme gezogen werden, sind durch ein H vor der Nummer bezeichnet

- | | |
|------|--|
| No. | |
| 116. | Adam. |
| 145. | Admirable Early, mgr.-gr., Fleisch fest, schmelzend süß, sehr angenehm gesäuert. Sept. |
| 146. | „ Walburton, gross, gut, Ende September. |
| 147. | Albatross, ** M. S., s. gr., Fl. weiss, s. saftig, gut. |
| 60. | Aprikosenpfirsich, Prachtvolle , (Admirable jaune), ** E. Sept.—A. Oct., gr., gelb. |
| 102. | Beatrix, Frühe , (Précoce Béatrice), mgr. August, reift hier A. Sept. an völlig frei stehenden Pyramiden; von robustem Wuchs und winterhart. Sehr werthvoll! |
| 52. | Bourline, gr., Fleisch saftreich, gezuckert fein und angenehm erhaben, October. |
| 117. | Bon Oursin. |
| 143. | Brugnon de Féligny , mgr., schmelzend, saftreich, sehr gezuckert, angenehm gewürzt, sehr fruchtbar, Aug. |
| 35. | „ violett, ** Ende Aug.—H. Sept., eine der frühesten, s. gut. |
| 148. | Chancellor. |
| 140. | Conkling, ** M. Sept., prachtvoll goldgelb. mit carmoisinroth, s. saftig, süß, weinartig. |
| 149. | Cendor, ** A. Sept., Fr. gr. |
| 150. | Diamond. |
| 151. | Dr. Hogg, ** M.—E. Aug., gr., fest, unter der Haut etwas röthlich. |
| 105. | Doppelte Zwollsche. |
| 131. | Downton, gross, saftig gezuckert, angenehm parfümirt, sehr fruchtbar, Anf. September. |
| 137. | Early Canada, gross, sehr saftig und süß schmelzend, aromatisch, August. |
| 158. | Elruge's Nectarine , ** A. Sept., Fr. hellkirschenroth mit purpur. Fl. leicht vom Stein lösend, s. saftig von feinem, gewürzreichen, s. angenehmen Geschmack. |
| 152. | Falcon, gross, I. Qual, August. |
| 163. | Fayes Early Anne, mgr. vortreffliche, sehr tragbare amerikanische Frucht, August. |
| 126. | Flache Chinesische, (Plate de Chine), Frucht plattgedrückt, eigenthümlich geformt, gut, August. |
| H. | 101. |
| | Frühe, Hale's, (Précoce de Hale), mgr., rosa, sehr gut. Eine der allerfrühesten und fest haftend am Stiel. Gute Marktfrucht. |
| | 160. |
| | Frühe, Rivers , ** A. Aug., zml. gr., ausgezeichnet; verdient häufige Anpflanzung; nur 1jähr. Veredlungen. |
| | 120. |
| | Frühe von Ezée, grosse, frühe Frucht. |
| | 125. |
| | Fürst Carl Schwarzenberg, ** A.—M. Sept., s. saftig u. gut. |
| | 46. |
| | Galande , (Belle Garde, Galande), ** A. u. M. Sept., gr., Sonnenseite dunkelpurpur, sehr saftig u. gut, I. |
| | 121. |
| | Galande de Montreuil , ** A. Sept., Fr. mgr., s. saftig u. süß, von gewürzh. Geschmack. Baum ungemein fruchtbar und gegen Frühjahrsfröste nicht sehr empfindlich. |
| | 153. |
| | Georg IV, ** E. Aug., mgr., s. saftig, gezuckert, fein weinsäuerlich, von sehr angenehmen Wohlgeschmack. |
| | 154. |
| | Goshawk, sehr gross und gut, Aug.—Sept. |
| | 138. |
| | Governor Garland, gross, saftig, schmelzend, zuckerartig mit leichtem säuerlichem Weingeschmack, Aug. |
| | 122. |
| | Königin der Obstgärten , Fr. s. gross, schön gefärbt, schmelzend, süß gewürzt, Sept. |
| | 124. |
| | Königin Olga, ** s. gr. mit gut lösendem gelblichen Fleische, delikate Fr. von leuchtender Färbung |
| | 123. |
| | Laurent de Bavay, gr., spät. |
| | 27. |
| | Leopold I. , ** E. Sept., s. gr., Fl. schmelzend, grünl.-gelb, am Steine hellroth, saftreich, von angenehm gewürztem Geschmack. |
| | 50. |
| | Liebling Bollweiler , ** M. Aug., gr., delikat |
| | 110. |
| | „ Jühlke's , ** E. Aug.—A. Sept., zml. gr.—s. gr., überfliegend saftig, fein gewürzt. |
| | 73. |
| | Lord Palmerston, die grösste aller bis jetzt bekannten Pfirsiche. |
| | 76. |
| | Madame Gaujard , ** Sept., zieml. gr., hellgelb, auf der Sonnenseite schön purpurroth gefärbt und fein punkirt. Fl. leicht vom Steine lösend, saftig, süß von s. gutem Geschmack. |
| | 7. |
| | Magdalene, Rothe , (Madeleine rouge), **! Aug., Fr. gr., sehr schätzbar. |
| | 19. |
| | „ Weisse , ** M. Aug., von angenehm gewürztem Geschmack. |
| | 157. |
| | Merlin, ** Aug., gr. |

Pfirsiche. Aprikosen.

- | | | |
|----|------|--|
| H. | No. | |
| | 17. | Mignon, Grosse , ** E. Aug. Fr. gr., sehr werthvoll, reichtragend. |
| | 5. | Montagne, Doppelte, ** M.—E. Sept., gr. |
| | 119. | frühe. |
| | 53. | Noblesse, ** gr., Anf. Sept. |
| | 104. | Orange, doppelte. |
| | 106. | (Nectarine), gross, Fleisch orangegelb, I. Q. Aug.—Sept. |
| | 155. | Padleys Seedling. |
| | 24. | Peruvianerin, Frühe, (Belle chevreusse), ** A. Sept., gr. überfliegend saftig, von angenehmen Geschmack. |
| | 55. | Prince of Wales, Mitte Sept. |
| | 144. | Prinzessin von Wales , ** M. Aug., mgr., Fl. saftvoll, sehr angenehm schmeckend. |
| | 506. | Purpurblättrige, mgr., A. Oct. reifend, Blätter dunkelpurpur wie bei der Blutbuche. Frucht roth mit rothem Fleische, von guter Qualität. |
| | 14. | Purpurpfirsich, Frühe , ** E. Aug., gr., Fl. gut löslich. Ansgezeichnete Varietät. |
| | 156. | Royal Charlotte, (Madeleine hâive), ** mgr., Fl. weisslich, ausserordentlich schmelzend, rüthlich um den Stein. |
| | 26. | Schöne von Bausse (Belle Bausse), **! M. Sept., gr. |
| | 159. | Schmidtberger's Pfirsich , Ende Aug., gr. saftig, gewürzhaft. |
| | 142. | <i>Schöne von Doué</i> , Aug., gr., Fleisch fein schmelzend, sehr safr., süss, sehr fruchtbar. |
| | 85. | Schöne von Vitry, M. Sept., gr., sehr gut, fruchtbar. |
| | 161. | " aus Westland , ** E. Aug., gr., Sonnenseite hell rosenroth, Fl. sehr saftig süss, von sehr angenehmen Geschmack. |
| | 132. | Stauwick Nectarine, Ende September, gr., Fl. lösend, gezuckert u. gewürzt. |
| | 9. | Venusbrust , ** gr., A.—M. Sept. |
| | 37. | Victoria , ** E. Aug.—Sept., gr., sehr gute, glattschalige Pfirsich. |
| | 107. | Weinpfirsich, (Vineuse de Fromentin), ** Aug.—Sept. s. tragbar. |
| | 34. | Willermoz , ** A.—M. Sept., sehr gr., sehr saftreich und gezuckert. |

Neuere Sorten.

- | | |
|------|--|
| No. | <i>Einjährige Veredlungen à St. 2 M ; Spaliere 2,50 bis 4 M.</i> |
| 113. | <i>Amsden</i> oder <i>Junipfirsich</i> , aus dem Staate Missouri N. Amerika. Die allerfrüheste, die grösste und beste unter den frühen; reift etwa 8 Tage vor „Précoco Béatrice“ in Missouri, bei uns A. Juli. |
| 138. | <i>Briggh's Red May</i> , gr., I. Q., eine der frühesten Pfirsiche. Amerikanische Sorte. |
| 108. | <i>Emil Liebig</i> . |
| 109. | <i>Carl Wredow</i> . |
| 111. | <i>Fritze's Sämling</i> . |
| 114. | <i>Frühe, Alexander's</i> , ebenfalls aus N. Amerika, an früher Reifezeit und Güte mit Amsden wetteifernd. |
| 115. | <i>Frühe Silber-Pfirsich</i> , (Early Silver), wie vorige amerikanischen Ursprungs und von denselben guten Eigenschaften. |
| 139. | <i>Harpers Early</i> , sehr gute amerikanische Sorte. |



Aprikosen.



Hochstämme nur von einigen mit H. bezeichneten Sorten . . . p. St. 2,50—4 Mk.

Spallerbäume . . . „ „ „ 2—6 „

1- oder 2jährige Veredlungen zu jeder Form passend . . . „ „ 1,50 „

- | | |
|--------|---|
| No. | No. |
| 42. | Adschanabad, aus dem Kaukasus. |
| 32. | Alberge à gros fruit, **† Aug., gr., grünlich gelb, roth punktirt. |
| 52. | " de Montgamet, ** gr. Juli. |
| 22. | Algierische, grosse. |
| H. 7. | Ambrosia , ** Juli, sehr gross, prachty. |
| 21. | Ananas impérial. |
| 62. | Andenken an Robertsau , ** Anf. Aug., gr., Fl. saftig u. s. süss, von ausgezeichn. Geschmack. |
| H. 20. | Angoumois, ** Juli, mgr. und gut. |
| 34. | A trochets, mgr., I. Aug. |
| | 68. Blanchet fils. |
| H. 14. | Breda , ** Juli, mgr., fein, gut zum Einmachen. |
| | 23. Brüsseler, Doppelte, E. Juli. |
| | 58. Canino, grosse. |
| | 50. Elsässer. |
| | 56. Frühe von Montplaisir, gr., orangegelb, roth getüpfelt, Fl. roth, sehr gut. 14 Tage vor der „Frühen von Oullins“ reifend. |
| | II. 45. Gerger. |
| | 59. Gloire de Pourtales , ** gr. Juli. |

Aprikosen. Mandeln. Wallnüsse. Haselnüsse.

No.		No.	
10.	Grosse Frühe. ** (Gros précoce) gr., A.—M. Juli.	24.	Royal, **! A. Aug., Fr. gr., Fl. fein schmelzend, s. süss.
53.	Grosse rothe Frühe, ** s. gr. u. gut. Juli.	12.	Späteste Deegen, **! Oct., mgr., fein.
64.	Holländische, (de Hollande), eine gute und fruchtbare Sorte.	65.	Syrische, **! E. Juli mgr., Fleisch fest und schmelzend, gut vom Steine lösend, leicht müsikirter Geschm.
60.	Jamucet.	55.	Tachard, Juli.
41.	La Reine.	30.	Türkische Rothgetupfte, Mitte Aug., im Süden sehr beliebt.
38.	Lübeck's, Aprikose.	19.	Tyrnauer, Grosse, Aug.
37.	Moorpark, Frühe, ** mgr. Aug.	13.	Ungarische, Beste, **! E. Juni, s. gr., s. süss.
15.	Muskat, frühe	63.	Viard.
29.	Orange, Doppelte.	69.	von Tours, ** M. Aug.
H. 49.	" Frühe, sehr gut zum Einmachen.	67.	Luizet's, **! E. Juli, s. gr., Fl. s. fein, orangegebl., zart u. schmelzend.
H. 11.	Pfirsichaprikose von Nancy, **! Juli, gr.		
51.	" , Frühe von Quillins, 8 Tage früher als die vorige, ausgezeichnet.		
61.	Red muscadine, früh.		

Neue Aprikose.

1jähr. Veredlung à St. 1,50 M. Spaliere 2,00—5 M.

- H. 46. **Tlor Zi'an**, kaukasische Sorte, E. Aug., sehr starkwüchsig und vollständig winterhart, Frucht klein, Haut fast **schwarz**, dünn, s. leicht abzuziehen, Fl. orangegebl., von sehr angenehm gewürztem Geschmack. Höchst interessante und empfehlenswerthe Sorte, die ich aus Tiflis erhielt.

Mandeln (Amygdalus communis).

3.	Grossfrüchtige, (macrocarpa)	p. Stück M. 1,50.
2.	Krach-Mandel, (fragilis)	" " 1,50.
4.	" " Zartschalige (à coque tendre)	" " 1,50.
5.	Süsse	" " 1,50.

Wallnüsse (Juglans regia).

10.	Gewöhnliche, Hochstämme	p. St. M. 2,— bis 6,—
9.	Fertilis, (praeparturiens), frühtragende Zwergwallnuss	" " 1,50 " 2,50.

Haselnüsse (Corylus Avellana).

Gewöhnliche Wald-	p. St. 40 Pf., p. 100 St. M. 35.
Lamberts- u. Zellernüsse (in den folgenden Sorten)	
mehrfährige verpflanzte Ableger, sehr stark	" 60 " " 100 " " 50, p. 1000 St M. 400.
Desgl. nach meiner Wahl, sehr stark	" 50 " " 100 " " 45, " " 350.

No.		No.		No.	
2.	Badem Funduk.	12.	Grandis.	30.	Sämling, Ivess' langfrüchtiger.
3.	Bandnuss.	51.	Grossfrüchtige.	58.	Sicilianische.
16.	Barcelonaer, eckige.	22.	Kugelnuss, Grosse.	4.	Spanische, Barr's.
24.	Gubener.	44.	Lambertsnuss, rothe.	23.	Späte aus Kronberg, Grosse runde.
13.	" Loddiges'.	49.	" , weisse.	56.	Wunder, Bollweiler.
10.	Cob-nut.	15.	Lange, Downton's.	1.	Zellernuss, Althaldenslebener.
12.	Corylus Avell. grandis.	34.	" , Landsberger.	5.	" Bethe's.
54.	Daviana.	40.	Mogelnuss.	6.	" Blumberger.
28.	Dickschalige, Hohe späte aus Nikita.	60.	Multiferum.	9.	" Burchard's.
59.	Emperor.	57.	Piemontesische.	8.	" Büttner's.
17.	Einzeltragende, kegelförmig.	62.	Prolifque à coque serrée.	14.	" Cadetten.
61.	Frauentorfer, frühe.	26.	Riesennuss, Hallesche.	18.	" Fichtenwerder'sche.
41.	Fruchtbare, a. Northamptonshire.	43.	Römische Nuss.		

Mispeln. Quitten. Hagebutten. Weinreben.

No.		No.		No.	
21.	Zellernuss, Grosse bunte Dresdener.	31.	Zellernuss, Jahn's.	36.	Zellernuss, Link's.
50.	" Gubener	29.	" Italienische volle.	37.	" Ludolph's.
25.	" Gustav's.	32.	" Kircheisen's.	39.	" Minna's grosse.
27.	" Heynrich's.	33.	" Kunzenmüller's.	45.	" Sjekler's.
		35.	" Liegel's.	47.	" Truchsess'.

Mispeln (*Mespilus germanica*.)

2. **Grossfrüchtige**, sehr gut.
 1. Kernlose, (abortiva, sans pepins).
 6. Riesen-Mispel, (gigantea) } à St. M. 0,75.
 10 " " 6,—.

Quitten (*Pirus Cydonia*.)

3. **Constantinopeler.**
 7. Metzler (aus Metz) Apfel-Quitte.
 4. **Portugiesische** Birn-Quitte } à St. M. 0,75.
 5. Von Angers. } 10 " " 6,—.

Von No. 4 sind auch Hochstämme à St. 1,50 pr. 10 St. 12 M. abzugeben.

Neue Einführung: S. Persische Zuckerquitte, erhielt ich mit sehr guter Empfehlung aus dem Kankasus à St. M. 1,25 pr. 10 St. 10 M.

Hagebutten (*Rosa villosa*, *R. pomifera*.)

Grossfrüchtige à St. 60 Pf., 10 St. 5 M.



Weinreben.



Attest.

Unterzeichneter hat im Auftrage des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg, Staatsminister Herrn **Dr. Achenbach** Excellenz, die Baumschulen des Königl. Oekonomierath Herrn L. Späth, zu Neu-Britz bei Berlin eingehend auf Reblaus untersucht und bescheinigt hiermit, dass diese vollständig frei von solcher.

Neuer Garten-Potsdam.

October 1883.

Th. Nietner,

Kgl. Hofgärtner.

No.			p. St. M.
Tafeltrauben, 3—5 jährige Pflanzen.			
370.	Alicant, blauer		1,—
338.	Barillet Deschamps		1,—
133.	Bidwill's seedling, Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, I. Ranges, lässt sich gut treiben. Oct.		1,—
141.	Blanc d'Ambre, Sept., Fr. mgr., Beeren etwas zusammengedrängt, von ausgezeichneter Qualität, sehr fruchtbar		1,50
142.	Blussard, weisser, (Blussard blanc)		1,—
177.	Burgunder		1,—
134.	Champion, Traube gross, Beeren blau-roth, vorzügl. E. Sept.		1,50
376.	Chasselas blanc		1,—
144.	" blanc royal		1,—
130.	" conrable de Hongrie		1,—
82.	" de Montauban, Fr. gr., locker, B. weiss, Anf. Sept.		1,—
88.	" de Jerusalem		1,—
84.	" Jalabert, Fr. gr., locker, B. weiss, Sept.		1,50
68.	" de Negrepont, Traube gross, Beeren schön rosa, sehr wohlschmeckend, empfehlenswerth. Septbr. neu		1,25
81.	" doré de Seine et Marne		1,—
83.	" Duhamel, früh weiss, grosstraubig		—,75
92.	" gros blanc. Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., I. Ranges. E. Aug.		1,—
89.	" musqué de Nantes, Traube gr., locker, Beeren weisslichgrün, gross, sehr fruchtbar, I. Ranges. Sept.		1,—
340.	Cypro		1,50
5.	Diamant , (Diamant-Gutedel, Perltraube), Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, gr., eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. Sept.		1,25

Weinreben.

No.		p. St. M.
14.	Doleedo	1,—
367.	Dr. Schmidmann's Zuckertraube. s. früh, Aug.—Sept. neu!	1,50
341.	Duc de Magenta	1,50
33.	Elbling, Trb. gr., Beeren weisslich grün, sehr fruchtbar. Ende Sept.	1,—
191.	Rother	1,—
109.	Fénéron	1,25
344.	Findinto	1,—
346.	Fondant roux, Fr. gr., locker; B. gr. rosa, Sept.	1,50
196.	Frankenthaler, violett	1,—
76.	" blauer, (Black Hamburg), Trb. s. gr., Beeren dkl.-violett, vorzüglich! E. Sept.	1,—
132.	" de Coster, Trb. sehr schön, schwarz, früher als der gewöhnliche Frankenthaler	1,25
75.	Golden Hambro., Fr. gr., Beeren gr., ganz vorzüglich	1,25
369.	Gracian	1,—
247.	Grosser Weissler	1,25
246.	" von Lang	1,—
286.	Gros doré, gelb, mittelgr., M. Sept., neuere vorzügliche Tafeltraube	1,50
111.	Gros Guillaume, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., s. fruchtbar l. Ranges Oct.	1,25
306.	Gulab, schwarzer	1,50
71.	Gutedel, früher rother, mgr., B. gedrängt, sehr zu empfehlen	1,25
73.	" Krach-	1,50
44.	" Pariser , (Chasselas de Fontainebleau), früh, weiss, A.—M. Sept., s. fruchtbar, sehr beliebt	1,—
1.	" rother , Fr. zieml. lang, hellroth, mittelfrüh	1,—
2.	" weisser , Trb. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig und sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept.	1,—
349.	Joli blanc	1,—
115.	Kientzheimer, früher weisser (Gelbe Seidentraube) grosse, weisse, etwas gedrungene Traube, Anf. Sept.	1,—
116.	" grossbeeriger (Jvanneno à gros grain)	1,25
117.	Kowes, (Sang de Pierre)	—,75
107.	Lampar Fardevany, Trb. s. gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtbar. l. Rang. E. Sept.	1,—
11.	Leipziger, früher , (Früher weisser Malvasier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, s. süss und gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten; Aug.	1,—
28.	Lenné's Ehre, Trb. s. gr., locker. Beeren gelblich, gewürzt, feinschalig, October	1,—
157.	Madeleine Angevine, Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss; eine der besten frühen Sorten. Rebe wenig empfindlich u. sehr fruchtbar	1,—
128.	" précoce de Hongrie , Traube mgr., gedrängt, Beeren schwarz, klein, sehr fruchtbar. Sept.	1,50
106.	" royale, weiss	1,25
10.	Malinger, früher , (Chass. précoce de Malingre), Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. August	1,—
32.	Malvasier, blauer, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarzblau, gr., gewürzt, die beste und früheste der grossbeerigen blauen Sorten, auch sehr gut zum Treiben. Sept.	—,75
16.	" Fuhrmann's blauer, Sept.	1,—
368.	" Richter's, weiss. reichtragend, E. Aug.	1,50
12.	" rother, früher	1,—
37.	Malvoisie Martina	—,75
95.	Mataro, Beeren weiss, Anfang October	1,—
96.	Miller	1,—
97.	Milton, Trb. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem parfümirten Geschmack; fruchtbar. Sept., neu!	1,—
120.	Minestra, Trb. und Beeren mgr., locker, schwarz, mfrüh	1,—
355.	Mrs. Pince black muscat	1,50
360.	Muscadine royal	1,—
102.	Muscat blanc de Jesus, Traube mgr., locker; Beeren gelb, gross, fruchtbar. Anf. Sept.	1,50
100.	Muscat de la mi-août, sehr früh, schwarz	1,25
99.	" de Sarbelle, gr., runde schwarze Beeren, mittelfrüh	1,25
59.	" Lierval, schwarz	1,—
103.	" précoce de Saumur , grün	1,25
126.	Perle grosse noire, gross, schwarz	1,—
46.	Prinz Albert, weiss	1,—
362.	Queen Victoria noir	1,50
45.	" " weiss	1,25

Weinreben. Stachelbeeren.

No.		p. St. M.
188.	Riesling, weisser	1,25
104.	Rouge de Cantal	1,—
366.	Rother Ungar, Trb. mgr., laug, locker, wohlgeschm. Sept.—Oct.	1,—
186.	Schoenfeiler, rother	1,50
61.	Solferino, mgr., weiss mit röthlichem Hauche, reichtragend, Sept., sehr gut	1,25
170.	Sylvaner rother, Trb. mgr., sehr dicht, süss, Sept.	1,25
110.	Szilva szelo., gute ungarische Tafeltraube	1,25
195.	Traminer, hellroth, vorzügliche Tafeltraube	1,—
228.	weisser, vorzügliche Tafeltraube	1,25
65.	Trentham Black, Trb. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig u. süss, von eigen- thümlichem Geschmacke, reichtragend, Oct.	1,—

Folgende Sorten sind als tragbare Reben in Töpfen pr. St. 3 Mk. zu haben:

5. **Diamant.** 1. **Gutedel, weisser.** 2. **Gutedel, rother.** 44. **Gutedel, Pariser.**
11. Leipziger, früher. 10. **Malingen, früher.** 32. Malvasier, blauer. 360. Muscadine, royale.

Griechische und Kaukasische Weinsorten.

à Stück 1 Mk.; 10 Sorten à 1 St. 9 Mk

Diese Trauben zeichnen sich durch ihre enorme Grösse aus und werden gewöhnlich 3,—2 Kilogr.
schwer, dürften jedoch bei uns im Freien nur selten reifen.

No.		No.	
318.	Abzwaani, weiss.	316.	Kisil Jüssüm.
284.	Buddischuri, weisse Keltertraube.	318.	Mzwaani, weiss.
297.	Chamani nero, schwarz.	274.	Pechleri.
304.	Gozuli, weiss.	331.	Tetri, weiss.
244.	Griechischer, gelber.	268.	Trappa.
302.	Göss Jüssüm.	334.	Tschumata.
285.	Kischuri, rothe Keltertraube.		

Amerikanische Sorten.

10 Sorten à 1 Stück 7 Mk.

Da dieselben härter sind als unsere einheimischen Sorten, so eignen sie sich ganz vortrefflich für Laubengänge und halten, einiger Massen im Schutz stehend, unsere Winter ohne Bedeckung aus.

Einige von ihnen werden in Amerika auch als Tafelweine geschätzt u. zeichnen sich meist durch einen starken Muskatgeschmack aus, z. B. Nr. 74, 122, 138, 199, 282, 284, 287. Die hier nicht aufgeführten siehe bei den Ziergehölzen unter **Vitis**.

No.	pr. St. M.	No.	pr. St. M.
138.	Alexandra, blau	371.	York Madeira, sehr gute Sorte, reift auch in d. ungünstigsten Jahren vollständig
284.	Canby's August, schwarz	74.	Municipal red, roth
122.	Clinton, dklviol. 100 St. 50 Mk.	183.	Narzissa
511.	Creveling, schwarz, früh	287.	Northern Muscadine, hochroth
512.	Diana, hellroth, früh	282.	Rebecca, weiss
181.	Elisabetha, weisslich grün, früh	199.	Roger's Hybride, dunkelroth
50.	Isabella, schwarzblau. 100 St. 50 Mk		



Stachelbeeren.

Kräftige, 2 bis 3 jährige Pflanzen.

Englische.

Das folgende Sortiment enthält nur auserlesen gute und grossfrüchtigste Sorten.

	pr. St. M.	p. 10 St. M.
Schöne Sträucher mit Namen, sehr starke	—,40	35
desgl. nach meiner Wahl in mehreren Sorten, sehr starke	—,35	30
desgl. ohne Namen	—,30	28
ca. 1—1½ Meter hoch veredelte Stämme	1,50	—
desgl. nach meiner Wahl in mehreren Sorten	—,—	125

Stachelbeeren. Johannisbeeren.

No.		No.		No.	
	Rothe.	33	Green Gage.	52.	Golden Crown.
7.	Defiance, Leigh's.	41.	Greenriver.	59.	Governess.
8.	Emperor, Smith's.	31.	Green Willow, Johnson's.	63.	High Sheriff, Clayton's.
13.	Free from.	42.	Gretna green.	54.	Jolly Farmer, Chapman's.
11.	Goliath, Sproffon's.	46.	Hearth of Oak.	51.	" yellow.
1.	Jolly Miner, Greenhalgh's.	32.	(44) Independent, Brigg's.	61.	Marketmann.
2.	(14.) Jolly Printer.	38.	Laurel, Parkinson's.	58.	Pilot, Hill's.
5.	Monstruense.	47.	L'impériale verte.	56.	Plumper.
12.	Peace-Maker.	26.	Lord Douglas.	62.	Roaring Lion, yellow.
6.	Printer (nur Hochst.)	39.	Melon.	53.	Smuggler, Buerdsill's.
3.	Queen Mab, Williamson's.	35.	Mertensis.	57.	Two to one, Whiteacker's.
4.	Roaring Lion, Farrow's.	27.	Plain long green.	50.	Yellow Lion, Ward's.
10.	Sämling, Keen's.	43.	Rough.		Weisse.
9.	" Maurer's.	45.	Sämling, Buerdsill's.	80.	Apollo, Gibston's.
	Grüne.	34.	Pansner's.	77.	Balloon.
37.	Bang Europe, Leicester's.	25.	Smiling Beauty, Beaumont's.	82.	Mister.
28.	Duck-wing, Buerdsill's.		Gelbe	75.	Queen Mary, Morris.
36.	Duke of Bedford, Yeaf's.	55.	Bumper, Thompson's.	79.	Sämling Pansner's.
30.	Esmeralda, Leigh's.	64.	Bunker's Hill.	76.	Sampson, Crompton's.
29.	Freecost, Seaton's.	60.	Dublin.	78.	Shanon, Hopley's.
40.	Gabron green.			81.	Sir Sidney Smith.

Deutsche.

Diverse beste, grossfrüchtige Sorten in verschiedenen Farben, starke Sträucher
pr. St. 35 Pf., pr. 100 St. 30 M.

Amerikanische.

Früchte klein, roth, blau beduftet, ausserordentlich reichtragend, vorzüglich zum Einnachen und zur
Bereitung von Stachelbeerwein; da sie eine grössere Menge von Saft liefern als die europäischen;
starke Sträucher pr. St. 35 Pf., pr. 100 St. 30 M.

Johannisbeeren.

Kräftige Pflanzen.

	pr. 10 St. M.	100 St. M.
Nach Wahl des Bestellers	3,—	25
Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten	2,50	20
Weisse oder rothe und schwarze im Rummel	2,—	15
Hochstämme in den mit H. bezeichneten Sorten	p St. 1,25—	125

No.		a Stück Pf.	No.		a Stück Pf.
	Bunte.		II, 21.	Kirsch-Johannisbeere, rothe,	
59.	<i>Gloire de Sablons</i> , klein u. bunt	30		sehr gr. I.	30
14.	<i>Gestreifte Perl-</i> , klein u. bunt	30	23.	<i>Knight's Grosse, rothe</i>	40
	Rothe.		5.	Langtraubige , (Red currant),	
7.	<i>Buddens' Hellrothe</i> , gr. spät	30		gr. I.	30
58.	<i>Eyatt's Nova</i> , mgr. volltragend, (Ahorablättrig)	50	17.	<i>Ringens</i> , zieml. gr. langtraubig,	
42.	<i>Ahornblättrige</i> , mgr. u. klein	50		mfrüh I.	30
H. 34.	<i>Chenonceau</i> , gr.	40	44.	<i>Rothe Englische</i> , mgr. früh	30
65.	<i>De Jonghes rothe Dessert-</i> mgr., mfr.	40	10.	" <i>Holländische</i> , gr. I.	30
22.	<i>Frauendorfer, grosse</i> , Fr. gr.	40	II, 48.	" <i>Grosse</i> , gr. I., sehr fruchtbar	30
53.	Fruchtbare , (<i>La Fertile</i>) gr. voll I.	30	H, 61.	<i>Ruby Castle</i> , mgr. zieml. voll, süss	30
63.	<i>Fruchtbare v. Angers</i>	30	54.	<i>Schöne von St. Giles</i> , gr. u mgr. voll	40
15.	<i>Gondouin</i> , mgr., gut	30	2.	<i>Süsse, rothe</i> , mgr. wohlgeschmeckend	40
37.	<i>Kaisertliche, rothe</i> , mgr.—gr.	30	11.	<i>Versailler</i> , gr., reichtragend, sehr lange dichte Traube . . .	40
13.	(47) <i>Kaukasische rothe</i> , mgr. voll- tragend	40		Rosafarbige.	
			16.	<i>Champagner, Grosse fleischfarb.</i>	30
			12.	<i>Holländische, rosaroth</i> , gr. voll, gut I.	30

Johannisbeeren. Himbeeren. Brombeeren.

No.		à Stück Pf.	No.		à Stück Pf.
45	<i>Rosafarbige, gewöhnliche</i> , mgr fruchtbar	30		Schwarze , (Ahlbeeren, Cassia.)	
	Weisse.			Die schwarzfrüchtigen Sorten sind besonders zur Bereitung von Johannisbeersaft und Johannisbeer- wein zu empfehlen. Sie werden aber auch als Tafelfrucht vielfach den rothen u. weissen vorgezogen	
II. 67.	Brandenburger, Gr. weisse	30	9.	Ambrafarbige , gr., gut	30
32.	<i>Champagner, weisse</i> , mgr	30	49.	Bang up , sehr gross, l. grösste neue engl. Sorte, süss	30
51.	<i>Durchsichtige</i> , mgr, zieml. voll	30	28.	<i>Gewöhnliche Schwarze</i>	30
50.	<i>Esperens, weisse</i> , ziemlich gross, sehr voll, l. Q	40	56.	<i>Kentish hero</i> , gr.	30
33.	<i>Grosse Weisse</i> , gr. l.	30	64.	<i>Lee's Black Currant, neu!</i>	40
II. 20.	Holländische weisse , sehr gr und süss l.	30	6.	<i>Neapolitanische, schwarze</i> , (Black-Naples) gr. l.	30
1.	<i>Kaiserliche, weisse</i> , s. gr., gelbl., l.!	30	29.	<i>Ogden's</i> grosse l.	30
62.	<i>Weisse engl.</i> , s. gr.	30	8.	<i>Merveille de la Gironde</i> , gr. l.	30
60.	Perle blanche , mgr., süss, gut	30	3.	Victoria , schwarzfrüchtige, gr. l.	30
68.	<i>Kirsch, weisse</i>	40			
41.	<i>Weisse von Verrières</i> , mgr, zieml. voll	30			



Himbeeren.



Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten . . . pr. 100 St. 10 M., pr. 1000 St. 80 M.
Nach Wahl des Bestellers pr. 100 St. 20 M., pr. 1000 St. 180 M.

No.		à Stück Pf.	No.		à Stück Pf.
1.	Antwerpener, gelbe , mgr.	25	44.	<i>Knevett's Riesen-</i> , roth	25
8.	Barnet , gr. roth	25	31.	<i>Lemercier</i> , roth	25
23.	<i>Battler's Riesen</i> , roth	25	49.	Malta, remont , gelb	25
14.	<i>Bienenstock</i> , (beehive), gr., roth, voll	25	18.	<i>Merveille</i> , neue gelbe, remontirend	25
56.	Billard's immertragende , (Per- pétuelle de Billard), remont., roth; neuere Sorte;	30	9.	" rothe, remontirend	25
28.	<i>Brinkle's Orange</i> , orangegelb	25	22.	<i>Noupareil</i> , roth	25
25.	<i>Charters Fruchtbare</i> , rothe, sehr gross und gut	25	45.	<i>Paragon</i> , roth	25
7.	Chili- , rothe, (Riesen-H.), gr. voll	25	42.	<i>Philadelphia</i> , braun, grossfrüchtig und reichtragend	40
59.	Cuthbert , roth, gr., sehr reich tragd.; vorzügliche neue Sorte!	40	27.	<i>Princess Alice</i> , roth, spät	25
12.	<i>Englische grosse rothe</i>	25	21.	<i>Prinz von Wales</i> , roth	25
4.	Fastloff , roth	25	55.	Queen Victoria	30
19.	" neue, remontirend , roth	25	6.	Schöne von Fontenay , remontirend	25
10.	Grosse gelbe , sehr gut	25	46.	<i>Schwarze Herbst-</i> , (Autumn black), ohne Ausläufer	75
20.	Herrenhäuser, frühe rothe ,	25	48.	<i>Semper fidelis</i> , mgr., roth, s. fruchtbar	30
32.	" immertragende rothe, remont.	25	57.	<i>Stachelarme gelbe</i> , (Sans épine à fruit, jaune), grossfr., gelb, neuere Sorte	40
58.	<i>Herzog v. Brabant</i> , gr., roth, sehr reichtragend	25	16.	Sucrée de Metz , gr. gelb., remont.	25
47.	<i>Hornet</i> , roth	25	17.	<i>Surprise d'automne</i> , gelb, remontirend	25
			30.	<i>Vicepräsident French</i> , roth	30
			5.	Vorsters Grosse , roth	25

Brombeeren.

Die Früchte sind zur Bereitung von Fruchtsaft ganz vorzüglich geeignet. Die rankenden und die aufrechten haben meist schwarze, die himbeerartigen rothe Früchte. Die rankenden Sorten zieht man am besten am Spalier. Das 2jährige Holz, nachdem es Früchte getragen hat, muss entfernt werden.

Brombeeren. Erdbeeren.

No.		pr. Stück Pf.	10 Stück Mk.	No.		pr. Stück Pf.	10 Stück Mk.
39.	Allen's red polific, aufrecht, himbeerartig	30	2	44	Kittatiny , aufrecht	40	3
18.	Americanus caesius, aufrecht	40	3	7.	Lawton , (New Rochelle), aufr.	40	3
3.	Arenarius , rankend	30	2	45.	Mammuth , aufrecht	40	3
2.	<i>Armenische</i> , rankend	40	3	43.	Miners Trailing, rankend	50	—
40.	Arnold's Hybride, himbeerart.	40	3	26.	Newman's Thornless, aufrecht	40	3
23.	Dorchester , aufrecht	40	3	37	Ohio black cap, aufrecht	30	2
12.	Franconia, himbeerartig	40	3	10.	Rubus arcticus	40	3
17.	Gelbe amerikan., mgr., gelb	40	3	512.	„ crataegifolius, weiss-dornbl. B.	50	4
4.	Hybrid. fructu maximo, rankend	50	—	47.	Snyder	50	4
21.	Jaspisartige, gr. schwarzbl. weiss beduftet	40	3	28.	Walker, himbeerartig	30	2



Erdbeeren.



(Beste Pflanzzeit: August und September.)

Preise der Sorten nach meiner Wahl.

100 Stück der besten neuen in 4 Sorten	Mk.	100 Stück der besten älteren in 4 Sorten	Mk.
100 „ „ „ „ 10 „	12	100 „ „ „ „ 10 „	3
100 „ „ „ „ 25 „	18	100 „ „ „ „ 25 „	4
100 „ „ „ „ 2 „	25	100 „ „ „ „ 10 „	10
	2	1000 „ „ „ „ „	15

No.		pr. Stück Pf.	10 Stück Mk.	100 Stück Mk.
184.	Alexander , (Busse), grösste weisse	25	1,50	—
240.	Alpenerdbeeren , Frucht gross und schön, mit feinem kräftigen Wohlgeruche, trägt ununterbrochen vom Frühjahr bis zum ersten Herbstfroste. Sehr zu empfehlen	50	4,—	—
216.	Belle de Montrouge , interessante Neuheit. Die einzelnen Früchte sind von den blattartig erweiterten Kelchblättern wie von einer Manchette umgeben. Trägt von Anfang Juni bis zu den Nachtfrosten	40	3,50	—
217.	„ à fruit blanc . Dieselbe hat gleiche gute Eigenschaften, aber noch schöner sehen die weissen Früchte in der Manchettenform aus	50	4,—	—
144.	Blanche d'Orléans , weiss, sehr fein	20	1,—	6
145.	Brune de Gilbert , schwarzbraun, sehr aromatisch	20	1,—	—
158.	Double perpétuelle	20	1,—	—
179.	Gloire de St. Denis , roth, sehr starkwüchsig und dankbar	15	—,75	3
206.	„ d'Orléans	30	2,—	—
146.	Janus , gr., roth, oft fast doppelt	15	—,75	—
180.	Rankenlose, rothe , zur Einfassung von Rabatten recht gut	15	—,75	—
181.	„ weisse , do. do.	20	1,—	—
186.	Reine des quatre saisons	20	1,—	—
147.	Trouillet , gr., roth, sehr tragbar	20	1,—	—

B. Scharlacherdbeeren.

182.	Beehive , (Bienenstock), mgr., scharlachroth, sehr reichtragend, früheste der Erdbeeren	20	1,—	6
183.	May-Queen , (Malkönigin), mgr., scharlach, allerfrüheste Erdbeere	20	1,—	6

C. Moschuserdbeeren (Vierländer.)

190.	Monstrous Hautbois , schwarzbraun, sehr aromatisch, grösste dieser Gattung	20	1,—	—
29.	Royal Hautbois , mgr., ausserordentlich aromatisch	20	1,—	6

D. Grossfrüchtige (Ananas-) Erdbeeren.

121.	Admiral Dundas , sehr gross, kräftig und reichtragend	15	—,75	—
174.	Alpha , gr., lebhaft roth, Fl. fest blassroth, von köstlich erhabenem Geschmack. Sehr früh, vorzüglich zum Treiben	40	3,50	—
193.	Amy Robsart (Dr. Roden), s. frühe Treibsorte, sehr ertragr. u. aromatisch	40	3,50	—

— 40 —
Erdbeeren.

No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
37.	<i>Ananas perpétuelle</i>	20	1,—	—
98.	<i>Askot Pine-apple</i> , mittelfrüh	15	—,75	—
99.	<i>Avenir</i> , gr., eiförmig, glänzend hochroth	15	—,75	—
30.	<i>Bijou</i> , mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, spät, sehr fruchtbar	15	—,75	5
219.	<i>Black Defiance</i> , sehr gr., dkl.-roth, Fl. saftreich, fest und fein gewürzt; reichtragend. Eine ausgezeichnete amerikanische Varietät	40	3,50	—
44.	<i>Boule d'or</i> , gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, glänzend orange, ziemlich tragbar, spät, vielleicht die schönste bek. Sorte	15	—,75	5
80.	<i>British Sovereign</i> , s gr., mfrüh, s. reichtragend	20	1,—	—
137.	<i>Brown's Wonder</i> , neuere englische Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll, trägt hier nicht voll	15	—,75	—
220.	<i>Captain Jack</i> , gr., scharlachfarben, Fl. fest, guter Qual.; s. fruchtbare, mfrühe amerikanische Sorte	30	2,—	—
115.	<i>Carolina Superba</i> , gr., orange; mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren	15	—,50	3
221.	<i>Centennial Favorite</i> , gr., dkl.-roth, fein gewürzt, eine späte amerikanische Varietät	30	2,—	—
92.	<i>Ceres</i> , gr., dunkelroth, sehr saftreich, sehr tragbar	15	—,50	3
91.	<i>Charles Downing</i> , herzförmig, Fl. rosa, s spät	40	3,50	—
101.	<i>Châtelaine</i> , gr., brillant-carmoisinroth, auffallend lang	15	—,50	3
223.	<i>Cinderella</i> , gr., glänzend scharlachfarben, von feinem, aromatischem Geschmacke; fruchtbare, schätzenswerthe amerikanische Sorte	30	2,—	—
122.	<i>Cockscornb</i> , dick, kegelförmig, dunkelroth; sehr tragbar, spät	15	—,50	3
224.	<i>Continental</i> , gr., dunkelroth, Fl. fest, von guter Qual.; sehr fruchtbare und starkwüchsige amerikanische Sorte	30	2,—	—
93.	<i>Cornish Diamond</i> , sehr gross, dunkelroth; spät, reichtragend	20	1,—	—
222.	<i>Crystal City</i> , mgross, kegelförmig, hell-carmoisin, guter Qualit., sehr früh; amerikanische Sorte	30	2,—	—
209.	<i>Crescent seedling</i>	30	2,—	—
171.	<i>Deutscher Held</i> , ziemlich gr., dunkelroth, niedrig	20	1,—	—
170.	<i>Deutsche Kaiserin</i> , gr. oder sehr gr., carmoisinroth, mittelfrüh, fruchtbar	20	1,—	—
191.	" <i>Perte</i> , (Göschke), gr., glockenförmig, ähnlich der deutschen Kronprinzessin, weiss mit rosa Anhauch; früh	20	1,—	—
86.	<i>Director Führer</i> , sehr gross, hahnenkammförmig, mittelfrüh	20	1,—	—
173.	<i>Duc de Magenta</i> , ungeheuer gr., rund od. gelappt, kirschroth, ziemlich spät, Prachtvolle Dessert-Erdbeere	30	2,—	—
84.	<i>Duc de Malakoff</i> , sehr gross, dunkelroth, reichtragend	20	1,—	—
210.	<i>Duchesse</i> , eine der besten frühen; fruchtbar und starkwüchsig	40	3,—	—
94.	<i>Duke of Edinburgh</i> , sehr gross und schön	20	1,50	—
95.	<i>Early prolific</i> , gr., carminroth, früh, vorzüglich zum Treiben	20	1,50	—
139.	<i>Elisa Vilmorin</i> , (Gloede), die grösste Chili-Erdbeere, enorm gross, fruchtbar	20	1,—	—
81.	<i>Elton improved</i> , mgr., lebhaft roth, etwas späth	15	—,75	—
160.	<i>Eppendorf</i> , mgr., rund lebhaft rosa, mittelfrüh	25	1,50	—
187.	<i>Eugen Fürst</i> , (Göschke), gr. oder sehr gr., dunkelbraun, Form veränderlich, dauerhaft, sehr voll tragend, mittelfrüh	20	1,—	—
176.	<i>Exquisite</i> gr., rundlich, lebh. zinnoberroth; kräftig, reichtragend, mittelfrüh	30	2,—	—
117.	<i>Fairy Queen</i> , gross, von länglicher Form, glänzend orange, kräftig und sehr fruchtbar	15	—,75	—
110.	<i>Formosa</i> , gr., herzförmig, carmoisinroth, fruchtbar	15	—,75	—
167.	<i>Freiherr von Stein</i> , gr., roth, mittelfrüh, oft zusammengewachsen	20	1,50	—
97.	<i>Germania</i> , gr., oval, kräftig, frühreifend	15	—,50	3
225.	<i>Glendale</i> , gr., schön, lebhaft roth, Fl. fest, etwas säuerlich; werthvolle amerikanische Marktfrucht	40	3,50	—
67.	<i>Globe</i> , gr., von schöner und ovaler Form, carmoisinroth reichtragend	15	—,50	—
226.	<i>Golden Defiance</i> , mgr.—gr., dkl.-roth, Fl. zart, guter Qual.; ausserordentlich fruchtbar, soll oft Büschel von 12–15 Früchten bringen u. eine der besten und fruchtbarsten späten amerikanischen Varietäten sein	40	3,50	—
215.	<i>Gräfin Schaffgotsch</i> , (Göschke), neu! s gr., ovalherzförmig, glänzend, zinnoberroth, Fl. saftig, süss u. sehr gewürzreich; Pfl. starkwüchsig u. sehr reichtragend, mfrüh I Qualität!	40	3,—	—
85.	<i>Graf Bismarck</i> , von bedeutender Grösse, regelmässig, glänzend carmoisin bis dunkelpurpur, mittelfrüh	15	—,75	5
172.	<i>Graf Moltke</i> , sehr gr., breit kammförmig, dunkelbraun, fruchtbar, spät	15	1,—	10
199.	<i>Great American</i> , gr., glänzend dunkelroth, v. gutem Geschmack, starkwüchsig; neuere amerikanische Züchtung	20	1,50	—

— 41 —
Erdbeeren.

No.		10 St. Pl.	10 St. M.	100 St. M.
50.	<i>Gweniver</i> , schön gr., lebhaft orange, sehr fruchtbar, zum Treiben geeignet	15	—,75	—
124.	<i>Haquin</i> , sehr dick, oval konisch, dunkelroth ausgezeichnete späte Fr.	15	—,75	5
192.	<i>Helvetia</i> , (Göschke), gr., lang kegelförmig, lebhaft zinnberroth, reichtragend, mittelfrüh	50	—, —	—
195.	<i>Hundredfold</i> , (Dr. Roden), mgr., dunkelroth, kegelförmig, früh sehr ergiebig	25	1,50	—
153.	<i>James Carter</i> , gr., regelmässig rund, hell kirschroth, mittelfrüh	15	—,75	—
103.	„ <i>Veitch</i> sehr gr., lebhaft roth, fruchtbar, früh	15	—,75	5
118.	<i>John Powell</i> , mgr. od. gr., eiförmig, orangeroth	15	—,75	—
125.	<i>Jacunda</i> , gr., roth, spät, gedeiht in jedem Boden	15	—,50	3
238.	<i>Juliette</i> , gr., roth, guter Qual, enorm fruchtbar. Als späte Marktfrucht zu empfehlen	40	3,50	—
211.	<i>Kerr's prolific</i> , (Kerr), eben so schön wie Jacunda, aber besserer Qualität und ganz besonders fruchtbar	20	1,50	—
213.	<i>König Albert von Sachsen</i> , (Göschke), enorm gr., breit oval, glänzend orange-kirschroth. Fl. rosa, prachtvoll aromatisch; ausserordentlich fruchtbar, mfrüh	30	2, —	—
4.	<i>La Constante</i> , spät, ziemlich regelmässig, roth, Fl. fest	20	1, —	6
61.	<i>La robuste</i> , gr., rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar frühreifend	15	—,50	3
25.	<i>Lucida perfecta</i> , gr., regelmässig rund, lebhaft ziegelroth, ausserordentlich fruchtbar, spät; ganz vorzügliche Chili-Erdbeere	20	1, —	3
196.	<i>Maréchal Mac-Mahon</i> , s. gr., hochroth, sehr fest fleischig	15	1, —	—
241.	<i>Mammoth</i> , sehr gross und schön	50	4, —	—
188.	<i>Matador</i> , sehr gross, oft enorm, zinnberroth, regelmässig länglich, von angenehmem süss-säuerlichem Kirschgeschmack, sehr fruchtbar, mittelfrüh.	20	1,50	—
227.	<i>Miner's Great Prolific</i> , gr. — s. gr., carmoisinroth, guter Qual u. fruchtbar; vielfach empfohlene amerikanische Varietät	20	1,50	—
228.	<i>Monarch of the West</i> , gr., schön lebhaft roth, ausgezeichnete Qualität, mittelfrüh; amerikanische Sorte	30	2, —	—
197.	<i>Monseigneur Doupanloup</i> , (Dubois), neu! s. gr., länglich kegelförmig, bisweilen abgestumpft, scharlach, voll, schmelzend, sehr parfümirt, mfrüh, hält sich lange; sehr kräftig und sehr fruchtbar	40	3,50	—
198.	„ <i>Fournier</i> , neu! s. gr., abgestumpft, glänzend dunkelroth; Fl. fest, voll, schmelzend, ganz roth, von sehr angenehmen Geschmack; zum Treiben noch besser als Prince royal und Marguerite	30	2, —	—
14.	<i>Monstreuse de Rubine</i> , gr., kegelförmig, roth, sehr gut!	15	—,50	3
57.	<i>Napoleon III.</i> , spät, sehr reichtragend, sehr gross und schön	20	1, —	—
229.	<i>Nicanor</i> , mgr., kegelförm., hell-scharlach, guter Qualität, früh reifend und lange tragend, s. starkwüchsig u. fruchtbar; amerikanische Sorte	30	2, —	—
201.	<i>Phénomène</i> , (Mulié), neu! s. gr., 2—3 lappig gespalten, gleichend einer Doppelfrucht, scharlach; sehr robust, trägt früh und reich	30	2, —	—
230.	<i>Philadelphia</i> , mgr., kegelförm., hell-scharlach, Fl. ausgezeichnet, fest und saftig, kurz nach „Nicanor“ reifend; Pfl. starkwüchsig und fruchtbar; amerikanische Sorte	40	2,50	—
111.	<i>Président</i> , gr. oder sehr gr., rund und lappig, roth kräftig, fruchtbar	15	—,60	4
231.	„ <i>Lincoln</i> , gr. bis s. gr., unregelmässig gef. glänzend roth; Fl. zieml. fest, bester Qual, Pfl. starkwüchsig und fruchtbar; amerikanische Sorte	40	2,50	—
105.	„ <i>Wilder</i> , gr., schön konisch oder oval, karmoisinroth	15	—,60	—
112.	<i>Prince impérial</i> , mittelgr., lebhaft roth, fruchtbar, früh	15	—,60	—
205.	<i>Princess Alice</i> , frühe fruchtbare zum Treiben beliebte Sorte	25	1, —	5
104.	„ <i>Dagmar</i> , veränderlich, lebhaft rosa, früh	15	—,75	—
202.	<i>Professor Burvenich</i> , (Mulié) neu! gr., rundlich hahnenkammförmig, dunkel lackroth; Fl. dunkelrosa, zuckerig, saftvoll; ausserordentl. tragbar, mittelfrüh	40	2,50	—
214.	„ <i>Dr. Liebig</i> , (Göschke) neu! s. gr., schön regelm. eiförm., glänzend roth, von sehr gewürzreichem, den Moschus-Erdb. ähnl. Geschmack; mfrüh. Wegen d. fest. Fl. besond. als Marktfr. zu empfehlen	30	2, —	—
208.	„ <i>Pynaert</i> , (Mulié), neu! ausserordentl. gr., schön roth, hahnenkammförmig, abgeplattet, saftig, mfrüh. Sehr werthvoll	25	2, —	—
33.	<i>Progrès</i> gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpur, fest, reichtragend und früh. Sehr zu empfehlen!	15	—,50	3
237.	<i>Prouty's Seedling</i> , soll eine der besten neueren Sorten und von enormer Fruchtbarkeit sein	30	2, —	—

Erdbeeren. Moosbeere. Rosen.

No		pr. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
68.	Réus van Zuidwyk , s. gr., länglich u. hahnenkammförm. zinnoberr. etwas spät	20	1,—	—
106.	Rubis , gr., rund, glänzend roth, mittelfrüh	15	—,75	—
204.	Sanct Lambert , reichtrgd., z. Treiben u. z. Marktverk. ganz vorzüglich empf.	15	—,50	3
140.	Savoureuse , mgr., rundlich kegelförmig, scharlach, fruchtbar, mittelfrüh	15	—,75	5
232.	Seth Boyden , gr., lebhaft karmoisinroth, s. saftig u. ausgezeichnet fein gewürzt, mfrühe bis späte, reichtragende amerikanische Sorte	40	2,50	—
233.	Sharpless' Seedling , s. gr., unregelmässig getoimt, glänzend hellroth, mfrüh bis spät, wird v. den Herren Ellwanger & Barry in Rochester, Ver. Staaten, als die beste der von ihnen kultivirten Erdbeeren empfohlen	50	1,—	—
126.	Sir Charles Napier , schön und gross, herzförmig, orangeroth glänzend, sehr fruchtbar	15	—,50	3
5.	Sir Harry , gr., rund, scharlachroth, mfrüh, von enormer Fruchtbarkeit	25	2,—	—
162.	Sir John Fallstaff , sehr gross, glänzend orange; kräftig und sehr fruchtbar	20	1,—	—
236.	Somers Ruby , gr., fein gewürzt, fest-fleischig, s. reichtragend	40	3,—	—
119.	Souvenir de Kieff , gr., kegelförmig, zuweilen abgeplattet, fruchtbar, mittelfrüh	15	—,60	4
141.	Succès , gr., herzförmig, orange, sehr reichtragend, auf starken Stielen	25	1,50	10
189.	SurpasseBijou , gr., lebhaft zinnoberröth. regelmässig rund, sehr reichtragend	15	1,—	—
120.	Topsy , mgr. oder gr., meist lang, lebhaft roth, fruchtbar, mittelfrüh	15	—,60	—
156.	Unser Fritz , gr., regelmässig, lebhaft carmoisinroth; sehr fruchtbar, mfrüh	15	—,75	—
108.	Victoria Ovata , gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth, kräftig u. fruchtbar	15	—,60	4
166.	Waltham Seedling , gr., glänzend kirschroth, ziemlich spät	20	1,—	—
234.	Wilsons Albany , mgr.—gr., dklroth; soll in Nordamerika am weitesten verbreitet und überall sehr geschätzt sein	30	2,—	—
235.	Windsor Chief , gr., rund, dkl-karmoisinroth, Fl. fest von gutem Gewürz, reichtragend, in Nordamerika als die beste späte Marktfucht geschätzt	50	4,—	—
65.	White-Pine-apple , gr., regelmässig r., rein weiss, fruchtbar, sehr z. empfehlen	15	—,50	3

E. Grossfrüchtige Remontirende.

Sie tragen 2mal nur, wenn alle Ranken sorgfältig entfernt werden.

37.	Ananas perpétuelle , mgr., kegelförmig oder oval, scharlach	20	1,—	—
-----	--	----	-----	---

Amerikanische Moosbeere.

(*Vaccinium macrocarpum*, Cranberry).

Mit dieser grossfrüchtigen, der Preisselbeere im Geschmack ähnlichen Moosbeere, werden in Nordamerika Hunderte von Morgen bebaut und geben dort bedeutende Erträge. Auch bei uns sind bereits glückliche Versuche gemacht, und ist diese Pflanze auch hier auf feuchtem Moor- und Sandboden sehr ertragreich.

25	2,—	—
----	-----	---



Rosen.



Mein Rosensortiment umfasst circa 400 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt. Die mit **h** bezeichneten sind als Hochstämme vorrätig, die mit **m** bezeichneten als Mittelstämme, die mit **n** bezeichneten als niedrige auf den Wurzelhals veredelte oder wurzelechte.

Die eingeklammerten Zahlen hinter dem Namen bezeichnen das Jahr in dem die Sorte zuerst in den Handel gegeben wurde.

Allgemeine Preise.

Hochstämme	von 1,20—1,60 m Höhe	M. 1,50 bis
Mittelstämme	„ 0,60—1,10 m „	„ 0,75 „
Niederstämme	„ 0,30—0,50 m „	„ —,70 „
Niedrig veredelte oder wurzelechte Remont-, Bourbon-, Moos- u. diverse Sorten		—,50
Desgl. Thee- und Noisett-Rosen		—,70
Trauerrosen , 1,70—2,25 m hohe Stämme		M. 2,50 bis
Kletter- oder Rankrosen		„ 0,50 „

pr. Stück M.	100 Stück M.
2,50	140
1,25	65—110
—,70	—
—,50	40
—,70	60
4,—	—
—,75	45—70

NB. Hochstämmige Thee- und Noisettrosen sind 50 Pf. pr. St theurer falls sie besonders verlangt werden.

Rosen.

Für Handelsgärtnereien.

Rosen zum Treiben

aus dem Lande in 1-2jährigen Veredlungen auf den Wurzelbals
pro 100 St. 34 M., pro 1000 St. 300 M. *netto* in folgenden Sorten:

No.		No.		No.	
205.	Anna Alexieff.	7.	Général Jaqueminot.	439.	Mademoiselle Eugénie Verdier.
2.	Auguste Mie.	6.	Gloire de Dijon	204.	Marie Baumann.
30.	Aurore boréale.	549.	Horace Vernet.	809.	Michel Bonnet
405.	Baron Bonstetten	226.	John Hopper.	67.	Mistress Bosanquet.
31.	Baronne de Rothschild.	132.	Jules Margottin.	721.	Monsieur Boncenne.
34.	Baronne Prévost.	137.	La France.	421.	Paul Néron.
533.	Captaine Christy.	829.	Lamarque.	773.	Paul Ricaut
148.	Cathérine Guillot.	14.	La Reine.	399.	Président Thiers.
228.	Charles Lefèvre.	810.	La Syène.	150.	Souvenir de la Malmaison.
59.	Comtesse d'Oxford.	361.	Leopold Hausburg.	774.	" " " Reine d'Angleterre.
807.	Duc d'Anjou.	56.	Louise Odier.	833.	" " Poiteau
411.	Ducher.	552.	Madame Bonnet Eymard.	139.	Triomphe de l'exposition.
353.	Elisabeth Vignerou.	811.	" Charles Wood.	127.	Victor Verdier.
830.	Exposition de Brie-Comte-Robert.	391.	" Lacharme.		
452.	François Michelson.	333.	" Victor Verdier.		

Per 100 Stück 50 Mark netto:

No.		No.		No.	
417.	Madame Falcot	814.	Melanie Willermoz	709.	Safrano.
307.	Maréchal Niel.	553.	Perle des jardins.	182.	Souvenir d'un amie.
		708.	" de Lyon.		

Nyphetos per 100 Stück 75 M. netto.

Rosen in Töpfen.

1) Remontant- und Bourbon-Rosen. (Starke Wurzelhalzveredlungen)

pro 1 Stück 8) Pf., pro 10 Stück 7 M., pro 100 Stück 60 M.

No.		No.		No.	
445.	Alfred Colomb.	132.	Jules Margottin.	439.	Mlle Eugénie Verdier.
205.	Anna Alexieff.	137.	La France.	139.	Triomphe de l'exposition.
533.	Captaine Christy.	56.	Louise Odier.	127.	Victor Verdier.
226.	John Hopper.				

2) Monatsrosen

pro Stück 45 Pf., pro 10 Stück 3½ M., pro 100 Stück 30 M.

No.		No.		No.	
843.	Abbé Miolan.	855.	Capreolata odoratissima.	336.	Lawrenceana rosea.
842.	Alfred Aubert.	339.	Cramoisi supérieur.	675.	Nemesis.
844.	Beau Carmin du Luxemburg.	411.	Ducher.	658.	Paquerette.
845.	Bengalensis.	847.	Fellemborg.	850.	Prinz Eugène.
341.	" purpurea.	64.	Hermosa.	746.	Sanglant.

a) Remontant-Rosen (Oesterblühende).

	No.	
h. m.	412.	Abbé Bramere (72), gr., schön gebaut, carmin, braun-purpur nuancirt, reich in Büscheln blühend.
h. m. n.	515.	(666). Abel Carrière (76), gr., stark gef. und sehr gut gebaut, sammtig, schwärzlich purpur-violett, Centrum feurig roth.
h. m.	467.	Abel Grand (66), gr., weisslich rosa, atlas glänzend.
m n.	499.	Albert Payé (74), gr., fleischfarbig, rosa geflammt.
h. m. n.	445.	Alfred Colomb, gr., centifolienförmig, glänzend feuerroth, sehr wohlriechend.
h. m.	11.	Alpaide de Rotalier, gr., schön hellrosa.
n.	205.	Anna Alexieff, gr., hell lachrosa, s. kräftig, wenig rem.

Rosen.

h.	n.	26.	<i>Anna de Diesbach</i> (58), gr., schön schalenförmig, rosa mit leuchtend carmin; extra!
	n.	565.	<i>Antoine Mouton</i> (70), s. gr., centifolienförmig, prächtig lebhaft rosa, Rückseite heller; schön belaubt l.
h.	m. n.	2.	<i>Auguste Mie</i> , gr., rosa, leicht aufblühend, kräft. l.
h.	m. n.	30.	<i>Aurore boréale</i> , glänzend roth, gr.
h.	m. n.	405.	<i>Baron Bonstetten</i> 72), s. gr., schwarz samt.-erm; kräftig.
h.	m. n.	460.	„ <i>Chaurand</i> , gr., sammtig-scharlach, innen schwarzpurpur nüancirt, becherförmig.
h.	m.	435.	„ <i>Hausmann</i> (67), gr., stark gefüllt, prächtig carminroth, in Dolden blühend, s. schön!
	n.	34.	<i>Baronne Prévost</i> , s. gr., rosa, schön gefüllt, s. kräftig.
h.	m. n.	31.	„ <i>de Rothschild</i> (68), gr., zart rosa m. w. nüancirt, schöne Blume!
h.	m. n.	533.	<i>Captaine Christy</i> (74), s. gr., s. zart fleischfarb. rosa, Centr. dunkler.
h.	m. n.	228.	<i>Charles Lefèvre</i> (62), s. gr., schön purpur-violett mit leuchtend rothem Schein, voll, extra!
h.	m. n.	451.	„ <i>Margottin</i> , gr., blendend erm., Centr. leuchtend feuerroth.
	n.	691.	<i>Cheshunt-Hybride</i> (74), gr., becherförmig, dunkelcarminroth, Rückseite heller.
h.	m. n.	481.	<i>Climbing Victor Verdier</i> (72), gr., centifolienrosa m. lehtd. erm., kletternd.
h.	m.	523.	<i>Comtesse de Brosson</i> (74), gr., Centrum rosettförmig, leuchtend hell-rosa, weisslich gerandet.
h.	m. n.	59.	(768), „ <i>d'Oxford</i> (70), gr., leuchtend carmin mit roth nüancirt; schön belaubt.
h.	m.	568.	„ <i>de Sérénie</i> (75), s. gr., centifolienförmig, zart rosa m. erm. schattirt.
h.		657.	„ <i>Vally de Sérénie</i> (76), gr., gut gebaut, amarant-carminroth.
h.	m. n.	385.	<i>Coquette des blanches</i> (73), mgr., centifolienförmig, rein weiss mit grünlichem Schein, in Dolden blühend; kräftig, schön!
h.	m.	61.	<i>Docteur Andry</i> (65), gr., dkl.-roth mit leuchtend carminroth, schalenförmig.
h.	m.	49.	„ <i>Arnal</i> , mgr., leuchtend roth.
h.	m.	496.	„ <i>Brechemier</i> (74), gr., gut gebaut, fast kugelförmig, leuchtend carmoisin.
h.	m.	538.	<i>Doctor Wilhelm Neubert</i> (74), gr., centifolienförmig, dunkel-kirschroth mit purpur-violett und carmin nüancirt.
	n.	807.	<i>Duc d'Anjou</i> , gr., dunkelcarminroth.
h.	m. n.	222.	„ <i>de Cazes</i> , gr., leuchtend purp. erms. kugelförm., mkräft., rem. gut l.
h.	m.	654.	„ <i>de Montpensier</i> (76), gr., regelmässig gebaut, sammtig-roth, braunroth nüancirt; bis in den Spätherbst blühend, ausgezeichnet!
h.	m. n.	208.	„ <i>de Rohan</i> , gr., blendend zinnoberroth, kugelförm., Farbe beständig, mkräft., l.
h.		591.	<i>Duchesse de Vallembrosa</i> , gr., gefüllt, zart rosa, Centrum dunkelrosa in weiss rosa übergehend.
h.	m. n.	72.	<i>Duke of Edinburgh</i> (69), gr., erms. m. leicht erm. schattirt, reichblühend.
h.	m.	74.	<i>Edouard Morren</i> (70), s. gr., zart carminrosa, schön gebaut.
	n.	553.	<i>Elisabeth Vigueron</i> (65), s. gr., schalenförm., frisch rosa; kräftig; schöne Belaubung, ausgezeichnet!
h.	m. n.	185.	<i>Empereur du Maroc</i> , mgr., sammt. purp., in schwärzl. übergehend, mkräft., l.
h.	m. n.	78.	<i>Enfant de France</i> , sehr gross, weissfleischfarbig mit dunklerem Herz.
h.	n.	503.	<i>Ernest Herger</i> (74), gr., dkl. purp., leuchtend nüancirt.
h.		247.	<i>Eugène Appert</i> (61), gr., blendend sammtigcarmin, Holz und Laub dunkel; schön!
h.	m. n.	588.	(637.) <i>Eugène Fürst</i> (67), gr., Petalen breit, glänzend sammtig dunkelviol. u. lackroth.
	n.	530.	<i>Exposition de Brie-Comte Robert</i> , gr. gef., vollendet schön geformt, blendend roth, sehr effectvoll.
h.	m.	86.	<i>Félix Généro</i> (67), schön geformt, violett-rosa, sehr gut remontirend.
h.	m.	95.	<i>Feu brillant</i> , mgr., leuchtend feuerroth.
h.	m. n.	97.	<i>Fisher Holmes</i> , gr., blendend scharlach, zieml. gef. l.
h.	m.	155.	<i>François d'Arago</i> , mgr., sammt-amarantroth, dunkel nüancirt, reichblühend.
	n.	452.	„ <i>Michelson</i> , gr., gefüllt, centifolienförmig, schön dunkelrosa.
	n.	832.	<i>Gaston Lévêque</i> , lebhaft carmin, mit braunroth, zinnober, purpur und feuerroth nüancirt, remontirt s. gut.
h.	m.	612.	<i>Général de Cisse</i> (76), gr., gut gebaut, kugelförmig, leuchtend scharlachroth.
h.	m.	598.	„ <i>Duc d'Aumale</i> (76), gr., lebhaft dunkel-kirschroth, schalenförmig, gut gefüllt.
h.	m. n.	7.	„ <i>Jaqueminot</i> , gr., feurig roth m. Sammt, zieml. gef. kräft., rem gut l.
h.	m.	131.	„ <i>Washington</i> , s. gr., leuchtend roth, kräftig.
h.	m. n.	138.	<i>Gloire de Santenay</i> , gr., lebhaft dunkelpurpur, feste Petalen kugelförmig.
	n.	549.	<i>Horace Vernet</i> (67), gr., breite Petalen, sammtig purpur-roth mit dkl.-carmoisin nüancirt.
h.	m. n.	541.	<i>Hortense Mignard</i> (71), Petalen breit, lehtd. kirschroth, Rückseite fleischfarben, in Büscheln blühend.
h.	m.	126.	<i>Jacques Lafitte</i> , gr., dunkelcarmoisin roth, Rand heller, kräftig.

Rosen.

	No.	
h. m. n.	507.	Jean Dalmals (74), s. gr., schön gebaut, veränderlich rosa.
h. m. n.	294	„ Goujon (63), s. gr., schalenförmig, hellroth mit lila; kräftig.
h. m. n.	610.	„ Liabaud (76), s. gr., sammtig crms. mit schwarz.
h. m.	719.	„ Rosenkranz, gr., leuchtend korallenroth, von ausgezeichneter Schönheit.
h. m. n.	226.	John Hopper, gr., lebhaft crms.-rosa, schöner Bau, sehr gef., kräftig.
h. m. n.	132.	Jules Margottin, gr., lebhaft kirschroth, dachziegelartig, reichblühend, gut rem.
h. m. n.	237.	La Brillante, mgr., durchsichtig hellerm, in Rispen blühend, mkräft.
h. m. n.	829.	Lamarque, dunkelcrms. purp. nüancirt, sammtartig, mgr., compact, eine der dunkelsten Rosen.
h. m. u.	14.	La Reine, s. gr., rosa mit etwas lilla, schalenförm., reichblühend, ähnlich einer Centifolie, gut rem. kräft., I.
n.	810.	La Syreë, gr., amarantpurpur, in violett übergehend.
h. m. n.	155.	Léopold I., roi des Belges, s. gr., dkl. crms., s. gef., kräft.
n.	361.	„ Hausburg, gr., carmin mit braunroth und dklpurpur.
m.	816.	Lord Beaconsfield, sehr gross, gefüllt, dunkelcarmoisin.
h. m. n.	157.	Louise Wood, gr., schön leuchtend rosa, leicht gefüllt.
n.	668.	Louis Späth (76), gr., chinesisch rosa mit weiss nüancirt und berandet.
h. m. n.	159.	„ van Houtte, carminrosa, feurig nüancirt.
h. m.	258.	Madame Alfred de Rougemont (63), mgr., centifolienförmig, weiss mit leicht rosa; sehr reich in Büscheln blühend, eine der schönsten Weissen.
m.	635.	„ Alphonse Aubert, gr., hellroth mit carmin nüancirt, gut gebaut.
n.	811.	„ Charles Wood, s. gr., gefüllt, blendend roth in dunkelroth übergehend.
m.	620.	Ferdinand Jamain (76), sehr gr., schalenförmig, dkl.-carmin-rosa
h. n.	545.	„ Furtado, gr., s. gefüllt, lebhaft carminrosa, schalenförmig, gut gebaut.
n.	391.	„ Lacharme, s. gr., centifolienförm., Centrum weiss, leicht rosa schattirt, in rein weiss übergehend.
h. m. n.	119.	„ Louise Carrique, mgr., lehtd. dklroth, reichblühend in Büscheln, kräft.
h. m.	493.	„ Marie Finger (74), gr., voll, kugelförmig, leuchtend fleischfarbig-rosa, Centrum dunkler, reich in Büscheln blühend. Extra!
h. m.	433.	„ Moreau, s. gr., schalenförmig, leuchtend roth mit violett-nüancirt.
m.	511.	„ Nachury (74), sehr gr., voll, prachtvoll seidenartig rosa.
h. m.	20.	„ Rivers (50), mgr., blass-rosa; extra!
h. m.	392.	„ Scipion Cochet (73), s. gr., dachziegelförmig, lehtd. kirschrosa, silberig gerandet.
h. m. n.	333.	„ Victor Verdier, gr., lehtd. crm. schalenförmig, Blumen auf starken Zweigen, I.
h. m. n.	305.	Mademoiselle Amelie Halfen, gr., schöne Form, leuchtend crms., mstark.
m.	608.	„ Anne Marie Côte, gr., kugelförmig, rein weiss, bisweilen lila rosa schattirt.
n.	647.	„ Berthe Sacavin, gr., voll, kugelförmig, schön seidenartig rosa, Centrum heller.
h. m. n.	439.	„ Eugénie Verdier (70), mgr., voll, incarnat-rosa in weissrosa übergehend; I. Ranges
h. m. n.	508.	„ Eugénie Wilhelm (74), mgr., dunkelamarant-purp. mit schwärzlich u. feuerroth nüancirt.
h. m. n.	772.	Maréchal Vaillant, gr., leuchtend purpur, Prachtsorte, für Gruppen und zur Topfcultur.
h. m. n.	204.	Marie Baumann, gr., lehtd. roth, voller als „Général Jacqueminot“ reichblühend, I.
h. m.	483.	Marquise de Castellane (70), s. gr., s. regelmässig gebaut, leuchtend rosa; ausgezeichnet.
h. m. n.	212.	Maurice Bernardin, gr., lehtd. hell zinnoberroth, kugelförmig, in Büscheln blühend, I.
h. m.	539.	Miller Hayes (74), gr., becherförmig, carmin mit sammtartig blendendem hochroth, Centrum leuchtender; schön!
h. m. n.	721.	Monsieur Boncenne, gr., sammtig, schwarz-purpur.
h. m.	582.	Mr. E. Y. Thaes, gr., blendend dkl. kirschroth.
h. m.	524.	Paulin Talabot (74), gr., blendend dkl. rosa oder crm., sehr blühbar.
h. m. n.	421.	Paul Néron (70), s. gr., schöne Form, dklrosa, extra I.
n.	773.	Paul Ricaut, gr., carmin, sehr gute Treibrose.
h. m. n.	597.	Perle des blanches (73), mgr., schöne Form, rein weiss leicht geröthet, I.
h. m. n.	365.	Pierre Notting, gr., schwärzlich purp., tief schalenförmig, reichblühend, I.
n.	399.	Président Thiers (73), s. gr., ausgezeichnet gebaut, feuerroth; extra.
h. m. n.	242.	Prince Camille de Rohan (61), gr., sammtig dkl. crms. m. hochroth, kräft.
h. m. n.	216.	„ de Porcia (66), gr., gut gebaut, dkl. zinnoberroth.
h. m. n.	529.	„ Paul Demidoff (74), s. gr., hell carmin-rosa, mit weisslichen Rändern.
h. m. n.	218.	Puëbla, gr., s. feurig roth, becherförm., I.
h. m.	613.	Queen of Waltham, gr., gut gebaut und gefüllt, lebhaft roth mit carmoisin schattirt.
h. m.	874.	Reynolds Hole, gr., kastanienrothbraun, glänzend purpur nüancirt, s. schön, schalenförmig, Prachtrose, I. R.
h. m. n.	225.	Sénateur Favre, gr., lehtd. roth, rund gebaut.

Rosen.

h. m. n.	144.	<i>Sénateur Vaisse</i> , s. gr., voll und gut gebaut, dunkelcarmoisinroth.
h. m.	624	<i>Souvenir d' Arthur de Sansal</i> , mgr., schön geformt, lebhaft rosa, sehr wohlriechend.
n.	774.	<i>de la reine d'Angleterre</i> , s. gr. gef. schalenförmig, Blumenblätter fest, feurig hellcarminrosa.
h. m.	477.	<i>de l' exposition de Darmstadt</i> (72), gr., voll, gut geformt, schwärzlich sammet dkl. violett mit blutroth; Laub s. dunkel.
h.	488.	<i>de Madame Alexis Michaux</i> (74), gr., leuchtend dkl. rosa.
n.	833.	<i>de Poiteau</i> , gr. becherförmig, leuchtend lachsrosa.
h. m. n.	402.	<i>de Romain Desprez</i> (73), gr., fleischfarbig rosa mit schieferfarbener Nuance, Centrum leuchtender; schöne Haltung.
h. m. n.	490.	<i>de Spa</i> (74), gr., dklrth. mit feuerroth erhellt, prächtig.
h. m. n.	244.	<i>de William Wood</i> , gr., schwarz-purpur mit feuerroth, schalenförm., dunkelste der bis jetzt bekannten Rosen.
h. m. n.	245.	<i>du Dr. Jamain</i> (66), gr., voll, bläulich, schwarz-violett; eigenthümliche Färbung, schön!
h. m.	817.	<i>Star of Waltham</i> , gross, gefüllt, recht schöne Form, hellrosa.
h. m.	576.	<i>The Shah</i> (75), gr., voll, schön gebaut, leuchtend roth; s. reine, schöne Färbung!
h. m. n.	594.	<i>Thomas Mills</i> (74), s. gr., blendend erm. weissl. berandet, becherförmig, sehr blühbar.
h. m. n.	724.	<i>Tournefort</i> (68), gr., schön voll, mohn-roth.
h. m.	230.	<i>Triomphe de Caen</i> (62), gr., kugelförmig, sammtig-purpur, feuerroth schattirt.
n.	594.	<i>de France</i> sehr gross, gefüllt, schöne Form, prächtig leuchtend, carmin rosa.
h. m. n.	139.	<i>de l'exposition</i> , gr., sammt, dkl. crms., gut rem., mkräft I.
h. m. n.	257.	<i>Van Houltte</i> (71), sehr gr., dunkel feuerroth mit dunkel-crms. schattirt, prächtig centifolienförm., mkräft. I.
h. m. n.	127.	<i>Victor Verdier</i> , gr., crmrosa., schöne Form, rem. gut, mkräft.
h. m. n.	262.	<i>Vulcaïn</i> (62), mgr., leicht gefüllt, sammtig purpur-violett mit schwarzem Schein; reichblühend
h. m. n.	779.	<i>Xavier Olibo</i> , gr., gut gef., schwärzlich sammet mit feuerroth und amarantroth, Preisrose.

b. Bourbon-Rosen.

Die Rosen dieser Klasse besitzen weniger leuchtende Farben, zeichnen sich aber durch vollendete Formenschönheit, reiches Blühen und Remontiren aus

n.	749.	<i>Baron Gonella</i> , sehr gross, leuchtend violett, rosa
h. m. n.	45.	<i>Boule de neige</i> , mgr., rein weiss, rund wie ein Schneeball, gut rem I.
m. n.	148.	<i>Chathérine Guillot</i> , lebhaft rosa, Form vollendet, kräftig.
h. m.	114.	<i>Guiletta</i> (60) mgr., fleischfarb.-weiss, flach, regelmässig gebaut
h. m. n.	137.	<i>La France</i> (68) s. gr., silberrosa, Centr. lillaroza äussere Petalen leicht umgebogen, reichblühend, sehr elegant, mkräft., I.
h. m. n.	56.	<i>Louise Odier</i> , mgr., rosa, kräftig, vollendete Centifolienform. Gute Treibrose I.
n.	809.	<i>Michel Bonnet</i> , gross, gefüllt, leuchtend rosa.
h. m. n.	67.	<i>Mistress Bosanquet</i> , mgr., weiss, Centr. zart fleischfarbig, schalenförmig, sehr reich und lange blühend, kräftig. Gute Treibrose, I.
h.	692.	<i>Paxton</i> (52), gr., leuchtend rosa, feuerroth schattirt.
h. m. n.	381.	<i>Reine Victoria</i> (73), gr., schöne Form, leuchtend rosa, gut remontirend.
h. m.	270.	<i>Révérénd H. Dombrain</i> (63), gr., voll, glänzend rosa, Centrum carmin; sehr schön!
h. m. n.	150.	<i>Souvenir de la Malmaison</i> , s. gr., s. gef., leicht w. fleischfarb. atlasartig, reichblühend, kräftig. Gute Treibrose, I.!
h. m.	234.	<i>de Nemours</i> (70) mgr., frisch leuchtend rosa, Rückseite blassrosa.
h. m.	320.	<i>du Président Lincoln</i> , mgr., gut gefüllt, carmoisinroth, schwärzlich schattirt.

c. Noisett-Rosen.

In Rispen blühend, manche sehr reich, gut remontirend. Die grossen Blumen etwas hängend.

n.	342.	<i>Adélaïde Parie</i> , mgr., leuchtend-hellrosa in weiss übergehend.
h.	343.	<i>Aimée Vibert</i> , mgr., rein weiss, sehr dankbar und lange blühend; Laub glänzend dunkel grün.
h. m.	264.	<i>America</i> , gr., weissgelb, Centrum lachsgelb.
h. m. n.	376.	<i>Bouquet d'or</i> (73), gr. schön gebaut, dkl. gelb, Centrum leicht kupferig, wohlriechend, reichblühend; prächtig!
h. m. n.	231.	<i>Céline Forestier</i> , gr., flach, gelbl., Centrum dunkler, kräft. I.
h. m. n.	70.	<i>Chromatella</i> (43), gr., leuchtend gelb, in hellgelb übergehend; kräftig.
h. n.	378.	<i>Madame Caroline Küster</i> (73), gr., orange, kugelförm., reichblühend.
h. m.	558.	<i>Eugène Mahé</i> , mgr., rosa, Grundfarbe kupferig gelb.

Rosen.

	No.	
h. m.	479.	Mlle Favart
m. n.	447.	Réve d'or (70), stark gef., breit gebaut, dkl. gelb bisweilen heller.
h. n.	55.	Solfatare (43), gr., gelblich weiss, Centrum dunkelgelb, s. wohlriechend; Laub glänzend; kräftig.
h. n.	788.	Unique jaune, mgr., roth, kupfrig, gelb.

d. Theerosen.

Alle von feinem Wohlgeruch, sehr zarten Farben und hängendem Habitus, müssen im Winter gut gedeckt werden.

h.	No.	
	878.	Adam, rosa, weisslich erhellet, gross, gefüllt, kugelförmig, sehr wohlriechend.
h. n.	812.	Adrienne Christophe, gr., s. voll, kupferfarben, aprikosengelb, pfirsichrosa, nüancirt.
h. m. n.	287.	Alba rosea (63), gr., weiss, Centrum rosa; s. wohlriechend.
h.	372.	Anna Olivier (73), fleischfarbig-rosa, Rückseite rosa, voll, gut gebaut; reichblühend.
h. m.	756.	Beauty of Stapleford, s. gr., schöne Form, blass nelkenrosa, Centr. dunkel-rosa.
h. n.	456.	Belle Lyonnaise (70) gr., dkl. kanariengelb.
h. m. n.	703.	Clothilde, Bl. hortensienrosa, bisweilen violett, rosa oder roth, sehr variirend, sehr gross.
h. m. n.	352.	Duc de Magenta (60), mgr., stark gef., kupferig-fleischfarben; reichblühend.
h.	278.	Homère, mgr., fleischt. w. lebhaft rosa gerandet.
h.	836.	Jean Ducher, lachsgelb, Centr. pfirsichroth, gr., gefüllt, kugelförmig, reichblühend.
h. m. n.	6.	Gloire de Dijon, gr., lachsgelb, s. reichblühend, s. gut rem., kräft. I.!
h.	535.	Helvetia, gr., lachsrosa, Centr. pfirsich-rosa.
h.	815.	Kaiserin Augusta, gr., gefüllt, zuweilen centifolienförmig, hellgelb mit dunkelgelb nüancirt.
h. m. n.	409.	Madame Azélie Iubert (72), gr., lachsgelb, s. schön.
h. n.	540.	" Bérard (71), gr., hell rosa, s. schön.
h. m.	425.	" Camille (72), gr., kirschroth m. weisslichen Reflexen.
h.	449.	" Céline Noirey (69), gr., zart rosa, Rückseite purpurroth.
h. n.	374.	" Denis, gr., schöne Form, w., leicht schwefelgelb.
h. m. n.	419.	" de Vatry, gr., dkl. rosa, sehr angenehm riechend.
n.	436.	" Emilie Dupuy (72), gr., schön schalen- oder centifolienförmig, gelb mit lachsfarbenrosa; ausgezeichnet!
h. m. n.	417.	" Falcot, gr., nankinggelb in hellgelb übergehend; s. schön.
h. m.	601.	" John Taylor (76), s. gr., kupferig-weiss,
h. m. n.	430.	" Margottin, mgr., citronengelb m. pfirsichrosa im Centrum.
h. m.	459.	" Maurin, gr., gefüllt, weiss mit lachsrosa.
h. n.	505.	Mademoiselle Antonia Decarly (74) mgr., kapuziner-gelb; ausgezeichnet!
h. m. n.	655.	" Marie Berton, (76), s. gr., strohgelb in weiss übergehend.
h. n.	307.	Maréchal Niel, s. gr., dkl. gelb, becherförm., blüht spät. Holz nicht kurz zu schneiden. I!
h.	517.	Marie van Houtte, breit, schön gebaut, gelbl. weiss mit leuchtend rosa berandet.
n.	814.	Mélanie Willermoz, sehr gross, voll und schön gebaut, weisslich gelb, carmin schattirt.
n.	680.	Nyphetos, gross, fast gefüllt, rein weiss, beste weisse Winter-Treibrose, niedrig à St. I M.
h. n.	553.	Perte des jardins, strohgelb, gr., zuweilen dunkel kanariengelb.
h. n.	708.	" de Lyon, gr., dunkelgelb, zuweilen aprikosengelb.
n.	709.	Safrano, glänzend, aprikosenfarben.
n.	869.	Sombrenil, weiss mit rosa und lachsfarben, gross, gefüllt, kräftig wachsend und in Dolden blühend, hart.
h. n.	182.	Souvenir d'un ami, s. gr., lachsfarben-rosa, schalenförmig, wohlriechend, reichblühend, kräftig.
m.	555.	Tantine, (75); gr., hellkirschroth in solferinroth übergehend.

e. Moosrosen, Remontirende.

	No.	
n.	502.	Denil de Paul Fontaine, gr., dunkelpurpur mit feuerroth nüancirt.
h. m. n.	414.	Madame Soupert (72), mgr., lehtd. kirschroth, s. bemoost, s. blübar.
h. m. n.	199.	Salet (Mad. Salet), gr., hellrosa, schöne Form, wohlriechend, kräft.
h.	403.	Soupert et Notting, Blume sehr gross, leuchtend hellrosa, Centrum rosa.

f. Monatsrosen.

(Bengalensis, Semperflorens.)

	No.	
	843.	Abbé Miolan, purpurroth, mgr., leicht gefüllt, kugelig.
	842.	Alfred Aubert
	845.	Bengalensis, mgr., leicht gefüllt, als Knospe recht schön.

pr. St. 35 Pf. 100 St. 25 Mk.

Rosen.

No.	
341.	Bengalensis purpurea, mgr. dunkelpur.
339.	Cramoisi supérieur, leuchtend carmoisiuroth.
411.	Ducher. mgr., gefüllt, rein weiss, sehr reichblühend.
335.	Eugène de Beauharnais, mgr., purpur.
847.	Felleberg, carmin rosa.
870.	Lawrenceana minima, (Caprice des Dames) kl. rosa, s. zierlich, reizende kleine Blume.
336.	„ rosea, sehr klein, gefüllt, carmoisinrosa.
675.	Nemesis, schwärzlich purpur.
850.	Prince Eugène, mgr., sammtig dunkelpurpur.
746.	Sanglant, gr., veränderlich roth, zuweilen nancirt.

Die folgenden Sorten blühen nur ein Mal, u. verlangen meist einen langen Winterschnitt oder sind nur auszuschneiden

g. Moosrosen.

h. m. n.	193.	<i>A long peduncule</i> , mgr., zart rosa, in sehr reichen Büscheln blühend, vollkommene Centifolienform, auf langen Stielen stehend, kräft.
h.	n.	698. <i>Cristata</i> , gr., schön rosa, mit gefranzten, kammartigen Kelchblättern, sehr schön!
n.	n.	295. (189) <i>Gewöhnliche</i> , gr., rosa, schön! wurzelächt.
h. m. n.	196.	<i>Gloire des mousseuses</i> , gr., fleischfarb., rosa, Centr. dunkler u. gefaltet, stark bemoost.
n.	42.	<i>Marie de Blois</i> , gr., hellrosa m. Lilaschimmer, kugelförmig.
n.	694.	Weisse doppelte, (Blanche double).

h. Kletter- oder Prairierosen (*R. rubifolia*, *arvensis* etc.)

In unserem Klima an geschützte Lauben oder an Wände zu pflanzen. Ein mit Rosen bekleidetes Haus bietet in deren Blüthezeit einen wahrhaft prachtvollen Anblick.

n.	152.	<i>Beauty of the prairies</i> , mgr., leicht gef., lilarosa. I.
n.	347.	<i>Belle de Baltimore</i> , kl., milchweiss mit gelbl. Schein.
n.	522.	<i>Dundee Rambler</i> , mgr., weiss mit röthlichem Rand, halb gef., in Dolden blühend.
n.	690.	Fanny.
n.	349.	<i>Gracilis</i> , (<i>Boursaultii gracilis</i>), mgr., leuchtd. rosa.
n.	366.	Grosse Rankrose, gr., hellrosa.
n.	687.	<i>Praesident</i> , klein, hoch rosenroth, compact gefüllt.
n.	689.	<i>Pride of Washington</i> , lilarosa, sehr schön.
n.	154.	<i>Rouge</i> , gr., s. gef., m. weissl. Streifen, s. kräft. u. reichblühend. I.
n.	69.	<i>Ruga</i> , mgr., schalenförm., hell fleischfarb., in gelbl. übergehend, theeartig duftend, s. schlanke lange Zweige; sehr kräft., I.
n.	518.	<i>Russels de Cottage</i> .
n.	686.	<i>Scandens</i> , mgr., weiss mit fleischfarbenem Scheine; in Büscheln blühend.
n.	370.	<i>Triomphe de la Duchère</i> , mgr., weissl. rosa, flach, gut gef.
n.	688.	<i>Triumphans</i> .

i. Diverse.

n.	672.	<i>Alba unica</i> , weisse Centifolie.
n.	683.	<i>Bicolor</i> , (<i>R. lutea</i>), leuchtend orangeroth, Rückseite gelb. Alte bekannte Kapuzinerrose.
n.	338.	<i>Burgundiana rubra</i> , kl. dunkelviolet, rosa.
n.	311.	<i>Centifolia minor</i> , kleine Centifolie.
n.	673.	<i>Cinnamomea</i> , Zimmetrose; roth sehr früh blühend.
n.	685.	<i>Fortune's double yellow</i> , (<i>R. lutea</i>), gummiguttgelb m. erm. und lachsgelb
n.	679.	<i>Kaiserin des Nordens</i> , (<i>R. rugosa purpurea</i> pl.), gr., gef., purpur-violet; hübsche eigenthümlich mattgrüne Belaubung.
h. m. n.	48.	<i>Madame Plantier</i> , (<i>R. bybr.</i>), mgr., rein weiss, reichblühend I
n.	658.	<i>Päquerette</i> , kl., rein weiss gef., von der Form eines Gänseblümchen's (<i>Bellis perennis</i>): Strauch zwergig, reichblühend; allerliebst!
m. n.	44.	<i>Persian yellow</i> , (<i>R. lutea</i>), mgr., goldgelb, blüht nur an d. Spitzen d. vorjährigen Zweige.
n.	682.	<i>Rugosa</i> , gr. einf. carmoisin rosa, remont. grosse Früchte, herrliches Laub.
n.	783.	„ alba, mgr., weiss.



Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
Acer.				
b. 63.	<i>Pseudo-platanus Wortléi</i> , (nach Hrn. Friedr. Worlée in Hamburg ben.), neuer Ahorn mit goldgelben Blättern M 1—	2,—	9—18	*
15.	<i>tataricum</i> , L., Tatarischer, hoher, allbekannter Zierstrauch IV, V 0,50—	2,— 1,—	18 4—9	— *
Zweite Gruppe.				
a.				
25.	<i>nigrum</i> , Melx., (A. <i>saccharinum</i> , Wagenh.) Zucker-A., N.-Amer. II, III	—,60	5	—
	Hochstämme	1,75	—	—
* b. 27.	<i>pictum</i> , Thunb., <i>rubrum</i> (A. <i>colchicum rubrum</i> , Hrt.), m. rothen Zweigspitzen V.	1,—	—	—
16	<i>platanoides</i> , L., Spitz-A. mit glänzendem Laube, II, III (s. auch <i>Alleeb.</i>)	—,50	4	*
83.	" <i>columnare</i> Hrt., Säulenförmiger A.	1,25	—	—
17.	" <i>cucullatum</i> , Hrt., Hohlblättriger A.	1,—	9	—
	"	2,—	—	—
18.	" <i>dissectum</i> , Hrt., m. eingeschnittenen Blättern, IV.	1,—	9	—
b. 77.	" <i>fol. aureo-marg.</i> , Hrt., Gelbgerandeter, mit sehr scharf hervortretenden gelben Rändern, constant und hübsch	1,50	—	—
	" junge Hochstämme	2,—	—	—
20.	" <i>globosum</i> , Kugel-Ahorn	1,—	9	—
22.	" <i>Lorbergi</i> , Lorberg's A., mit scharfgezackten Blättern, rasch- wüchsiger als No. 18. Neuere Sorte	1,25	—	—
b. 78.	" <i>purpureum Reitenbüchi</i> , s. schöne Neuheit! Belaubung im Sommer u. Herbst bräunlich purpur, 2 u. mehrjährige Veredlungen M. 1,00 bis	1,75	9—15	*
	" junge Hochstämme	2,—	—	—
23.	" <i>Schwedleri</i> , Schwedler's A., mit blutrothen Zweigspitzen, altes Laub bräunlichgrün, sehr schön! III. 1—2 m. h.	—,80	7	*
	" schöne Hochstämme M 1,25 bis	4,—	10—22	*
	" <i>sehr gut als Alleebaum, besonders abwechselnd mit</i> <i>Acer neg. fol. arg. var. zu verwenden, pr. 1000 St.</i> <i>1000—1800 Mk.</i>			
b.				
28.	<i>campestre</i> , L., Feld-A., Massholder; IV., V. 1½—2 m. h.	—,40	3	*
b. 31.	" <i>pulverulentum</i> , Hrt., Bestäubtblättriger Feld-A., sehr hübsch	1,25	—	—
35.	<i>liburnicum</i> , Hrt., Liburnischer, sehr kleinblättr. VI.	1,—	—	—
36.	<i>Monspessulanum</i> , L., A. von Montpellier, kleinblättrig, V.	—,50	4	—
37.	<i>neapolitanum</i> , Ten., Laub mehr röthlich als unser Feldahorn	—,60	5	—
93.	<i>Semenovi</i> , siehe Neuheiten.			
40.	<i>tauricum</i> , Hrt., Taurischer A., kleinblättrig	—,80	7	*
98.	<i>trifidum</i>	1,—	—	—
Dritte Gruppe.				
41.	<i>dasy carpum</i> , Ehrh., (<i>ericarpum</i>) Silber-A., Unterseite der Blätter silbergrün, sehr raschwüchsig II, III, (s. auch <i>Alleebäume</i>) 2 m. hoch	—,50	4	—
b. 89.	" <i>albo variegatum</i> , siehe Neuheiten.			
46.	" <i>dissectum</i> Wagneri	1,25	—	—
79.	" <i>laciniatum Wieri</i> , siehe Neuheiten.			
60.	" <i>longifolium</i> , siehe Neuheiten.			
58.	" <i>lutescens</i> , siehe Neuheiten.			
43.	" <i>pendulum</i> , siehe Neuheiten.			
61.	" <i>pulverulentum</i> , siehe Neuheiten.			
80.	" <i>sanguineum</i> junge Hochstämme	2,—	—	—
45.	<i>rubrum</i> , L., Rothblühender A., blüht im April schön roth IV, III	—,60	5	*
59.	" <i>palmatum</i>	1,25	—	—
76.	" <i>tomentosum</i> M 1,00 bis	2,—	9—17	—
Vierte Gruppe, Negundo.				
47.	<i>Negundo</i> , L., Eschenblättr. A., sehr hell belaubt u. ausserordentlich raschwüchsig III, IV starke Sträucher 2 m. hoch	—,40	3½	*

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
	Acer.			
48.	Negundo, californicum, <i>Hrt.</i> , starkwüchsig, als Nr. 47 (s. auch Alleebäume)	—,50	4	*
56.	" crispum, Kraussblättriger A.	1,—	9	—
b. 49.	" <i>fol. argenteo var.</i> , <i>Hrt.</i> , Weissbunter, eines der schönsten bunten Gehölze, die bei uns im Freien aushalten. An den Rand der Gebüsche oder einzeln zu pflanzen. Einjähr. Veredl.	—,50	4	*
	" do. do. starke Pyramiden und Halbst. M. 1,00 bis	2,50	8 - 20	*
	" do. do. Höchst, besonders zu Alleepflanzungen zu empfehlen, wo sie abwechselnd mit grünblättrigen oder braunblättrigen Bäumen höchst effectvoll sind . . . M. 1,25 bis	2,—	10—18	*
	Alleebäume pr. 1000 St. (siehe Alleebäume) 1000—1500 M.			
50.	" <i>fol. aureo var.</i> , <i>Hrt.</i> , gelbblumblättriger	1,25	—	—
87.	" <i>heterophyllum</i> , siehe Neuheiten.			
57.	" violaceum, <i>Hrt.</i> m. s. dunkelgrünen Blättern (s. auch Alleebäume)	—,75	6	—
	Actinidia polygama (Prunus), <i>Max.</i> , neues Schlinggewächs aus Ost-Sibirien u. Japan, trägt Früchte von der Grösse der Stachelbeere und dem Geschmack der Weintraube	1,—	9	*
	Aesculus l., Rosskastanie 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 St. 12 M.			
	a) Eigentliche Rosskastanie (Hippocastanum),			
10.	digitata, <i>Hrt.</i> , Gefingerte, Blätter fingerförmig V	1,25	—	—
11.	floribunda, Reichblühende	1,25	10	—
	" do. do. Höchstämme M. 1,75 bis	2,50	—	—
1.	Hippocastanum, <i>L.</i> , " Gemeine, III. II 2m. hoch (s. auch Alleebäume)	—,60	5	*
2.	" <i>fl. pl.</i> Gefüllt blühende IV	1,25	11	—
	" do. do. Höchst.	3,—	—	—
4.	" <i>laciniata</i> , <i>Hrt.</i> , Geschlitzblättrige; s. feine Belaubung, schmalblättr.	1,50	12	—
b. 6.	" Memmingeri, Memminger's mit punktirten Blättern	1,25	10	—
32.	pumila fl. pl., Gefüllte Zwerg-K. M. 1,25 bis	2,—	—	—
7.	<i>rubicunda</i> , <i>Lodd.</i> (carnea Willd.), Rothblühende: blüht jünger und 14 Tage später als die Gemeine Kast., behält auch im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger. III. IV. (s. auch Alleebäume)	1,—	9	*
9.	" coccinea; dunkelroth M. 1,25 bis	3	—	—
33.	" <i>flöre purpureo</i> , purpurrothe	2	—	—
	b) Pavien (Pavia)			
	mit meist glänzenden Blättern und schwächerem Wuchse.			
14.	glabra, <i>Willd.</i> , Glattblättrige; blüht gelb, N.-Amer IV., V	1,—	9	—
15.	" Ohioënsis, <i>D. C.</i> , Glattblättrige, v. Ohio M. 1 bis	2,50	—	—
	" do. do. junge Höchstämme	3,—	—	—
16.	" pallida, <i>Willd.</i> , Glatte weissliche	1,25	10	—
17.	humilis, <i>Lodd.</i> (= pumila Willd.), niedrige Blüten rosa mit gelb	1,—	9	—
18.	hybrida, <i>D. C.</i> (= discolor. Prsh.) gelblich rosa, Kelch dunkelroth	1,25	—	—
19.	<i>lutea</i> , <i>Wangenh.</i> (Pavia flava, <i>Möneh</i>), Gelbbühende; V	—,80	7,—	—
	do. do. do. Höchst.	2,—	—	—
20.	Lyoni, <i>Hrt.</i> Pavie von Lyon M. 1 bis	2,50	9—22	—
28.	<i>macrostachia</i> , <i>Mohr.</i> (parviflora, <i>Walt.</i>), Strauch-P., blüht in grossen weissen Rispen im Hochsommer	1,50	—	—
22.	rubra, Poir, Blätter dunkelgrün, rothblühend	1,—	9	—
21.	marylandica, <i>Bth. C.</i> , P. v. Maryland	1,—	9	—
23.	Pavia atrosanguinea, Dunkelblutrothe P.	1,25	—	—
24.	" coriacea, <i>Hrt.</i> , Lederblättrige P.	1,25	—	—
25.	" mutabilis, <i>Spach.</i> , Veränderliche P.; Kelch rosa, Krone gelb	1,—	—	—
27.	" versicolor, verschiedenfarbig blühend, Kelch lebhaft roth	1,25	—	—
	Ailanthus , <i>Desf.</i> , Götterbaum .			
* 1.	glandulosa, <i>Desf.</i> , Aechter; m. sehr grossen gefiederten Blättern, schöner Baum, IV 1—2m. h.	—,40	3	*
	Akebia , <i>Dne</i> , Akebie .			
Sc 1.	quinata (Rajania), <i>Thunb.</i> , ein feinblättriger lianenartiger Kletterstrauch mit violetten Blüten, hat hier seit vielen Jahren ohne Winterdecke im Freien ausgehalten	—,75	6 1/2	—
	Alnus , <i>Gärtn.</i> , Erle (Else) 6 Sorten à 1 St. M. 6			

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
Alnus.				
2.	barbata, C. A. May, Bärtige; von den einheimischen Arten sehr abweichend, hübsch, III.	1,—	—	—
4.	cordata (Betula) Loix, Herzblättr. E.; Italien, IV M. 0,60 bis	1,—	5	—
6.	glutinosa, L. Roth-E.; III, II. . . . 2m. hoch (s. auch Alleeabäume)	—,40	3½	*
31.	" <i>aurca</i> , siehe Neuheiten.			
b. 7.	" fol. var., Gelbbuntblättrige R.-E.	1,—	9	—
9.	" <i>imperialis</i> , Hrt. Kaiserliche R.-E., sehr zierlich geschlitzt, IV	1,50	9—12	—
8.	" <i>laciniata</i> , geschlitztblättrige M. 1 bis	1,25	—	—
11.	" <i>quercifolia</i> , Willd., Eichenblättrige R.-E. M. 1 bis	2,—	—	—
35.	" <i>rubrinerva</i> Hort., Rothnervige Erle, junge Triebe braun . .	1,—	—	—
29.	" <i>sorbifolia</i> , Hrt., ebereschblättrig; s. hübsch	1,25	—	—
30.	" <i>tinctoria</i> , Hort., Färber-Erle	1,25	—	—
14.	incana, Willd., Weiss-Erle, Nordische Erle III. (s. auch Alleeabäume)	—,75	6	—
17.	" <i>laciniata</i> Hrt., Geschlitzte W.-E., wohl die schönste aller Erlen, III. M. 1 bis	2,—	9—18	*
33.	" <i>monstrosa</i> Hrt., siehe Neuheiten.			
19.	" <i>plicata</i> , Hrt., faltigblättrig stark	1,50	—	—
20.	" <i>sublaciniata</i> Hrt., halbgeschlitzte	1,25	—	—
13.	japonica, S & Z. Harinoki E. niedrig. Blätter glänzend, länger und schmaler als bei den übrigen Sorten.	1,50	—	—
32.	macrophylla, Desf.; sehr schöne grossblättrige Erle	1,25	—	—
28.	<i>Oregona</i> , Nutt, Oregon-Erle; hübsche Belaubung	1,25	—	—
23.	<i>ovata</i> , Hrt. u. Lodd, eiförmige mit kleiner, rundlicher, zierlicher Belaubung	1,25	—	—
24.	<i>rugosa</i> (Bet.) Ehrh. (=serrulata Willd.) rauhe	1,—	—	—
Amelanchier, Med. Felsenbirne.				
2.	canadensis, (Mespil.) L., (Amel. Botryapium, D.C.), Kanadische F.; im Herbst schön rothblättrig V.	—,60	5	—
4.	rotundifolia (Crataeg.) Lam. (Mespil-Amelanchier, L.); Gemeine F.; blüht sehr früh V, VI	—,30	2½	—
Amorpha, L. Uniform; alle blühen im Juli, meist bräunlich mit violett, und werden ziemlich hoch.				
8.	fruticosa, L., Strauchartig; macht mit seinen gefiederten Blättern einen sehr schönen Effect, gedeiht auch auf schlechtem Sandboden gut. VII. VI stark	—,30	2½	*
Ampelopsis, Mchx., Jungfernwein.				
5.	hederacea, Hrt., Aechter Klimmer , braucht nicht angebunden zu werden, sondern klimmt wie der Ephau an Mauern	—,60	5	—
11.	" minor, Hrt.	—,60	5	—
1.	<i>hirsuta</i> , Donn, Rauher Jungfernw., s. schön dunkelgrün, grossblättrig M. 0,40 bis	—,75	3—6	*
2.	<i>quinquefolia</i> , Mchx., Wilder Wein , extra starke, ca. 2 Mtr. lange Pflanzen mit 5—7 Ranken	—,75	6	*
	" schwächere, ca. 1 m. hoch	—,30	2½	*
3.	" <i>dissecta</i> , Hrt., hübsche, zierliche Belaubung	—,75	6	—
10.	" <i>serrata</i> , Hrt., scharf gezähnt	—,75	6	—
12.	<i>virginiana</i> , herzförmig gel. Blätter, sehr zierend. Virginien . . .	1,—	9	—
Amygdalopsis, siehe Prunus triloba.				
Amygdalus L., Mandel, Pfirsich.				
510.	communis fl. pl., Gemeine gefüllt blühende, hart mit reizenden Blüthen	1,—	—	—
508.	georgica, niedrig bleibend	1,—	—	—
509.	persicoides, Ser., Pfirsich-Mandel	1,25	10	—
* 502.	Persica dianthiflora pl., Gef. nelkenblüthige Pf.	2,—	—	—
500.	" <i>fl. pl.</i> , Gefülltblühende Pf; die härteste Sorte mit grossen hübschen röschenähnlichen Blumen	1,50	—	—
506.	" <i>fol. purpureis</i> , Purpurblättrige, Pf. hart u. recht constant. Die Farbe bleibt auch im Sommer purpurroth, die Früchte sind ganz dunkelroth M. 1,50 bis	2,—	13	—
* 503.	" <i>rosaeflora</i> pl., Gef. rosenblüthige Pf.	1,50	13	—

Ziergehölze.

No.		per Stück Mk.	10 Stück Mk.	hundert weise vorrätig			
Aralia, L., Aralie.							
↳ 1.	chinensis, L., (japonica. Hrt. = Dimorphanthus mandschuricus. Max.) M. 1 bis	1,50	9	*			
Aristolochia L., Osterluzei (Pfeifenwinde).							
5 1.	Sipho L'Her, Grossblättrige M. 1 bis	2,—	9—18	—			
Armeniaca, s. Prunus Armeniaca.							
Atrophaxis lanceolata, L., (Rgl.) 2,— — —							
Aukuba japonica in Töpfen							
21.	angustifolia	1,25	10	—			
22.	arborea						
6.	dentata varieg						
5.	fol. aur marg.						
10.	hermaphrodita						
3.	himalayca						
2.	latimaculata						
1.	longifolia						
14.	" dentata						
24.	" " varieg						
11.	macrodontha	1,—	8	—			
16.	punctata						
9.	pygmaea						
8.	salicifolia						
17.	viridis femina						
4.	" vera						
In schönem Rummel							
Aronia, s. Sorbus.							
Azalea, L., Azalee.							
mollis, Bl. (A sinensis Ledeb.), sehr schöne harte Species! In ge- mischten Farben, starke Pflanzen M. 1,50 bis					2,50	10—20	—
nudiflora, L., Nacktblumige A., weiss und rosa, reichblühend		2,—	—	—			
pontica, L., Pontische A., starke Pflanzen in den schönsten Farben (weiss, gelb und roth) gemischt M. 1,25 bis		2,50	10—20	—			
Berberis, L., Beberitze (Sauerdorn), 8 Sorten à 1 St. M. 5.							
a) Mahonien fiederblättrig, immergrün.							
1. 1.	Aquifolium, Frsh., Gemeine M., VII., ein sehr zierender und harter Strauch mit grossen gelben Blüthentrauben, starke Pflanzen, auch zu feinen Zierhecken empfehlenswerth	—,75	6	—			
b) Aechte Berberitzen.							
37.	heteropoda	1,—	9	—			
17.	Jacquin, Hrt., Jacquin's B.	—,60	—	—			
3.	japonica (Ilex) Thnb., Berberis Beali Fort) Japanische B., als Solitair- pflanze auf Rasen von reizendem Effect	1,25	—	—			
39.	integerrima, Bge., aus Turkestan, mit auffallend schöner Belaubung, graugrün, glänzend	1,50	—	—			
20.	macrophylla, Hrt., Grossblättr. B., sehr glänzendes Laub	1,—	9	*			
21.	microphylla, Förster (-dulcis)-buxifolia Buchsblättrige B., sehr schön .	—,75	6	—			
h. i. 35	" serrata, Hrt., Gesägt-kleinblättr. B., wohl die zierlichste aller Berberitzen mit kleinen, scharfgesägten Blättern und orange gelben Blüten	1,50	—	—			
40.	nepalensis, Hort., Nepal'sche	—,60	—	—			
b. i. 22.	Neubertii, Hrt. Bollc., Neubert's B., sehr schön grossblättrig mit glänzenden, elegant gezähnten Blättern, Bastard von Berb. Aquifolium	1,—	9	—			
24.	sinensis, Desf., (B. monosperma, H.) Chinesische B.	—,75	—	—			
38.	Thunbergii Hort., Thunberg's B., schön niedrig bleibend, die Blätter färben sich im Herbst schön roth	—,75	—	—			
25.	vulgaris, L., Gemeine B., VI, VII. Die rothen Beeren werden zum Einmachen benutzt	—,25	2	*			
b. 26.	" fol. atropurpureis, Hrt., Purpurblättrige B., sehr dunkel purpurfarbige Blätter, schön VII, VI, auch zu Hecken zu empfehlen starke Sträucher	—,40	3	25			
36.	" fol. aureo-marg., gelb gerandet, sehr schön	1,—	—	—			

Ziergehölze.

No.			per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorhanden
	Betula, L., Birke	10 Sorten à 1 Stück M. 8.			
1.	<i>alba, L.</i> , (B. odorata, Bechst.), Gemeine Weiss-B., III, s. auch Allee- bäume	ca. 2 m h	—,40	3,—	*
P. 7.	" <i>fastigiata, Hrt. Rolla, Pyramiden-W.-B.</i> , streng pyra- midal wie die Italienische Pappel	M. 0,75 bis	3,50	7—15	—
T. 21.	" <i>laciniata, Hrt.</i> , Geschnittblättrige W.-B., eine ausserordent- lich zierliche Art mit etwas hängenden Zweigen. Hoch- stämme M. 1.50 bis		2,50	—	—
b. 40.	" <i>purpurea, Hrt.</i> , Purpurblättrige W.-B., <i>eine der besten</i> <i>Neuheiten</i> , die in den letzten Jahren in den Handel kamen. Sie ist von hervorragendem landschaft- lichen Werth und ersetzt in den Gegenden wo die Blatbuche nicht gut gedeiht, dieselbe vollständig 1 jähr. Veredl.		—,75	7	60
"	" Hlbt. u. Pyramiden ca. 1.50—2.50 m. hoch M. 1.— bis	Hochst. M. 1.50 bis	2,50	9—22	100
"	" <i>urticaefolia, Lodd.</i> , nesselblättr. B., wegen ihrer zierlichen Belaubung sehr zu empfehlen		3,50	12—30	150
6.	<i>excelsa, Ait.</i> , hohe B., starkwüchsig, schön, II.	M. 1.— bis	1,25	10	—
8.	<i>fruticosa, Pall.</i> , (B. Gmelini, Byg.), Strauchartige B., VI.	M. 0.75 bis	2,—	6—12	—
34.	<i>humilis, Schrank</i> , niedrige Birke	Hochstämme	1,25	—	—
11.	<i>macrophylla, Hrt.</i> , Grossblättrige B.		1,50	—	—
15.	<i>papyracea, Ait.</i> , Papier-B.	M. 0.75 bis	1,50	—	—
16.	" <i>grandis, Bth. C.</i> , Grossblättr. Papier-B., starkwüchsig, II. III.		1,—	—	—
T. 18.	<i>pendula elegans Youngii, Hrt.</i> , neue sehr zierliche Hänge-B. M. 0.75 bis		3,—	—	—
31.	<i>persicifolia, Bth. Cat.</i> , pfirsichblättrige B. Die Belaubung schöner als die der meisten übrigen		1,—	—	—
19.	<i>pirifolia, Bth. C.</i> , Birnblättrige Papier-B., mit dunklem Laube		1,—	—	—
20.	<i>populifolia, Ait.</i> , Pappelblättrige B.	Hochstämme	2,50	—	—
22.	<i>pubescens, Ekch.</i> , Brocken-B.	2—3 m. hoch	—,75	6	—
42.	" <i>tol. var., Hrt.</i> , weissbunthättrig, 1—3 m.	M. 1.50 bis	2,50	—	—
36.	<i>Soccolevis, Hrt.</i> , in der Art wie <i>fruticosa</i>		1,—	—	—
T. 27.	<i>tristis, Hrt.</i> , Trauer-B., alte Rinde weiss, eine gut hängende Sorte; III. IV.	M. 0.75 bis	2,50	7—22	—
32.	<i>ulmifolia, S. et Z.</i> , (= <i>costata</i> Tranto.), Japan, Mandschurei, schöner Baum mit braunrothem Stamme, gegen Kälte nicht empfindlich		1,25	10	—
	Bignonia s. <i>Catalpa</i> und <i>Tecoma</i> .				
	Borya ligustrina, Willd. (Forestiera), Rainweidenblättrige Borya		—,50	4	35
	Broussonetia Vent., Papierbaum.				
* 1.	<i>papyrifera</i> (Moros) L., Aechter, mit feigenähnlichen, graugrünen Blättern, schöne Decorationspflanze, VI, VII.		—,60	5	—
	Buddleja L., Buddleie.				
5.	<i>curviflora, Hook et Arn.</i> , krummblüthige B.; Japan, sehr reich blühend		—,50	4	—
3.	<i>insignis</i>		1,25	—	—
1.	<i>Lindleyana, Fort.</i> , niedriger Strauch mit lila Blüten		—,50	4	—
	Buxus, L., Buxbaum.				
i. 16.	<i>Fortunei macrophylla</i> , 0,40—0,50 m. hoch	M. 1.50 bis	2,—	—	—
i. 18.	<i>microphylla</i> , kleibl. B., 20—50 cm. hoch	M. 1.— bis	2,—	9—18	—
i. 1.	<i>sempervirens, L.</i> , (B. arborescens, Lam.), Gemeiner baumartiger , VI, wird trotz seiner sehr zierenden Eigenschaften noch viel zu wenig angepflanzt. Die in der hiesigen Baumschule vermehrte Varietät leidet selbst bei —24° R. nicht. Für grosse Städte besonders auch zu empfehlen, da er gegen Rauch und Staub unempfindlich, auch im Schatten und hoch umbauten Gärten gut fortkommt 0,30—1,00 m. h. M. 0.75 bis		3,—	7—27	60-250
"	" 0,50—1,50 m. hohe schöne Pyramiden	M. 1,75 bis	6,—	15—55	140-500
"	Hiervon sind schön und gleichmässig geschnittene Pyra- miden zu Tausenden vorrätig.				
i. b. 2.	" <i>fol. arg. marg.</i> , Weissrandiger, VII.		1,—	9,—	—
i. 8.	" <i>Handsworthii, Hrt.</i> , B. von Handsworth		1,—	9,—	—
i. 3.	" <i>macrophylla, Hrt.</i> , Grossblättriger, 0,30—1,50 m. h. Pyram. M. 1.— bis		5,—	9—45	—

Ziergehölze.

No		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrätig
	Buxus.			
i. 23.	<i>sempervirens macrophylla glauca</i> , 40—50 cm. hoch, M. 1.50 bis	2,—	12—18	—
i. 4.	" <i>myrtifolia</i> , Myrtenblättriger, sehr hübsch, für Winter- Bouquets anstatt Myrten zu verwenden 0.50—0.90 m. hoch.	M. 1.75 bis	5,—	16—45
i. * 6.	subglobosa, Hrt., Kugelförmiger B., bleibt niedrig	M. 0.75 bis	1,50	7—13
i. 5.	suffruticosa, Willd., Gemeiner staudiger B., beliebt zu Einfassungen, p. laufenden Meter (aus 1 m. lassen sich circa 3 m. legen)	—,75	6	*
	Callicarpa japonica , japanische Schönfrucht. Ein sehr zu empfehlender Strauch, im Juli weissblühend 1jähr.	—,50	4	*
	Calophaca wolgarica , Blüten schön karmoisinroth, hübsche Steppen- pflanze, junge Mittelstämme	1,50	—	—
	Calycanthus , L., Gewürzstrauch.			
1.	floridus, L., Reichblühender, die braunen Blüten haben einen starken melonenähnlichen herrlichen Geruch	1,—	9	—
	Caprifolium , s. <i>Lonicera</i> .			
	Caragana , Lam., Karagane (Erlsenbaum) 10 Sorten à 1 Stück M. 8.			
	Alle besitzen zierliche gelbe Schmetterlingsblüthen im Früh-Sommer.			
1.	arborescens, Lam., Baumartige K., V. starke Sträucher	—,30	2	*
2.	" <i>nana</i> , Hrt., Niedrige K., kugelförmig VII. VIII. Hochst.	1,50	—	—
T. 3.	" <i>pendula</i> , Hrt., Trauer-K., 1½—2 m. hohe Stämme M. 1.25 bis	2,50	11—20	*
	" <i>starke über 2 m. hohe Stämme</i> m. starker Krone M. 2 bis	3,50	18—40	—
4.	Chamaelapa , Lam., Chinesische K. Hochst.	1,50	—	—
16.	frutescens, D. C., Strauchartige K.	—,40	—	—
6.	glomerata, Hrt., Büschelblättrige K., Laub dunkel, VII. M. 0.50 bis	1,25	—	—
9.	microphylla, Lam., kleinblättrige K., VII. M. 1 bis	1,50	—	—
T. 11.	pygmaea arenaria , Fisch., <i>gracilis</i> , Hrt., Hochst. M. 1.25 bis	1,50	—	—
12.	" <i>mollis</i> , Bess., (C. frutescens mollis, D. C.), Weichhaarige Zw.-K. Hochst. M. 1 bis	1,50	—	—
13.	Redowskii, D. C., Redowski's K., mit langgestielten Blüten M. 1 bis	1,50	—	—
14.	spinosissima (Robinia), Lamm., (C. spinosa, D. C.), Dornige K., Hochst. M. 1 bis	1,50	—	—
	Carpinus , L., Weissbuche (Hainbuche), s. auch <i>Ostrya</i>			
1.	americana, Willd., amerikanische W.	1,—	—	—
2.	<i>Betulus</i> , L., Gemeine W., Pyramiden ca. 1½—2 m. hoch	—,50	4	—
3.	" <i>Carpinizza</i> , Kit., Karpinizza-W. M. 1 bis	2,50	—	—
9.	" <i>fastigiata</i> , Hrt., Pyramiden-W. M. 1 bis	1,50	9—13	—
b. 4.	" <i>fol. arg.</i> var. <i>Hrt.</i> , Weissbuntblättrige W.	1,—	—	—
5.	" <i>fol. purpureis</i> , Hrt., Purpurröthliche W. M. 1 bis	2,—	9—18	—
6.	" <i>quercifolia</i> , Desf., (C. B. fol. incisis, Desf.), Eichenblättrige W., zierlich M. 1 bis	1,50	9—13	—
T. 7.	" <i>pendula</i> , Hrt., Trauer-W. M. 1 bis	2,50	9—22	—
	Carya , Nutt., Hickory , werden alle ziemlich hoch, machen gerade Stämme und haben schön gefiedertes Laub.			
9.	tomentosa, Nutt., (Jugl. alba, Mill.), Vexir-H. M. 0.75 bis	1,25	—	—
*	Castanea , Mill., Essbare Kastanie (Marone).			
14.	vesca, Gärtn. (C. sativa, Mill.), Aechte Kastanie	—,75	—	—
b. 14.	" <i>albo marginata</i> , sehr schön weissberandete Varietät	2,—	—	—
7.	" <i>cochleata</i> , Löffelblättrige C.	1,50	—	—
12.	" <i>heterophylla filipendula</i> , verschiedenartig fadenförmige Blätter, sehr originelles Ansehen	1,50	—	—
3.	pumila , Willd., Zwerg- oder Chincapin-Kast., blüht schon als junge Veredlung sehr dankbar und trägt reichlich Früchte	1,50	—	—
*	Catalpa , Scop., Trompetenbaum.			
5.	Bungei, C. A. May, Bunge's T., gedrungener als C. Kämpferi sonst sehr ähnlich	—,75	6	—
3.	Kämpferi, S & Z Japanischer	1,—	—	—
2.	" <i>nana</i> Hrt., (-Wallichii Hrt.), 1—2jähr. Veredlg.	1,—	—	—
7.	speciosa , Neuhett aus Nordamerika, wird auch als Waldbaum em- pfohlen und hält unsere Winter gut aus	—,50	4	*
1.	syringaeifolia , Sims., (C. bignonioides, Walt.), herrliche grossblättrige Dekorationspflanze, vorzüglich schön, wenn sie im August			

Ziergehölze.

No.	Catalpa.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weiser vorräthig
	mit ihren grossen rosskastanienähnlichen Blütenrispen geziert ist	—,50	4	—
4.	<i>syringaeifolia aurea</i> , Hrt.; mit goldgelben Blättern	2,—	—	—
8.	Thunbergi, Hrt.?, Thunberg's T. ähnlich No. 5	—,75	6	—
	Ceanothus , L., Säckelblume , alle blühen im Sommer sehr reich, wunderschöne Bouquetblume!			
1.	<i>americanus</i> , L., Amerikanische, VII, blüht silbergrau	—,30	2	*
	Celastrus , L., Baummörder .			
1.	<i>scandens</i> , L., Kletternder B., Stark wuchernde Schlingpflanze	1,—	9	—
	Celtis , L., Zürgelstrauch , gedeihen am besten halbschattig.			
2.	<i>australis</i> , L., Südlicher Z., V, IV	—,50	4	*
	<i>Cerasus</i> s. <i>Prunus</i> .			
	<i>Chaenomeles</i> s. <i>Cydonia japonica</i>			
	<i>Chamaecerasus</i> s. <i>Lonicera</i> .			
	Chionanthus , L., Schneeflocke .			
1.	<i>virginica</i> , L., Virginische S., mit grossen weissen Blütenrispen im Juni, muss jung bedeckt werden, VII, sehr zu empfehlen	1,—	9	—
	Cladrastis , Raf., Gelbholz (Virgilie).			
2.	<i>lutea</i> (Virgilia), Mchx., Aechtes G., VI, zierlich belaubt. M. 0,75 bis	2,50	—	—

Clematis.

			100 Stück M.	
14.	<i>apiifolia</i> , DC; weiss, wächst sehr üppig	—,75	6	—
16.	<i>brasiliensis</i> , hell-lila m. weissem Band, oft gef.	1,—	—	—
18.	<i>coerulea odorata</i> , Hrt., kl. röthlich-violett, ausserordentlich reich- blühend von prächtigem Wohlgeruch: nicht rankend	2,—	4 1/2	—
6.	<i>fusca</i> , Turcz., eigenthümliche graubraune Färbung; glockenförmig	—,60	5	—
9.	<i>graveolens</i> , hellgelb, starkwüchsig	—,75	6	50
26.	<i>Hendersoni</i> , Hrt., (Chandleri, Hrt. brit.), klein, glockenförmig, blau	—,50	4	35
29.	<i>integrifolia</i> , L. dunkel-veilchenblau, glockenförmig, Staude	—,50	4	35
30.	<i>intermedia</i> , blau, nicht rankend	—,50	4	35
104.	<i>montana grandiflora</i> , weiss, sehr starkwüchsig zur Bekleidung von Häusern und Lauben zu empfehlen	—,60	5	45
11.	<i>orientalis</i> , L. Morgenländische Waldrebe, gelb, feine blau-grüne Belaubung, s. starkwüchsig	1,—	9	—
111.	<i>paniculata</i> , Thunb., (Vitalba japonica), weiss, wohlriechend; blüht im September	—,75	6	—
10.	<i>sangorica</i> , Bnge., weiss, feine, hellgrüne Belaubung, nicht rankend; selten!	1,—	9	—
3.	<i>Vitalba</i> , L., Gemeine Waldrebe, weiss	60,—	5	45
4.	<i>Viticella</i> , L. Italienische Waldrebe, blau, sehr reichblühend, glocken- förmig	—,75	4—6	35—50
5.	<i>rubra</i> , röthlich	—,75	6	—
2.	<i>virginiana</i> E. vollkommen winterhart, wächst noch schneller u. wird grösser als die gemeine Waldrebe C. vitalba der sie in der Blüthe ähnlich ist. Zur Bekleidung von Häusern z. empfehlen	—,50	4	35

Grossblumige Varietäten.

Vorrath 40000 Stück.

Das hiesige Sortiment dieses schönen, noch viel zu wenig verbreiteten Schlingstrauches, ca. 190 Sorten umfassend, ist mit vieler Sorgfalt gesammelt und enthält die mannigfaltigsten, besten und neuen Varietäten.

Die angeführten Preise gelten für 1—3jährige Veredlungen mit Topfballen, welche das ganze Jahr hindurch versandt werden können.

Starke Pflanzen aus dem freien Lande ca. 2m. hoch 0,50 M. theurer.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Stück 9 M.

Nach meiner Wahl starke Pflanzen aus dem freien Lande p. Stück 1 M., p. 10 Stück 9 M.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
162.	<i>Alba magna</i> , reinweiss, wohl die zarteste der frühen Lanuginosa- Varietäten	2,—	18	—

Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

No.	Clematis.	per Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
131.	Albert Victor, lavendelblau m. hellerem Rande	—,75	7	60
145.	Alexandra, hell rötlich violett	1,25	—	—
146.	André Leroy, glänzend violett, 14 cm. breit, schöne Form	2,—	18	—
171.	Angelina, gefüllt, hell malvenfarbig	2,50	—	—
15.	Aureliana, porzellanblau, grbl	1,25	—	—
123.	Bangholm Beauty, malvenfarben, reichblühend	1,25	—	—
135.	Beauty of Surrey, hell grau-blau	2,—	—	—
101.	Bélisaire, hell violett m. breiten hellen Bändern, sehr hübsch	1,25	—	—
67.	Belle d'Orléans, purpur-violett, Staubbeutel purpur	1,25	—	—
172.	Belle of Woking, malvenartig bläulich, etwas Silberglanz	2,50	—	—
163.	Blue Gem., blassblau, in tief seidenmalvenfarb. übergehend	2,—	—	—
100.	Candidissima plena, weiss	1,25	11	—
159.	Claude de Lorrain, dunkelviol. fast gefüllt kugelförmig	2,—	18	—
167.	Coccinea, aus Texas eingeführt, Blumen glockenförmig, brillant hochroth	2,—	18	—
108.	Duke of Buccleugh, malvenblau, im Verblühen blass lila, runde Blume	1,—	9	80
125.	" of Edinburgh , reich dkl. purp-viol; eine der prächtigsten blauen	1,25	11	—
154.	" of Norfolk , tief malvenfarbig mit breiten hellen Bändern; neu!	1,50	13	—
157.	Duchesse de Cambacères, himmelblau, gross und schön	1,25	—	—
153.	Edith Jackmann, weiss m. zart malvenfarben; grossblumig; neu!	1,50	13	—
115.	Fair Rosamond, rosaweiss	—,75	7	60
116.	Fairy Queen, hell fleischfarben, gr., schön	1,50	13	—
86.	floribunda , weiss m. blass lila-rosa Bändern, grblum.	—,75	7	60
19.	Florida, rahmweiss	1,50	—	—
102.	" pallida, milchweiss, Ränder leicht violett	—,75	7	60
21.	Fortunei , weiss gefüllt	—,75	7	60
22.	Frankfurtensis dkl. violett, sehr reichblühend	6,75	7	—
—	" starke Pflanzen a. d. freien Lande	1,50	12	100
23.	fulgens, dkl. sammtig purpur	1,—	—	—
68.	Gem , lavendelblau, gross, schön geformt	1,—	9	80
117.	Gipsy Queen, leuchtend dunkel-purpur, spät blühend	2,—	—	—
24.	Gloire de St. Julien, weiss	1,50	—	—
69.	Henryi , rahmweiss mit lila Schein; gross	1,50	13	—
31.	Jackmani , dkl. violett, 11—12 cm. breit, sehr dankbar blühend, eine der beliebtesten Sorten	—,75	6 1/2	50
70.	Jeanne d'Arc, weisslich grau	1,50	—	—
32.	John Gould Veitch, lavendelblau gef., s. hübsch	1,25	11	—
129.	John Murray, dunkel-purpur, malvenfarben	1,50	13	—
71.	Lady Bovill, hellgrau-blau, anhaltend blühend, tassenförmig, neu!	1,25	—	—
99.	" Londesborough , silberig violett, hübsch	—,75	7	—
138.	" Stratford de Redcliffe, dunkel lila, schön!	—,75	7	60
33.	Lanuginosa, blaugrau	1,25	11	—
35.	" nivea, reinweiss, 6—8 Petalen, schön geformt, gross	1,25	—	—
97.	" pl., weiss gefüllt	1,25	11	—
74.	Lawsoniana , hell purpur-violett, schön geformt, s. gross	1,25	11	100
75.	lilacina pl. , hell lila, stark gefüllt, dankbar blühend, s. hübsch	1,—	9	—
118.	Lord Derby, hell-lavendelblau, Staubbeutel rötlich-purpur	1,—	9	80
109.	" Henry Lennox, hübsch hellblau m. milchweissen Mittelbändern	1,—	9	—
105.	" Londresborough, tief bläulich-lila mit kupferig purpurnen Bändern	1,—	9	—
119.	" Mayo, dunkel rosälila	1,25	—	—
76.	Napier, dunkel malvenrosa m. roth	1,—	9	—
77.	Lucie Lemoine, rein weiss, stark gefüllt, Staubb. hellgelb	1,25	—	—
158.	Mad. Emile Sorbet, Blatt ungetheilt, Blume prächtig glänzend hell-blau, Staubbeutel schwefelgelb	1,50	—	—
78.	" Grangé , herrlich leuchtend purpur-carmin, prächtig!	2,50	22	200
160.	" Thibault, neue, sehr blühbare Sorte	2,—	—	—
79.	" van Houtte , weiss in bläulich übergehend, sehr gross und schön gebaut	1,25	11	100
161.	Mlle. Elisa Schenk	2,—	—	—
80.	Magnifica , reich purpur mit carmoisin schattirt	—,75	7	60
141.	Maiden's blush, bläulich weiss	1,—	9	80
81.	Marie Lefebvre, hell-silberig, malvenfarbig	1,50	13	—

Ziergehölze.

No.	Clematis.	per Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
82.	<i>Miss Bateman</i> , milchweiss, gut geformt, reichblühend und schön, sehr empfehlenswerth! pr. 1000 St. M. 500	—,75	6 1/2	55
164.	<i>Mistress George Jackmann</i> , seidenweiss, sehr reichblühend	1,50	—	—
171.	" <i>Guiltes</i> , gr., schön weiss, gefüllt	1,25	—	—
142.	" <i>Hope</i> , seidenartig malvenfarben, dunkler bandirt, gross	1,—	9	—
106.	" <i>Howard Vyse</i> , weiss, an den Rändern lila gezeichnet	1,25	11	—
85.	" <i>James Bateman</i> , dkl. röthlich-lila in hell-lavendellila über- gehend, 13—15 cm. breit, schön	2,50	—	—
127.	" <i>Mellville</i> , weiss mit schwach rosa	1,25	—	—
136.	" <i>Moore</i> , weiss mit malvenfarb. Band, Centrum hell-mohnblau	2,—	—	—
130.	" <i>S. C. Baker</i> , lilaweiss m. weissen Bändern	—,75	7	—
107.	" <i>Villiers Lister</i> , weisslich rosa	1,—	9	—
63.	<i>modesta</i> , hell purpur violett, dunkler geadert, ausserordentlich reichblühend	—,75	7	—
143.	<i>Morikata Oké</i> , seidenweiss mit hell-lila	1,50	—	—
84.	<i>algireans</i> , dkl. violett, reichblühend	1,25	11	—
113.	<i>Otto Fröbel</i> , weisslich grau in rosa-lila übergehend, s. gross	2,—	—	—
38.	<i>patens amethystina</i> pl., weiss gefüllt	1,—	—	—
98.	" <i>candida</i> , milchweiss	1,—	—	—
39.	" <i>candilissima</i> pl., reinweiss, halbgefüllt	—,75	7	60
41.	" <i>Helena</i> , weiss	—,75	7	—
42.	" <i>insignis</i> , violett	—,75	6 1/2	55
43.	" <i>Louisa</i> fl. pl., rahmweiss	1,25	11	—
44.	" <i>Marie</i> , purpur-blau	—,75	7	—
45.	" <i>monstrosa</i> , rein weiss, halb gefüllt	—,75	7	—
170.	" <i>Sieboldi</i> , prächtig grau-blau	1,50	13	120
47.	" <i>Sophia</i> fl. pl., hell violett, gefüllt	1,—	—	—
49.	<i>Perfecta</i> , fast rein weiss, atlasartig, 12—14 cm. breit	1,25	—	—
51.	<i>Prince of Wales</i> , tief purpur-violett, ausserordentlich reichblühend, s. starkwüchsig, recht empfehlenswerth	—,75	6 1/2	55
89.	<i>Princess Mary</i> , hellrosa mit weissen Bändern	—,75	6	50
155.	" <i>of Wales</i> , dkl. bläulich-malvenfarben m. reichem Seidenglanz	2,50	22	—
87.	<i>Queen Guinevere</i> , violett-blau, schön gebaut, reichblühend	—,75	7	60
51.	<i>Reginae</i> , hell violett-blau, schön gebaut, gross	1,—	9	—
165.	<i>Reine blanche</i> , grünlich-weiss, Petalen gefranzt	1,50	13	—
90.	<i>Renaulti coerulca grandiflora</i> , schön dkl.-violett mit purpurnem Bande, 4—6 s. breite, rundliche Petalen, gross, schön geformt	1,50	13	—
144.	<i>Robert Hanbury</i> , bläulich-lila	2,50	—	—
52.	<i>Rubella</i> , dkl. sammtig roth-violett, herrliche runde Blume, sehr reich- blühend	—,75	6	50
66.	<i>Rubro-vioacea</i> , violett, 12—13 cm.	1,—	9	—
91.	<i>Sensation</i> , schön grau-blau, gute Form, gross, reichblühend	1,50	13	—
121.	<i>Sir Garnet Wolseley</i> , blau mit broncefarb. Reflex	1,—	9	—
54.	<i>Splendida</i> , dkl. kastanienbraun-purpur	—,75	7	60
55.	<i>Standishi</i> , dkl. violett mit metallischem Glanz, schön geformt, sehr reichblühend	—,75	7	60
92.	<i>Star of India</i> , röthl. pflaumenfarb. m. purpur-braun. Band, reichblüh. Stella, leicht viol. m. deutlichen, dkl. pflaumenrothen Mittelbändern	—,75	6	50
132.	"	1,25	—	—
75.	<i>Sylph</i>	2,—	—	—
122.	<i>The Queen</i> , malvenlila, reichblühend	—,75	6	50
128.	<i>Thomas Tennent</i> , reinweiss, grossblumig	1,50	13	—
112.	<i>Tombridgensis</i> , dkl. röthlich-purpur, 4—6 breite Petalen, gut geformt, reichblühend	1,50	13	—
56.	<i>Van Houttei</i> , weiss mit violettem Schein	1,25	9	—
96.	<i>Velutina purpurea</i> , schön schwärzlich purpur, 13—15 cm., sehr reich- blühend; eine der dunkelsten	1,25	—	—
57.	<i>venosa</i> , röthlich-purpur, heller geadert, mit hellerem Rande, sehr reichblühend	—,75	7	—
133.	<i>Vesta</i> , weiss, 7 Petalen	1,50	13	—
103.	<i>Victor Lemoine</i> , blau-violett	1,25	11	100
168.	<i>Virella alba</i> , neue, sehr schön weissblühende Var.	2,—	16	—
64.	" <i>purpurea</i> , ähnlich Jackmani	1,—	8	—
166.	<i>William Kennet</i> , tief lavendellila	1,50	13	110

No.		per Stücl M.	10 Stücl M.	hundert- welche vorrätig
	Colutea L., Blasenstrauch.			
1.	arborescens, L., Baumartiger B., blüht gelb, den ganzen Sommer hin- durch, V. VI.	—,30	2 1/2	*
2.	" crispa, Hrt., Krausblättriger B.	—,75	—	—
4.	istria, Hdt., (C. Halepica Lam.), Istrischer B., m. braungelben Blüten, VI.	—,50	4	—
3.	" pygmaea, Hrt., Istrien, Holz bräunlich orange, Blätter blau- grün, compact	—,75	6	—
6.	orientalis, bräunlich orange, heller als No. 4	—,40	3	—
	Comptonia s. Myrica.			
	Corchorus s. Kerria.			
	Cornus L., Hartrigel.			
11.	alba, L., (C. stolonifera, Mchz.), Weisser H., V., Holz braunroth im Winter, Blüthe und Beeren weiss	—,25	2	*
b. 15.	alba fol. arg. marginatis, Blätter weiss gerandet, constant u. schön	—,70	6	50
21.	alba var. Spaethii, S. Neuheiten.			
2.	Amomum, Mill., (C. coerulesc., Lam., C. fastigiata, H.), Bläulicher H., V., VI.	—,35	3	—
3.	" sericea, Hrt., Seidenhaariger H.; VI, VII	—,50	—	—
5.	australis, C. A. Mey.	—,60	5	—
6.	citrifolia, Hrt., (candidissima, Mtt.), feinsblättrig	—,60	—	—
8.	masculata, Dur., (C. mas, L.) Kornelkirsche, blüht schon im März, V., VI	—,35	3	*
b. 14.	fol. arg. marg., Blätter weiss gerandet, constant u. schön	1,—	9	—
19.	paniculata, Lher., Rispenblüthiger H.	—,75	6	—
9	sanguinea, L., Gemeiner H., VI, V.	—,30	2	*
b. 10.	fol. var., H., Buntblättriger gem. H., VI	—,50	4	—
b. 17.	fol. arg. var. elegans, zierlicher Buntblättr.; eine sehr hübsche Varietät, noch schöner als No. 15 (auch höchst veredelt) M. 0,75 bis	2,—	6—10	—
12.	sibirica, Hrt., (C. tatarica, Mill.), Sibirischer H., mit korallenrothem Holze, sehr zierend, VII	—,50	4	35
	Coronilla Emerns, L., Scorpions Krönenwicke	—,40	3	—
	Corylopsis spicata, Japan, S. et. Z., Scheinhasel, gelbblühend	1,50	—	—
	Corylus, L., Hasel, (s. auch Obst).			
501.	Avellana, L., Gemeine H., V, IV	—,40	3 1/2	*
b. 502.	" atropurpurea, Hrt., Blut-H., Blätter dunkelpurpur, s. schön	—,75	6	*
b. 503.	" aurca, H., Goldblättrige H., noch neu!	2,—	18	*
513.	" fol. medio-purpureis, s. Neuheiten.			
504.	" laciniata, H., Geschlitzte H., sehr zierend	—,60	15	*
T. 505.	" pendula, H., Trauer-H., noch neu! M. 1,50 bis	4,—	—	—
506.	" quercifolia, Hrt., Eichenblättrige H.	—,75	6	—
510.	rostrata, Ait., (= cornuta Hrt.) Verein-Staaten, Canada Schnabelhasel.	—,75	6	—
508.	Colurna, L., Byzantinische Baum-H., V., IV., stets baumartig und pyramidal M. 0,50 bis	2,—	4—15	—
	Cotinus, s. Rhus.			
	Cotoneaster, Med., Zwergmispel.			
10.	borealis, Hrt., Fr. korallenroth	—,75	—	—
2.	lucida, Schlecht., Blätter glänzend, Fr. schwarz	—,70	6	—
i. * 3.	microphylla, Wall., Kleinblättrige Z., VIII, Blüten myrtenähnl., Fr. roth Hochstämme, sehr schön	—,60	—	—
4.	nigra, Wahlb., (C. laxiflora, Jacq. fl.), Schwarzfrüchtige Z., VII, VIII.	2,—	18	—
12.	nummularia, F. et M., Fr. roth	—,50	4	—
* h. i. 7.	Simmondsii, H., Simmonds Z., VI, sehr hübsch, mit korallen- rothen Beeren, bietet uns Ersatz für die sehr empfindliche Mespilus pyracantha	—,60	—	—
8.	sinensis, Hrt. gall., Fr. schwarz	—,70	6 1/2	—
9.	tomentosa (Mesp.), Ait., Belaubung graugrün, Fr. roth	—,75	7	—
	Crataegus, L., Dorn. 20 Sort. à 1 St. M. 10, 10 Sort. à St. M. 5.			
	a) Scheinmispeln, baumartig, grossblumig.			
20.	grandiflora, Sm., (Cr. stipulosa, Hrt.), Grossblumige Scheinn. M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
	Hochstämme	2,00	—	—
21.	leucophloeos, Mnech., (Cr. pirifolia, Ait.), Urnenfrüchtige Sch., Fr. orange M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
	Hochstämme	2,00	—	—
70.	punctata, Ait., Punktirtfrüchtige Sch., Fr. glänzend dunkelroth, schwärz- lich punktirt	—,75	6	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrethig
	Crataegus.			
	b) Beerenmispeln (Microcarpae), Sträucher mit sehr vielen gelb-rothen Früchten.			
23.	<i>populifolia</i> , Walt., (cordata, Mill.), Fr. korallenroth . . . M. 0,60 bis	1,—	—	—
	c) Dornmispeln (Parvifoliae), niedrige Sträucher, sparrig, klein- blättrig, mit langen Dornen und grünlichen Früchten.			
24.	<i>Ilava</i> , Ait., (flexispina, Mach.), Glatte Dornen M. 0,60 bis	1,—	—	—
25.	<i>uniflora florida</i> , Loud., Reichblühender einblumiger Dorn, merkwürdig durch die auffallend langen Dornen, Zweige fein, ruthen- förmig; sehr zierlich	—,75	—	—
	d) Scharlachdorn , (Coccineae), starke Sträucher, Früchte roth und gross.			
27.	<i>coccinea</i> , L., Gewöhnlicher Scharlachd. M. 0,50 bis	—,75	4—6	*
29.	<i>glandulosa</i> Ait. (purpurea Hrt.), Frucht gross, roth, apfelförmig . .	—,75	—	—
66.	<i>rotundifolia</i> , Mach., Rundblättriger Purpurdorn	—,60	5	—
	e) Hahnsporndorn , (Crus Galli), starke Sträucher mit grossen glänzenden Blättern und rothen Früchten, alle sehr schön.			
33.	<i>Crus galli</i> , L., (Crat. pyracanthifolia, H.), Gemeiner H.	—,50	4	*
34.	" <i>ovalifolia</i> , Hort., Breitblättriger H. M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
28.	<i>Douglasii</i> , Lindl. (glandulosa, Mönch., Crus galli ovalifolia, Hrt.), sehr schön behaart, langdornig M. 1 bis	1,50	—	—
37.	<i>Fontanesiana</i> , Steud. (-badia, Hrt., = Bosciana, Hrt.), Fr. braunroth, M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
69.	<i>linearis</i> , Hrt., schmalblättrig M. 0,60 bis	1,—	—	—
38.	<i>prunifolia</i> , Poir., (Crat. Crus galli splendens, Hrt.), Pfannenblättr. H. sehr schön in der Blüthe und in der Fruchtreife M. 0,50 bis	1,75 1,50	4—13	*
	Hochstämme	—	—	—
39.	<i>salicifolia</i> , Med., Weidenblättriger H., Fr. braunroth . . M. 0,60 bis	2,—	5—13	—
	Hochstämme	2,—	—	—
	(Die vorstehenden Arten gehören der Neuen, die nachfolgenden der alten Welt an.)			
	f) Dunkelfrüchtiger Dorn (Nigrae), Sträucher von graugrüner Belaubung und dunklen Früchten.			
40.	<i>Celsiana</i> , H., Cels' Dorn, sparrig, schwarzfrüchtig. Hochstämme M. 1,50 bis	2,—	—	—
41.	<i>melanocarpa</i> , Bieb., Schwarzfrüchtiger Dorn, aus d. Kaukasus M. 0,60 bis	1,50	—	—
42.	<i>nigra</i> , W. u. K., Ungarischer Schwarzdorn, die Blüthen verändern sich allmählig von weiss in dunkelroth, blüht früh M. 0,60 bis	1,50	—	—
43.	<i>sanguinea</i> , Pall., Blutdorn, Sibirien	—,50	—	—
54.	<i>trigyna</i> , Hrt., Ungarn	1,—	—	—
	g) Azarol-Dorn (Azaroli), mit filzigen Blättern und kleinen Äpfeln ähnlichen, grossen Früchten.			
60.	<i>Azarolus</i> , L., ächter Azaroldorn	—,75	6	—
65.	" <i>pectinata</i> , Bosc (= pteridifolia, Lodd), Orient	—,75	6	—
44.	<i>tanacetifolia</i> , Poir., Rainfarnblättriger D.	1,25	—	—
	h) Weissdorn (Oxyacanthae) mit kleinen gelappten Blättern und kleinen meist rothen Früchten.			
45.	<i>brevispina</i> H. C. L., Kurzdorniger W.; buschig, sehr stachelig M. 0,60 bis	1,50	5	—
74.	<i>Oxyacantha</i> , L., Gemeiner Weissdorn. Da es ausserordentlich schwierig und für den Gärtner unwichtig ist, die beiden Species des Weissdorns — den 1 grifflichen (Cr. monogyne, Jacq.) und den 2 grifflichen (Cr. Oxyacantha, L.) — und ihre folgenden Abarten getrennt zu halten, so führen wir sie alle unter den gebräuchlichsten Namen auf (s. auch Hecken- pflanzen).			
P. 47.	<i>Oxyacantha fastigiata</i> , Hrt., Pyramidaler W. Hochstämme	—,30 1,50	2½	—
72.	" <i>filicifolia</i> , Hrt., farnblättrig M. 0,60 bis	1,50	5	—
48.	" <i>fl. albo pl.</i> , Gefüllter W.; im Verblühen rosa . . M. 0,60 bis	2,—	5—13	*
	Hochstämme	1,50	—	—

Ziergehölze.

No.	Crataegus.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
73.	<i>Oxyacantha fl. candido pl.</i> , Blüthe bis zum Abfallen stets rein weiss bleibend	—,75 1,50	6 —	— —
49.	" <i>fl. kermesino pl. (Paul's New Scarlet), Dunkelroth gefüllt.</i> W., prachtvoll in der Blüthe, starke Pyramiden M 0,60 bis	1,50 2 —	5—11 9—18	— *
	" " Hochst. pr. 1000 St 1000 M., 1 St. 1 bis			
	" Der allgemein bekannte gefüllte Rothdorn sieht gegen diesen neueren rosa aus und bleibt im Effect weit hinter ihm zurück. Als Alleebaum, abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überwältigender Wirkung			
57.	" <i>fl. puniceo, Hrt.</i> , einfach dunkelroth	—,75	—	—
50.	" <i>fl. rubro pl.</i> , (Gumperi bicolor), dunkelrosa gefüllt M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
T. 51.	" <i>fol. arg. var.</i> , sehr schön weissbunt M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
71.	" <i>fr. luteo Hrt.</i> , gelbfrüchtiger W.	1,50	—	—
50.	" <i>fl. rubro pleno</i> , (Gumperi bicolor), dunkelrosa gefüllt M. 0,60 bis	1,50 Hochstämme 1,50-2	— 13—18	— *
T. 52.	" <i>horrida Carr.</i> , Abschreckender W., ausserordentlich stachelig, merkwürdig M 0,75 bis	1,50	—	—
61.	" <i>parvifolia Ait.</i> , Kleinblättriger W. Zu Felspartien durch seinen niedrigen sparrigen Wuchs ganz vortreflich geeignet M. 0,60 bis	1,50	—	—
T. 53.	" <i>pendula (reginae, Loud.)</i> , sehr zierlich hängend, mit Früchten, auch blühend schön M 0,75 bis	2,—	—	—
T. 63.	" " <i>fl. roseo</i> , einfach rosa, hängend . . . M. 0,60 bis	1,50 Hochst. 1,75	5—10 15,—	— —
75.	" <i>salisburiaefolia, Hrt.</i>	1,—	—	—
78.	" <i>sempervirens</i> , s. <i>Neuheiten</i> .			
	Cydonia, Turn., Quitte.			
120.	<i>japonica, Pers.</i> , (Pirus japonica. <i>Taub.</i>), Japanische Qu., blüht feuerroth im April, oft auch im Herbst. Einer der schönsten Blütensträucher. VI	40—60	5	45
130.	" <i>alba picta</i> , beim Aufbrechen weiss, später roth gefleckt	—,75	—	—
128.	" <i>atrosanguinea pl., Hrt.</i> , gefüllt, schön	1,—	—	—
124.	" <i>cardinalis</i> , feurig roth	—,75	—	—
121.	" <i>fl. carneo</i> , fleischfarbig	—,60	5	—
	" " Hochst. M. 1,25 bis	2,—	—	—
126.	" <i>flore kermesino</i> , hell carmoisin, voll blühend	—,75	6	—
107.	" <i>fl. roseo pleno</i> , rosafarb., gefüllt	—,75	—	—
122.	" <i>fol. rubris</i> , Triebe braunroth, Bl. roth, zahlreich	—,75	—	—
113.	" <i>marmorata</i> , weiss, rosa marmorirt in dunkelrosa übergehend, Habitus aufrecht	—,75	—	—
123.	" <i>macrocarpa</i> , grossfrüchtig	—,75	—	—
131.	" <i>Maulei</i> , mennigroth, kleinblumig, reichblühend, sehr hübsch, <i>neu!</i>	—,75 1,25	— 10	— —
105.	" <i>Moerloossii</i> , weiss mit carmin getuscht	—,75	—	—
127.	" <i>nivea intus kermesina</i> , innen dklrosa gefleckt, hängend	—,75	—	—
111.	" <i>sanguinea semipl.</i> , dunkelroth, halb gef.	—,75	—	—
106.	" <i>umbilicata</i> , rosa	—,60	—	—
115.	<i>vulgaris, Pers.</i> , Gemeine Qu., Frucht sehr wohlriechend	—,40	3	*
P. 116.	" <i>pyramidalis, Hrt.</i> , pyramidal wachsend	—,75	—	—
	Cytisus L., Gaissklee , (s. auch Laburnum).			
2.	<i>elongatus</i> , W. und K., Ruthenförmiger G.; die Zweige der ganzen Länge nach mit Blüten besetzt. VII	—,35	3	—
3.	<i>hirsutus, L.</i> , (C. triflorus, <i>Lam.</i>), Rauher, VII	—,35	3	*
	" " Hochstämme	1,50	13	—
7.	<i>purpureus elongatus, Hrt.</i>	1,—	—	—
*	Deutzia, Thunb. Deutzie , alle blühen weiss oder weisslich.			
3.	<i>crenata</i> , S. u. Z., Gekerbte D., die bekannteste, VI, VII	—,40	3	*
5.	<i>crenata fl. pl.</i> , weiss gefüllt, aussen lila-rosa, sehr vollblühend, die schönste von allen Deutzien, VI, VII	—,40	3	*

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
Deutzia.				
b. 11.	<i>crenata</i> , foliis albo punctatis, <i>Hrt.</i> , Blätter weiss punktiert	—,50	5	—
14.	" <i>purpurata</i> , schön, purpurrothe Blüthen	—,75	6	—
15.	" <i>Pride of Rochester</i>	—,75	6	—
6.	<i>Fortunei</i> <i>Hrt.</i> , Fortune's D., rein weiss, VII	—,50	4	*
4.	fl. pl., <i>Hrt.</i> , <i>cren.</i> , candidissima pl. <i>Hrt.</i> , gefüllt, rein weiss	—,50	4	*
* 7.	<i>gracilis</i> , S. u. Z., zierliche D., VIII	—,30	2½	*
	" Treibpflanzen p 100 St. M. 20.			
Diervilla, Milt., Diercilla (siehe auch Weigela)				
1.	<i>canadensis</i> , <i>Winkl.</i> , D. <i>Lonicera</i> , <i>Milt.</i> , Kanadische D., VII, gelbblühend	—,40	3	*
2.	<i>splendens</i> <i>Carr.</i> (sessilifol., <i>Schuttenb.</i>), Glänzende D., VII, mit bräunlichen, glänzenden Blättern	—,40	3	—
Dimorphanthus siehe <i>Aralia</i> .				
Diospyros, L., Lotusplume (Dattelpfl.)				
1.	<i>virginiana</i> <i>L.</i> , Virginische L., im Vaterlande essbar	1, —	—	—
1.	Diplopappus chrysophyllus , Neuseeland Immergrüner Strauch mit hübsch goldgelben Zweigen und weissen Blüthen	1, —	9	—
Elaeagnus, L., Oleaceae (Oleaster).				
b. 1.	<i>argentea</i> , <i>Pesh.</i> (E. <i>macrophylla</i> , <i>Hrt.</i> , <i>Shepherdia argentea</i> , <i>H.</i> , Silber-Oelw.; VII Blätter auf beiden Seiten von metallischem Silberglanz	—,60	5	—
b. 2.	<i>angustifolia</i> , <i>L.</i> (E. <i>argentea</i> <i>Hrt.</i>), Gemeine Oelw., Blätter unten grauweiss, junges Holz silbergrün, VI	—,40	3	—
5.	" <i>hortensis</i> Blätter schön, mehr silberweiss als No. 2	—,60	5	—
6.	" <i>latifolia</i> , <i>Hrt.</i> , <i>Britz.</i> , grossblättrig	—,75	—	—
7.	" <i>pyramidalis</i> , <i>Hrt.</i> , <i>Britz.</i>	—,75	—	—
8.	" <i>rotundifolia</i> , <i>Hrt.</i> , <i>Britz.</i>	—,60	—	—
10.	<i>edulis</i> , <i>Hrt.</i> , Essbare Oelw.	—,60	—	—
4.	<i>orientalis</i> , <i>L.</i> , Morgenländische Oelw., Blätter gelblich grün	—,60	5	—
Erica, L. Heide à Stück 0,50 M. in folgenden Sorten:				
1.	<i>mediterranea glauca</i>			
2.	" <i>nana</i>			
3.	" <i>stricta</i>			
4.	<i>vagans multiflora</i>			
5.	" <i>alba</i>			
6.	<i>tetragona</i>			
7.	<i>herbacea carnea</i>			
Evonymus, L., Spindelbaum (Pfaffenhütchen)				
1.	<i>americana</i> , <i>L.</i> , Amerikanischer S.; grossblättr., dunkelgrün, VII 0,75 bis	1,25	—	—
2.	<i>angustifolia</i> , <i>Pesh.</i> , fol. <i>purpureis.</i> , Schmalblättr mit brauner Herbstfärbung	—,75	—	—
4.	<i>europaea</i> , <i>L.</i> , Europäischer S. VI., durch seine rothen Früchte sehr zierend, für grössere Gebüsch-Partien geeignet, doch nicht unmittelbar an den Wegen M. 0,30 bis	1,25	—	—
b. 5.	" fol. var. Weissbuntblättriger S. 2—3 m. hoch M. 0,75 bis	—,60	2½—5	*
6.	" fr. <i>albo</i> , <i>Hrt.</i> , weissfrüchtig	1,50	13	—
3.	" fruct. <i>atropurp.</i>	—,75	—	—
10.	<i>Maackii</i> , <i>Hrt.</i> , Maack's S., m. glänzenden Blättern, hübsch	1,50	—	—
11.	<i>nana</i> , <i>Bieb.</i> (E. <i>nana rosmarinifol</i> <i>Hrt.</i>) Zwerg-S., VIII, wird nur fusshoch	—,60	—	—
8.	" 1—1,50 m. hohe veredelte Stämme. 1 bis	—,30	2½	—
b. * 12.	<i>pendula</i> , <i>Wall.</i>	1,75	9—16	—
b. * 19.	" <i>radicans</i> fol. arg. marg., <i>Hrt.</i> , hübsch	1,50	—	—
i. * 13.	" fol. arg. var. <i>Hrt.</i> , schön weiss marmorirt und gerandet	—,40	3½	—
	" <i>viridis</i> , <i>Hrt.</i> , Grüner wurzelnder S.; kriechend	—,50	4	—
	"	—,30	2½	*
14.	<i>verrucosa</i> , <i>Scop.</i> , Warziger S.; Zweige mit braunen Warzen besetzt, schön dunkel belaubt	1,50	13	—
	" M. 0,75 bis	1,50	—	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
Fagus, L., Buche (Rothbuche)				
1.	ferruginea Ait, rostfarbige	1,—	9	—
3.	sylvatica, L., Gemeine B., Rothbuche; I, II	—,50	4	—
4.	" asplenifolia	1,50	13	—
b. 5.	" atropurpurea , Hrt., Blut-Buche, purpurblättrig	1,—	9	—
	do. Pyramiden M. 2 bis	15,—	—	—
b. 6.	" do. Brocklesby, Hrt., Blut-B. v. Brocklesby, neu	2,—	—	—
8.	" comptoniaefolia, Hrt., comptonienblättrige R. B., mit fein geschlitztem Laube, zierlich	1,50	—	—
12.	" grandidentata, Hrt., Grosszahnige B., in starkeingeschnittenen Blättern	1,50	—	—
T. 15.	" pendula, Hrt., Trauer-R-B M. 1,50 bis	2,50	12 - 20	—
	" Hochstämme	5,—	—	—
b. 20.	" purpurea latifolia, Hrt. M. 1,25 bis	3,50	11 - 30	—
17.	" quercoides, Bth. Cat., Eichenblättrige B.	1,—	—	—
Fontanesia Labill., Fontanesie.				
3.	californica	—,30	5	*
1.	Fortunei, Hrt., ein äusserst zierlicher dem Liguster ähnlicher Stranch	—,50	4	*
2.	phillyreoides, Labill.	—,50	4	30
Forsythia, Lindl., Forsythie , blühen schon Ende März, gelb.				
1.	Fortunei, Lindl., Fortune's F., von kräftigem, aufrechten Wuchse, VI	—,40	3 1/2	*
4.	Sieboldii, Hrt., scheint noch stärker zu hangen als No. 2	—,40	3 1/2	*
* 2.	suspensa (Syringa) Tumb., Ueberhängende F., stark hangend, VI zum Bekleiden von Mauern geeignet	—,40	3 1/2	*
* 3.	viridissima, Lindl., Dunkelgrüne F., schön, VII	—,40	3 1/2	—
Fraxinus, L., Esche . . . 12 Sorten à 1 Stück 10 M. Die Eschen zeigen eine ausserordentliche Mannigfaltig- keit in der Belaubung, im Wuchs und in der Herbstfärbung der Blätter, sind landschaftlich sehr wirkungsvoll und begnügen sich selbst mit ärmeren Bodenarten.				
a) Eschen der alten Welt.				
22.	argentea, Hrt., eine sehr schöne helllaubige E., wahrscheinlich Abart von excelsior M. 0,80 bis	2,—	—	—
b. 51.	edentata fol. var. Hrt., Blätter sehr schön ausgerandet u. weissbunt	1,20	—	—
1.	excelsior, L., Gemeine E I ca 2 1/2—3 m. h. (s auch Alleeabäume)	—,50	4	*
2.	" asplenifolia, C. Koch., (F. linearis. Hrt.), Farnblättrige E.; zierlich M. 0,80 bis	1,50	7	—
3.	" aurea, Willd., Gold-E., junges Holz goldgelb M. 0,80 bis	2,25	7—20	—
T. 37.	" pendula, Traueresche mit goldgelbem Holze	2,—	—	—
b. 5.	" concavaefolia fol var. , Hrt., Bunte hohlblättrige E., Blätter fast weiss mit 2ten Triebe M. 0,80 bis	2,—	7—18	—
6.	excelsior crispata , Loud., Krausblättrige E., Blätter schwarzgrün und sehr kraus, von niedrigem langsamen Wuchse M. 0,80 bis	2,—	7—18	—
27.	" cucullata, Hrt., Hohlblättrige E., Blätter nahe beisammen stehend, kräftiger als Nr. 6 M. 0,80 bis	2,—	7—18	—
25.	" elegantissima , Hrt., Blätter sehr zierlich getheilt, ausser- ordentlich schön M. 0,80 bis	2,—	7—18	—
42.	" fol. aur, siehe Neuheiten.	—	—	—
8.	" heterophylla, C Koch (F. monophylla H.), hat meist unge- fiederte Blätter M. 0,80 bis	2,—	7—18	—
T. 9.	" pendula , Ait, Trauer-E. , Hochstämme mit starken Kronen M. 1,50 bis	3,—	12—25	*
	" extra stark	4,—	35	—
10.	" polemoniiifolia , (F. polem., Poir.)	—	—	—
	" Kugel-Esche , besonders werthvoll für nördliche Gegenden wo die Kugel-Akazie nicht gedeiht	—,80	7	—
	" Hochstämme	2,—	18	—
11.	" simplicifolia laciniata, A. M., Einfachblättrige geschlitzte, sehr eigenthümlich M. 0,80 bis	2,—	7	—
53.	" spec Taschkent Hb Petrop	2,50	—	—
P. 28.	" spectabilis, Hrt., im Wuchs ähnlich der italien. Pappel M. 0,80 bis	2,—	18	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
Fraxinus.				
13.	lentiscifolia, Desf. (parvifolia, Lam. potamophila, Rgt.), Wickenblättrige E. M. 0,60 bis	1,50	—	—
T. 14.	" <i>pendula</i> Arab. Musc. (parvifolia pendula, Hrt.), eine sehr fein belaubte und stark hängende Trauer-E. M. 1,00 bis	2,50	—	—
17.	mandschurica, Rupr., Blätter grösser und gelblicher als bei excelsior M. 0,60 bis	1,75	5—15	*
12.	oxyphylla, Bieb. (oxycarpa, Willd.), Spitzfrüchtige E., in allen Theilen kleiner als „excelsior“ M. 0,60 bis	1,50	5—13	*
43.	acuminata, spitzblättrige E. M. 0,80 bis	2,—	—	—
b) Amerikanisch-japanische Eschen mit grossen Blättern und glänzendem Laube.				
15.	<i>alba</i> , Marsh. (= americana, L., = pubescens, Hrt. = rotundifolia? Hrt.), Weisse Esche, ein grossblättriger herrlicher hochwachsender Baum mit grauer Rinde (s. auch Allee-bäume), M. 0,60 bis	3,—	5—27	*
7.	<i>alba fol. arg. marg.</i> (Späth), siehe Neuheiten.			
16.	americana, Willd., Blätter oben dunkelgrün unten graugrün	—,80	—	—
21.	arbutifolia, H. S. (= pennsylvanica latifolia, C. Koch), Blätter auf der Unterseite stark graufilzig M. 0,80 bis	2,—	7—18	—
b. 36.	<i>aucubaefolia</i> , Hrt., hübsch gelbbunt M. 1,00 bis	2,—	9—18	—
26.	Boscii, Hrt., frisch grün belaubt, ähnlich No. 16	—,80	7	—
48.	californica, Californische E.	1,—	—	—
18.	<i>mixta</i> , Hrt., fein belaubt starkwüchsiger als parvifolia. Holz dklbraun M. 0,60 bis	—,80	—	—
20.	<i>Novae Angliae</i> , Hrt., sehr hübsche, glänzend dklgrüne Belaubung 1 bis	2,—	9—18	—
39.	pubescens longifolia	—,75	7	—
55.	pennsylvanica, Pennsylvanische, Colorirt im Herbste prächtig violett M. 1,—	1,—	9	—
33.	quadrangulata, Mohr., Blau-E., junge Zweige schwach vierkantig . . .	—,60	5	—
34.	sambucifolia, Lam. (= nigra, Marsh.), Schwarz-E., von den nord- amerikanischen Arten am meisten ähnlich unserer ein- heimischen E., wird aber nicht so hoch M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
19.	" <i>crispa</i> , Lodd. (nigra crispa, Hrt.), Krause Schwarz-E., dunkel- grün, krausblättrig, wird nicht hoch	1,—	—	—
24.	xanthoxyloides, Wall., sehr zierlich belaubte Esche	1,50	13	—
c) Ornus, Manna-Esche (Blüthen-Esche).				
23.	Ornus, L., Gemeine Manna-Esche, schön blühend, IV, V	—,60	5	—
32.	" rotundifolia, Hort., Rundblättrige Manna-E., blüht vorzugs- weise reich	1,—	9	—
Genista tinctoria , L., Färbeginster —,25 2 *				
Gleditschia , Clayt., Gleditschie , (Christusdorn)				
T. 11.	excelsa pendula, sehr zierend	2,50	—	—
1.	ferox, Desf. (? Gl. sinensis, Lam.), Wilddornige Gl. M. 0,80 bis	1,75	7—16	—
3.	longispina, Hrt., Langstachelige Gl. M. 0,80 bis	1,50	7	—
4.	<i>macracantha</i> , Hrt., oft mit 8—10 cm langen Stacheln M. 0,80 bis	1,75	7—16	—
2.	monosperma, Walt. (Gl. inermis, Mill.), Einsamige Gl. M. 0,80 bis	1,50	7—13	*
6.	<i>sinensis</i> , Lam., (G. horrida, Willd.), Chinesische Gl., mit glänzendem Laube M. 0,80 bis	1,25	7—11	—
7.	<i>sinensis nana</i> , Hrt., m. glänzend. Laube u. hängend Habitus M. 0,80 bis	1,25	—	—
8.	<i>triacanthos</i> , L., (G. latisiliqua Hrt.), Dreidornige Gl., 2—2½ m. h. Hochstämme s. Allee-bäume	—,60	5	*
10.	" Bujoti (= Bujoti pend, Hrt.), dornelos	2,50	—	—
9.	triacanthos inermis, C. Koch (G. tr. laevis, Hrt.), unbewehrte drei- dornige Gl.	—,80	7	*
	Hochstämme	1,75	—	—
Alle Gleditschien sind schöne Bäume mit lichter Krone und hell- grüner Belaubung.				
Gymnocladus , Lam. Geweihbaum (Schusserbaum)				
1.	canadensis, Lam., Aechter G., IV, merkwürdiger Baum mit sehr langen doppelt gefiederten Blättern, 1—1½ m. h. M. 1 bis	2,50	9	—
Halimodendron , Fisch., Satzstrauch .				
1.	<i>argenteum</i> , (Carag.), Lam., Silbergrauer S., sehr hübscher grau be- laubter Strauch mit hell violetten Schmetterlingsblüthen. Halb- u. Hochst. M. 0,80 bis	1,75	7—16	*

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
	Hamamelis virginiana , L., virginische Zaubernuss; im Herbst bilden die tief dunkelgrünen Blätter, die zahlreichen gelben Blumen und die eigenthümlich gestalteten vorjährigen Früchte ein sehr interessantes Gesamtbild	—,75	6	—
1.	Hibiscus syriacus , L., syrischer Eibisch, mit prächtigen violetten malvenähnlichen Blumen	—,75	7	—
2.	palustris , rosa	—,75	—	—
	Hippophaë rhamnoides , L., Gemeiner Sanddorn, VII 1—2 m. h.	—,45-1	4—9	—
	Hydrangea , L., Hortensie . 7. <i>japonica</i> , Sieb. (= opuloides) prächtig rosenroth blühend	—,75	—	—
4.	<i>laevigata</i> , weissblühend	—,75	—	—
3.	<i>paniculata grandiflora</i> , weiss sehr grossdoldig, herrlich M. 0,50 bis	—,75	4	—
14.	Thomas Hogg , Hrt., weiss, reichblühend	—,50	4	—
	Hypericum , L., Hartheu . 4. <i>calycinum</i> , L.	—,40	3 1/2	*
* 1.	<i>elatum</i> , Ait., Hohes H., VII, VIII, reich gelbblühend	—,35	3	—
* 5.	<i>liricinum</i> , L., Bockkraut, Blüten ockergelb	—,35	3	—
	Iberis sempervirens , L., Immergrüne Schleifenblume , VIII, reichblühend, weiss	—,30	2 1/2	*
	Idesia polycarpa , sehr schönes Gehölz mit grossen länglich herzförmigen Blättern	1,50	13	—
	Ilex , L., Hülse (Stechpalme). * 1. <i>Aquifolium</i> L., Gemeiner H. Varietäten, schöne Pyramiden mit Ballen M. 5 bis	10,—	40—90	—
	Incarvillea Koopmanni , Siehe Neuheiten. * Indigofera Desna, <i>Ham.</i> , niedriger zierlicher Strauch mit rosa Blüthen Trauben	—,40	3	—
	Juglans , L., Walnuss , s. auch Obst. 20. <i>cinerea</i> , L., Oelnuss, aus dem Saft des Stammes wird Zucker gewonnen, II M. 0,75 bis	1,—	6	—
23.	<i>nigra</i> , L., Butternuss, diese wie „cinerea“ gedeihen auf feuchten Plätzen und besitzen eine reich gefiederte Belaubung. III (s. Allee-bäume) 2 m. h.	—,75 1,50 2,50	6 13 20	* — —
7.	<i>serotina</i> , Johannissnuss, spät blühend	2,50	—	—
5.	<i>regia</i> , <i>laciniata</i> , Geschnittblättrige W., ausserordentlich zierend	2,50	—	—
	Kerria D. C. Kerrie , (Rauunkelstrauch). * 3. <i>japonica</i> (Rubus) L., (Corchorus japon. Thbg.), Japan. Kerrie	—,30	2 1/2	*
1.	„ <i>fl. pl.</i> , <i>Ert.</i> , gefüllt gelb, sehr hübsch	—,35	3	—
b. 2.	„ fol. var., mit prächtig weissbunten Blättern	—,40	3	—
4.	„ <i>ramulis aureo vittatis</i> , mit gelbbunten Zweigen	—,50	4	—
	Koelreuteria , Larm., Kölreuterie . 1. <i>paniculata</i> , Larm., Rispenblüthige	—,50	4	—
	Laburnum , L., Goldregen (Bohnenbaum) 4. <i>vulgare</i> , <i>Gris.</i> , (Cytis. Laburnum, L.), Gemeiner G., IV—I M. 0,40 bis	—,75	3—6 1/2	*
16.	„ „ <i>Alschingerii</i> C. Koch, Alschinger's Goldregen	1,—	9	—
13.	„ „ <i>Carlieri</i> Hrt., Carlier's (Cytisus nigricans Carlieri)	1,—	9	—
8.	„ <i>sessilifolium</i> , sehr schöne lange Blüthen Traube	1,25	1	—
18.	„ <i>Fossii</i> , sehr elegante, enorm lange Blüthen Trauben	1,50	13	—
	Lespedeza , Mehr., Lespedeze . 1. <i>bicolor</i> Turcz., Zweifarbige L., esparsettähnliche Pflanze aus dem Amurgebiet, sehr schön blühend	—,80	—	—
	Ligustrina amurensis , Rupr. Max., aus dem nördlichen China, mit weissen Rispen blühend	1,—	9	80
	Ligustrum , L., Liguster (Rainweide) 1. <i>amurense</i> (Syringa) Rupr. Amur-L., glänzend belaubt	—,40	3	*
16.	<i>atrovirens</i> , Hrt., dunkel belaubt	—,50	4	*
* 16.	<i>chinense nanum</i> , Hrt., niedrige hübsche Art mit glänzenden Blättern	—,50	4	—
* 2.	<i>ovalifolium</i> , Hrt., (lucidum, Ait.-japonicum, Hrt.), grossblättr., schön, verliert die Blätter erst bei 6—8° R. Kälte, VI	—,40	3	*
32.	„ <i>robust. marg. aureum</i> , prächtig goldgelb gerandet	—,75	6	—
7.	<i>species nova</i> , pyramidal, gelbfrüchtig	—,50	4	—

Ziergehölze.

No.		per Stiel M.	10 Stück M.	hundert- weise vorzüglich
8.	vulgare, L., Gemeiner L., der schönste Strauch als Unterholz und als solcher halbimmergrün. VI	—,25	2	*
9.	„ foliosum, Hrt., Reichbelaubter L.	—,35	3	*
b. 26	„ fol. albo punctatis, weissgelb punktiert und gefleckt	—,50	4	—
b. 10.	„ fol. var., Goldbuntblättriger L., recht hübsch	—,40	3	—
	„ 1—1½ m. hohe Stämme	1,50	—	—
29.	„ glaucum marginatum, s. Neuheiten.			
11.	„ italicum D. R., Italienische Rainweide	—,35	3	*
27.	„ latifolium fol. aureo-maculatis, breitblättrige Rainweide, mit gelb gefleckten Blättern	—,50	4	*
T. 12.	„ pendulum, Hängender gem L.; neu	Hochst. 1,50	13	—
P. 13.	„ pyramidale, Hrt. Britz., hiesiger Sämling von reicher bräunlich grüner Belaubung und compactem Wuchs. VII	—,40	3	*
	„	Hochst. 1,50	—	—
*	Liriodendron Tulipifera, L., Tulpenbaum	2,50	—	—
	Lonicera, L., Heckenkirsche, Gaisblatt.			
	a) Caprifolium, Gaisblatt (Jedlänger lieber).			
i. 54.	brachypoda D. C., (= flexuosa Thunb.), gelblühend, wohlriechend, immergrün	—,50	4	35
b. 17.	„ reticulata fol. var., goldbuntblättrig	—,60	5	—
1.	Caprifolium, L., (L. italica, Schum.), Italienisches G., gelblich blühend	M. 0,60 bis 1,—	5—9	*
2.	Douglasii (Caprif.) Lindl., gelblich, reichblühend wohlriechend M. 0,60 bis 1,—	5—9	*	
3.	flava, Sims. (L. Brownii, Hrt.), gelb, sehr grossblättrig	M. 0,60 bis 1,—	5—9	—
5.	fuchsoides, Fuchsienähnliches G., roth, schön, neu! s. reichbl. 0,60 bis 1,—	5	*	
6.	grata, Hrt., Angenehmes G., gelblich, reichblühend	M. 0,60 bis 1,—	—	—
12.	sempervirens superba, s. schöne, starkwachsende Var.	—,80	—	—
	b) Heckenkirsche, s. nicht rankende, 10 Sorten à 1 St. M. 4.			
55.	Alberti, neu! Ein hübscher, zierlicher Strauch mit feiner, graugrüner Belaubung und rosa Blüthen	—,75	6	*
20.	chrysantha, Turisch, gelbblühende H.	—,50	4	—
37.	fragrantissima, Hort., stark duftende H.	—,50	4	*
21.	hispida, Hrt. non Pall., Rauhe H., VI.	—,35	2½	*
61.	japonica, Hrt. non Thunb., Japanische	—,50	—	—
23.	Ledebouri, Esch., Ledebour's H., mit dunkler Belaubung und braunen Blumen, VII.	—,40	3	*
24.	microphylla, Willd. (L. Sieversiana, Rye.), Kleinblättrige H., VII, VIII	—,40	3½	—
59.	Morrowii, Morrow's H.	—,50	4	—
40.	nigra, L., Schwarzfrüchtige H.	—,40	3½	—
25.	orientalis, Lam., (L. caucasica, Pall.) Morgenländische H., VII.	—,40	3	—
27.	Ruprechtiana, Regel, Ruprecht's H.	—,40	3	*
28.	tatarica, L., Tatarische H., allgemein beliebter hoher und schönblühender Zierstrauch, V.	—,25	1½	*
	„ stark	—,40	3½	*
46.	„ alba grandiflora, rein weiss, grblum.	—,40	3½	—
29.	„ albo-rosea, s. Neuheiten.			
45.	„ discolor, Hrt., oben rosa, unterseits dunkelroth	—,50	4	—
30.	„ fl. albo, Weissblühende tart. H., V.	—,40	3	*
32.	„ fl. rubro, (L. sibirica, Hrt.), Dunkelrothe H., V.	—,40	3	*
33.	„ fr. luteo, Gelbfrüchtige tart. H., V.	—,40	3	—
41.	„ gracilis, Hrt., grossblumig, weiss m. rosa Schein	—,50	4	—
34.	„ pulcherrima, Hrt., schön dunkelroth	—,40	3½	*
35.	„ splendens (Späth). Die jungen Blätter und Holz von brauner Farbe, Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelroth	—,60	5	—
43.	„ virginatis grandiflora, Hrt., grossblum., hellrosa mit dunkel gestreift und marmorirt	—,50	4	—
36.	Xylosteum, L., Gemeine H., V. VI.	—,30	2½	*
38.	„ Philometae, Hrt., sehr hübsch belaubt	—,40	3½	—
	Lycium, L., Bocksdorn.			
2.	chinense, Mill., Chinesischer B., wenig Dornen	—,40	—	—
1.	europaeum macrocarpum, Hrt.; Grossfrüchtiger gemeiner B.	—,30	2	*

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrätig
	Lycium.			
3.	ruthenicum, <i>Murr.</i> , Russischer B., VIII., nicht überhäng, wie die anderen Sorten	—,40	3	—
↳	Maclura , <i>aurantiaca</i> , <i>Nutt.</i> , Osagen-Orange , VII	—,70	6	—
*	Magnolia , <i>L.</i> , Magnolie .			
1.	obovata, <i>Thunb.</i> , (M. purp., <i>Curt.</i>), mit roth gefärbten Blumenbl. M. 6 bis	8,—	—	—
3.	Yulan Soulangeana und andere Species M. 6 bis	15,—	—	—
§	Mahonia , siehe Berberis.			
	Menispermum canadense, <i>L.</i> , Kanadischer Mondsamen , für Festons und dergleichen	—,60	5	—
	Mespilus , <i>L.</i> , Mispel .			
15.	germanica, <i>L.</i> , Gemeine Mispel, Früchte essbar, V.	—,75	6	—
	Die übrigen siehe unter Crataegus und unter Obst.			
	Morus , <i>L.</i> , Maulbeere , alle geben Futter für Seidenraupen.			
1.	alba, <i>L.</i> , Weissfrüchtige M., IV. V	—,40	—	—
7.	Colombassa Lodd, Colombassa-M.	—,80	7	—
14.	Cedrona, Cedron's M.	—,75	6	—
2.	intermedia, <i>Pers.</i> (M. L'Hou, <i>Hrt.</i>), sehr grblättrig	—,50	4	—
3.	Morrettiana, <i>Lodd.</i> , Morretti-M.	—,40	—	—
*4.	nigra, <i>L.</i> , Schwarzfrüchtige M., Beeren werden gegessen. VI.	—,50	4	—
*6.	urticaefolia, <i>H.</i> , Nesselblättrige M., schön	—,75	6	—
	Myrica , <i>L.</i> , Gagel .			
1.	asplenifolia <i>L.</i> , (Comptonia asplenifolia, <i>Banks.</i>), sehr wohlriechend	—,90	8½	—
2.	cerifera, <i>L.</i> , Wachsmyrthe, halb immergrün	1,—	—	—
	Myricaria , <i>Desv.</i> , Myricarie .			
*2.	dahurica, <i>Hrt.</i> , Belaubung graugrün	—,50	4	—
1.	germanica, <i>L.</i> , gemeine M	—,50	—	—
1.	Neillia , thyrsoiflora <i>Don.</i> , straussblüthige N.	0,50	4	—
	Ostrya , <i>L.</i> , Hopfenbuche			
102.	virginiana, <i>Mill.</i> , amerikanische H.	1,25	11	—
101.	vulgaris, <i>Willd.</i> , weissbuchenblättr. H	1,—	9	—
	Paeonia , <i>L.</i> , Paeonie , (Gichtrose, Pfingstrose)			
* 1.	arborea, <i>Donn.</i> , (P. Moutan, <i>Sims.</i>), Baumartige P. L. viel Varietät. M. 1,50 bis	5,—	—	—
↳	Paulownia imperialis, <i>S u Z.</i> , Kaiserliche Paulownie ; sehr grossblättrig	—,80	7	—
	Phellodendron , <i>Rupr.</i> , Korkbaum .			
1.	amurense, <i>Rupr.</i> , Sibirischer K., wird am Amur 15—18 m. hoch und die Rinde dort allgemein als Kork benutzt; Blatt gefiedert u. wohlriechend, sehr schön, neu! 0,50—2 m. hoch. M. 1 bis	2,50	9—22	—
	starke Hochstämme	5,—	—	—
2.	japonicum, Japanischer K.	1,50	12	—
	Philadelphus , <i>L.</i> , Pfeifenstrauch , (Wild. Jasmin), 10 Sorten à 1 St. M. 3 50 alle blühen weiss.			
13.	Columbianus, <i>Hrt.</i> , (columbarius?), VI, VII. Laub mattgrün, sehr reichblühend, grossblumig	—,40	3	*
14.	cordatus, <i>Hrt.</i> , Herzblättriger Pf., ähnlich dem vorigen	—,40	3	*
1.	coronarius, <i>L.</i> , Gemeiner Pf., VI, V, sehr bekannt und verbreitet starke Sträucher	—,30	2	*
b. 18.	" <i>fol. aureis</i> , <i>Hrt.</i> , mit goldgelben Blättern. Neu!	—,50	4	—
21.	" fl. pl., <i>Hrt.</i> , gefüllt	—,50	4	—
5.	" nanus, <i>Mill.</i> , Zwerg-Pf., VIII. bildet einen dichten Busch	—,40	3	*
7.	" salicifolius <i>Hrt.</i> , Weidenblättriger Pf., VIII, eigenthümliche Belaubung	—,40	3	—
9.	" Zeyheri <i>Schrad.</i> , Zeyher's Pf., VI, VII. frühblühend	—,40	3	—
22.	dianthiflorus pl <i>Hrt.</i> , Nelkenblüthiger gefüllter Pf.	—,50	4	*
6.	floribundus, <i>Schrad.</i> , (-pubescens, <i>Lam.</i>), Reichblüh Pf., VI, V, schön stark	—,30	2	*
	stark	—,50	3½	*
20.	Godolokeri <i>Hrt.</i>	—,40	3	*
2.	Gordonianus <i>Lindl.</i> , Gordon's Pf., VI, V, hochwachsend, grossblumig	—,40	3	*
10.	grandiflorus, <i>Hrt.</i> , Grossblumiger Pf., VI, V, durch d. grossen dunkelgrünen Blätter und die grossen Blumen sich aus- zeichnend, sehr schön	—,40	3	*
23.	" speciosissimus, <i>Hrt.</i>	—,50	4	—
12.	inodorus, <i>Hrt.</i> (Lewesii, <i>Prsh.</i>), VII., Blätter hellgrün	—,40	3	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
Phyladelphus.				
3.	Keteleeri fl. pl. <i>Hrt.</i> Keteleer's gefüllter Pf. VII. neuere Züchtung!	—,40	3	*
4.	<i>latifolius</i> , <i>Schradl.</i> Breitblättriger Pf. VI. hochwachsend grossblumig	—,40	3	*
* 11.	<i>laxus</i> , <i>Schradl.</i> , (<i>inodorus</i> , <i>L.</i>), VII. grossblumig. dunkelblättrig. Haltung überhängend	—,40	3	*
19.	<i>nivalis spectabilis</i> pl. <i>Hrt.</i> halbgefüllt	—,45	3 1/2	*
25.	<i>pendulifolius</i> , mit hangenden Blättern	—,50	—	—
28.	<i>primulaeflorus</i> , <i>Hrt.</i> , <i>neu!</i>	—,60	5	—
30.	<i>pubescens</i> Souvenir de Billard, <i>neu!</i> 1—2 jähr. Steckl.	—,60	5	*
15.	Satsumi, <i>Part!</i> VII. aus Japan. Blätter breit, geadert	—,50	4	—
16.	Schrenkii, <i>Rapr.</i> , Schrenk's Pf., VII. ähnlich Nr. 15, scheint etwas höher zu werden	—,40	3	—
17.	<i>undulatus</i> , <i>Hrt.</i> , Welliger Pf. VII.	—,40	3	—
26.	Yokohamae, <i>Sieb.</i> , Neue Einführung aus Japan	—,40	3	*
Pirus, <i>Las</i> Birne, Apfel.				
a) Aechte Birnen , (<i>Pirophorum</i>).				
30.	<i>communis</i> , <i>L.</i> , Waldbirne; s. Obstwildlinge.	—	—	—
31.	fol. var., <i>Hrt.</i> weissgerandet, constant, VII.	—,75	—	—
T. 31.	<i>elaegnifolia</i> , <i>Full.</i> Oelbaumbl. B, Belaubung weissfilzig. hängend. VI	—,75	6	—
35.	<i>Miehauxii</i> , <i>Hrt.</i> Belaubung grangrün, starke Pyramiden M. 0,75—	1,25	6—10	—
36.	<i>nivalis</i> , <i>L. fil.</i> , Schneebirne, Laub graugrün	—,75	—	—
37.	<i>persica</i> , <i>L.</i> (<i>P. cuneifolia</i> , <i>Guss.</i> , <i>Crataeg. cuneif.</i> , <i>Hrt.</i>), Persische B., VII.	—,75	—	—
39.	<i>Pollveria</i> , <i>L.</i> , (= <i>auricularis</i> , <i>Knoop</i> = <i>Bollwilleriana</i> , <i>D. C.</i>), Lazarobl. Hagebuttenbirne	—,75	6	—
T. 40.	<i>salicifolia</i> , <i>L. fil.</i> (= <i>salicifol. pendula</i> , <i>Hrt.</i>), Weidenblättrige B., mit feinem, silberfarbenen Laube u. hangenden Zweigen	1,—	9	—
	Hochstämme	1,50	—	—
b) Aepfel , (<i>Malus</i>). 10 Sorten à 1 St. 7 M.				
53.	<i>baccata</i> , <i>L.</i> , Beeren-A., Frucht klein, glänzend roth, V. M. 0.50 bis	1,—	4—9	*
54.	" <i>cerasifera</i> , <i>Hrt.</i> Kirschentragender B.-A., V.	—,75	6	*
73.	" <i>fr. luteo</i> , <i>Hrt.</i> , Frucht gelb, gross. Starke Pyramiden M. 0,75 bis	1,50	6—12	—
74.	" <i>fr. maximo</i> , <i>Hrt.</i> , Frucht scharlach, gross	—,75	6	—
55.	" <i>oblonga</i>	—,75	—	—
57.	<i>coronaria</i> , <i>L.</i> , Geschmückter A., Blumen gross, wohlriechend, schön belaubt	—,75	6	—
58.	<i>dioica</i> , <i>Much.</i> , (<i>apetala</i> , <i>Much.</i>), Grün blühender Feigen-A.	—,75	—	—
50.	<i>Malus</i> , <i>L.</i> , s. Obstwildlinge	—	—	—
b. 64.	" <i>aucubaefolia</i> , <i>Hrt.</i> Ankubenblättriger A., hübscher Tafelapfel, M. 0,75 bis	1,50	—	—
b. 65.	" <i>argenteo-marginata</i> , <i>Hrt.</i> Weissrandiger A. schön, constant, VII	—,75	—	—
b. 66.	" <i>aureo-marginata</i> , <i>Hrt.</i> , Goldrandiger A. schön	—,75	6	—
79.	<i>microcarpa praecox</i> , <i>Hrt.</i> , Früher kleinfrüchtiger A.	—,75	—	—
59.	<i>prunifolia</i> , <i>Willd.</i> , pflaumenblättriger A.	—,50	—	—
60.	" <i>fr. coccineo</i> , <i>Hrt.</i> scharlachfrüchtiger Wachsapfel, starke Pyramiden M. 0,60 bis	1,50	6	*
T. 76.	" <i>pendula</i> , <i>Hrt.</i> hübscher Trauerbaum . . . Hochst. 1,50 bis	2,—	13	—
52.	<i>pumila gallica</i> , <i>Hrt.</i> Splitt A. Doucin, VI	—,50	—	—
81.	<i>rivularis</i> , <i>Hook.</i> , ähnlich Nr. 71	—,50	4	—
80.	<i>sibirica fructu coccineo</i> , Sibirischer scharlachblühender Wachsapfel	—,75	6	—
68.	<i>spectabilis fl. pl.</i> , Gefüllter Pracht-A., VI. gef. hellrosa M. 0,75 bis	1,—	5—8	*
T. 69.	" <i>floribunda</i> , <i>Sieb.</i> , Reichblühender Pracht-A., Knospen dunkelroth, VI. sehr beliebte Varietät	—,75	6	*
	" hübsche Trauerbäume	2,—	—	—
61.	" <i>Kaïdo</i> , <i>Sieb.</i> <i>Kaïdo-Pr-A.</i> , V., reichblühend, Früchte gelb, von der Grösse einer grossen Kirsche M. 0,60 bis	1,—	—	—
62.	" <i>Ringo</i> , <i>Sieb.</i> <i>Ringo-Pr-A.</i> , V. Starke Pyramiden M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
78.	" <i>Riverstii pl.</i> , <i>Hrt.</i> , halb gefüllt, leicht rosa, schön	—,75	6	*
70.	<i>Tenorii fl. carneo pl.</i> , <i>Hrt.</i> , gefüllt rosa	1,—	9	—
85.	The Fairy (Zierfrucht)	1,—	—	—
T. 71.	<i>Toringo</i> , <i>Sieb.</i> , (<i>Mal. pendula</i> , <i>H.</i>), <i>Toringo-A.</i> mit zahlreichen kleinen carminrothen Blüten und erbsengrossen Früchten	—,60	5	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrätlich
Planera, Gmel., Planere.				
501.	aquatica, Walt., Wasser-Pl., elegant hängend	M 0,75 bis 1,75	6	—
* 504.	Keaki, Hrt., Japanische Pl., hübsch belaubt	M 1 bis 2,—	—	—
503.	repens, Hrt., Kriechende Pl.	M 0,75 bis 2,—	6	—
502.	Richardii, Mehr., (Rhamn. carpinifolia, Palk.), stark hängend	—,60	5	—
Platanus, Platan.				
5.	californica, Hrt., kalifornische Pl.	1,50	13	—
3.	occidentalis, L., N.-Amerika	1,—	9	—
	occidentalis fol. var., s. Neuheiten!			
1.	orientalis, L., Gemeine Pl. Pyramiden	1,—	8	*
Populus, L., Pappel. Siehe auch Alleegebäume.				
1.	alba L., Silberpappel	—,40	3	—
36.	" Bolleana , (Lauche) s. unter Neuheiten			
2.	" nivea , Hrt., Aechte Silberpappel, ausserordentlich werthvoller Landschaftsbaum 2—3 m. hoch	—,50	4	*
29.	angulata Ait., (macrophylla, Lodd.), Karolinische P., auffallend durch die sehr grossen Blätter und die eckigen jungen Zweige, jung etwas empfindlich	—,75	—	—
12.	" Medusae , Hrt., Blätter kleiner und härter	—,75	6	—
13.	balsamifera macrophylla, Hrt., Grossblättrige Balsam-P., Unterseite der Blätter silbrig	—,50	4	—
14.	" suaveolens , Fisch., Wohlriechende P., die klebrigen Knospen haben einen sehr angenehmen Geruch	—,50	4	—
15.	" viminalis , Hrt., schmalblättrig	—,60	5	—
16.	betulaefolia, Prsh., Birkenblättrige Schwarz-P.	1,—	—	—
26.	canadensis, Mueh. (monilifera, Ait.), Kanadische P.	—,50	4	—
32.	canadensis aurea (van Geert), Neuheit, mit gelben Blättern, ähnlich der „Quercus Concordia“, landschaftlich sehr wirkungsvoll. Bei üppigen Wuchs tritt die gelbliche Färbung besonders hervor	—,75	6	—
	1 jähr. Stecklinge	—,20	1 1/2	—
17.	candicans , Ait. (Ontariensis, Desf.), Weissliche Balsam-P., mit grossen unterseits silberglänzenden Blättern M. 0,50 bis 1,50	1,50	4—13	—
T. 11.	canescens pendula, Hrt. (Parasol de St. Julien), Trauer-Grau-P., hübsch	2,50	—	—
	Hochst. M. 1,50 bis	2,50	—	—
19.	Eugenei, Simon-Louis, Abart der Kanadischen P., ausserordentlich schnellwüchsig M. 0,60 bis 1,25	1,25	5—12	—
P. 3.	fastigiata, Desf., Italienische Pyramiden-P. 2 m. hoch	—,50	4	*
P. 34.	" gigantea , Hrt.	—,60	—	—
21.	" mascula (Plantierensis mascula), aus dem Berliner Botanischen Garten stammend	1,—	9	—
T. 24.	grandidentata pendula Hrt., grossgezähnte hängende P.	—,75	—	—
P. 4.	hybrida Berolinensis , C. Koch, Berliner Lorbeer-P., Hybride von P. laurifol. und canadensis (im Berliner Botanischen Garten entstanden), im Wuchse ähnlich der Pyramiden-P., jedoch etwas lockerer gebaut und die Blätter grösser. Ihr Hauptvorzug aber besteht darin, dass sie früher austreibt, ihre Blätter weniger von Insekten angegriffen werden und die Wurzeln eine geringere Ausbreitung besitzen. 2 m. hoch	—,50	5	*
5.	laurifolia , Ledt., Lorbeerblättrige P., wird 14 Tage früher grün und hat eine mehr pyramidale Krone als die Schwarz-P., II. 2—3 m. hoch	—,50	4	*
30.	nigra, L., Schwarz-P.	—,50	4	—
28.	Simoni , Sim-L., grossblättr. sehr schöne Pappel aus China. M. 0,60 bis 1,25	1,25	5	—
22.	tremuloides Mehr. (= graeca, Ait. = Atheniensis, Lwdw.), Nordamerikanische Espe	—,60	5	—
T. 7.	tremula pendula Hrt., Trauer-Espe	1,75	—	—
Potentilla, L., Fünffingerstrauch.				
2.	fruticosa, K., Strauchartiger P., VII	—,35	3	—
Prunus, L., Pflaume, Kirsche 20 Sorten à 1 St. 14 M.				
a) Aechte Pflaumen (Prunus)				
1.	americana, Marsh., Amerikanische Pfl., sehr früh u. reichtragend, VI.	—,50	4	—
b. 2.	" fol. var. Gelbbuntblättr. amerik. Pfl.	—,75	—	—
4.	Armeniaca salicifolia, Hrt., Weidenblättrige Aprikose	—,75	6	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrrätig
Prunus.				
5.	<i>cerasifera</i> , Ehrh., (Pr. Myrobalana, Desf.), Kirschpfl., zeichnet sich durch frühes Blühen aus, IV.	—,40	—	—
b. 76.	" <i>fol. purpureis</i> (Späth), s. <i>Neuheiten!</i>			
17.	" <i>gigantea</i> , Hort., Riesen-Kirschpflaume	—,75	6	—
77.	" <i>heterophylla</i> , Hort., verschiedenblättrige Kirschpfl.	1,—	9	—
78.	<i>Chicasa</i> Mehr., Chicasapflaume	—,75	—	—
79.	<i>Cocumilia</i> , Fern., Cocumilia Pfl.	1,—	9	—
b. 7.	<i>oeconomica</i> , Borkh., fol. var. Weissbuntblättrige Zwetsche, sehr schön weiss marmorirt, VI.	—,75	—	—
b. 19.	" <i>fol. aureo marginatis</i> , goldrandig	—,75	—	—
P. 8.	" <i>pyramidalis</i> , Hort., Pyramiden-Zwetsche, V, VI	—,75	—	—
b. 9.	<i>orientalis fol. var.</i> , Hort., Morgenländische weissrandige Pfl. constant	—,75	6	—
15	Petzoldi, C. Koch (Amygdalus chinensis, Hort.), Petzold's Aprik., Blüten rosa gefüllt, kleiner als bei Pr. triloba	—,75	—	—
	Pissardii, s. <i>Neuheiten Prun. cerasifera fol. purp.</i>			
10.	pumila, Hort., Niedrige Pfl., VII.	—,50	4	—
33.	" <i>Susquehanae</i> , Hort., kriechend	—,50	—	—
18.	<i>Simoni</i> , Hort., Simon's Pfl., neue strauchartige Pfl. aus China mit glänzenden Blättern u. ziegelrothen grossen Früchten, völlig hart, Früchte sehr wohlriechend M. 1 bis	1,50	9—13	—
12.	<i>spinosa</i> pl., Hort., Gefüllte Schlehe, i. d. Blüthezeit ausserordentlich schön	—,75	—	—
	Hochst.	1,50	13	—
14.	<i>triloba</i> , Lindl., Nandelaprikose, Blüten prächtig, gleich kleinen gefüllten Rosen, reichblühend,	—,50	4½	*
	" 1—2 m. hohe Stämme mit 1—3jährigen Kronen, M. 1 bis	2,—	9—18	*
b) Kirschen (Cerasus).				
21.	<i>Avium</i> , L., fl. pl., Gefülltblühende Süssk.	1,—	8	*
	Hochst.	1,75	—	—
84.	" <i>asplenifolia</i> Hort., Farnblättrige K.	1,—	—	—
35.	" <i>decumana</i> , Hort., Tabakblättr. Süssk., sehr grossblättrig	1,—	—	—
T. 22.	" <i>pendula</i> , Hort., Trauer-Süssk., schön hängend	1,75	15	—
b. 23.	" <i>pulverulenta tricolor</i> , Hort., Dreifarbige bestäubtblättrige Süsskirsche	—,75	—	—
25.	<i>Cerasus</i> , L., fl. albo pl., Weissgefüllte Sauerk.	1,75	15	—
27.	" fl. roseo pl., Hort., (serrulata fl. pl. C. Koch), rosenroth gefüllt	1,—	9	—
	Hochst.	1,75	—	—
T. 38.	" <i>pendula</i> fl. roseo, gut hangend, Neu! M. 1 bis	1,75	—	—
26.	" <i>Rhexi</i> , fl. pl., Sauerkirsche mit grossen gefüllten, kleinen Rosen ähnlichen Blüten, schöne Pyramiden M. 1 bis	1,50	8—13	—
	Hochst.	1,75	15	—
36.	" <i>sempervirens</i> , Hort., dunkelgrün glänzendblättrig	—,50	4	—
28.	<i>fruticosa</i> , Pall., kugelförmige Strauchweichsel M 0,75 bis	2,25	15	—
T. 29.	" <i>pendula</i> , hängende Strauchk.	Hochst. M 1,75 bis	2,25	15
* 30.	<i>japonica fl. albo pl.</i> (Pr. sinensis fl. albo pl., Weiss gefüllte japan. Zwergk. veredelt	—,50	3½	*
	" 1—2 m. hoch, vered. Stämme M. 0,75 bis	2,—	6½—16	—
* 31.	" <i>roseo pl.</i> , Rosa gef. japan. Zwergk. veredelt	—,50	3¼	—
	" <i>Diese beiden letzteren</i> stark wurzeläccht	—,35	2¼	*
170.	<i>sempervirens</i> , Ehrh., Allerheiligenkirsche, blüht bis in den Herbst hinein. Pyramiden	1,25	11	—
	Hochst. M. 1,75 bis	2,25	15	—
c) Traubenkirschen (Padus).				
40.	<i>Mahaleb</i> , L., Steinweichsel, Blätter und Holz wohlriechend, letzteres vielfach zu Pfeifenröhren benutzt, V. 1½—2 m. h.	—,40	3½	*
41.	" <i>compacta</i> , Hort. Brit., Eine hier entstandene sehr gedrängt wachsende reichbelaubte Abart	—,75	6	—
56.	" <i>fructu luteo</i> , Hort., gelbfrüchtig	—,75	6	—
57.	" <i>monstrosa</i> , Hort., Monströse	1,—	—	—
43.	<i>Padus</i> , L., Gemeine Traubenk., V. VI. 1½—2 m. h.	—,40	3½	*
	Hochst. M. 1 bis	1,50	—	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrätig
Prunus.				
b. 44.	<i>Padus, aucubaefolia</i> , Aukubenblättr. Traubenk., Blätter regel- mässig punktiert, sehr hübsch M. 1,25 bis	—,75 3,—	6 11—25	* —
55.	" il. pl. <i>Hrt.</i> , Gefüllte Traubenk.	1,—	8	—
85.	" <i>heterophylla elegans variegata</i> , <i>Hrt.</i> , Buntblättrige, ver- schiedenblättrige Traubenkirsche	1,25	10	—
86.	" <i>Maackii</i> , <i>Hrt.</i>	—,75	6	—
45.	" <i>rotundifolia</i> , <i>Hrt.</i> , grossblättrig u. grossfrüchtig, M. 0,75 bis Starke Hochst.	1,50 2,50	6 —	— —
46.	<i>serotina</i> , <i>Elrh.</i> , Späte Traubenk., Blätter lorbeerähnlich glänzend, sehr schön, V, VI. 1—1½ m. h.	—,40	3½	*
47.	" <i>asplenifolia</i> , <i>Hrt.</i> , farnblättrig	—,75	—	—
48.	" <i>cartilaginea</i> , <i>Lohn.</i> , pergamentblättrig. Sehr schön, 1—2 m. hoch M. 0,60 bis	1,50	5—13	*
	" <i>prachtvolle Pyramiden, Solitärpflanzen!</i> ca 3—3½ m. hoch und über 2 m. breit 2 bis Hochst.	3,— 2,—	27 18	— —
50.	<i>virginiana</i> , <i>Elrh.</i> , Virginische Traubenk. m. reichen rothen Trauben	—,40	3½	*
T. 52.	<i>pendula</i> , <i>Hrt.</i> , hangend M. 0,75 bis	2,—	18	—
	Ptelea, L., Lederbaum.			
1.	<i>trifoliata</i> , L., Dreiblättriger L. V.	—,30	2½	*
	Pterocarya, Kth., Flügelnuss			
* 1.	<i>caucasica</i> , C. A. Mey, Kaukasische Fl., einer der schönsten u. schnell- wüchsigsten Bäume. Er erreicht bei uns in 25 Jahren eine Höhe von 15 Metern und sollte seiner hervorragenden land- schaftlichen Wirkung wegen in keiner Parkanlage fehlen. Als Waldbaum ist er seiner bedeutenden Holzproduction wegen sehr zu empfehlen. Siehe auch Alleebäume	1,— 2,50	7 14	60 135-220
	Hochstämme M. 1,50 bis	2,50	14	—
2.	<i>laevigata</i> , glattblättr. Fl.	1,—	9	*
3.	<i>sinensis</i> , David	1,25	1	—
	Quercus, L., Eiche nach meiner Wahl 12 Sorten à 1 St. 15 M. Die Eichen verdienen wegen ihres grossen Formenreich- thums und ihrer Schönheit die häufigste Anpflanzung.			
I. Eichen der alten Welt.				
a) Robur , Verwandte der deutschen Eichen.				
3.	<i>apennina</i> , Lam., Apenninen-E. M. 1 bis	2,—	9—18	—
33.	<i>pubescens</i> , Willd., (= lanuginosa, Thailt), Weichhaarige E., graugrün	1,25	—	—
54.	" <i>altissima</i> , <i>Hrt.</i> , Wuchs emporstrebend	1,50	—	—
103.	<i>pedunculata</i> Willd. (Q. Robur, L.), Sommer-E., Stiel-E. 2 m. hoch	—,75	6	*
b. 17.	" <i>argenteo-marginata</i> , Weissrandig hübsch M. 1 bis	1,50	9—13	—
b. 18.	" <i>picta</i> , <i>Hrt.</i> , sehr hübsch weissbunt	2,—	18	—
b. 19.	" <i>variegata</i> , weissgestreift	1,50	13	—
b. 20.	" <i>atropurpurea</i> , Blut-E., dunkel purpurroth wie die Blutbuche			
	M. 2,00 bis	3,—	18—27	—
11.	" <i>aurea bicolor</i> <i>Hrt.</i> , gelb, grün und weiss	1,50	—	—
127.	" <i>cochleata</i> , <i>Hrt.</i> , eigenthümliche, wellig gedrehte Belaubung	1,50	—	—
24.	" <i>comptoniaefolia</i> , <i>Hrt.</i> , sehr zierliches hübsches Laub			
	M. 1,50 bis	2,50	13—22	—
140.	" <i>major</i> (Alb.) <i>Hrt.</i>	1,50	—	—
b. 12.	" <i>Concordia</i> , <i>Hrt.</i> , mit goldgelben Blättern, schön M. 1,50 bis	3,50	13—22	—
129.	" <i>cucullata fol. arg. var.</i> <i>Hrt.</i> , Blätter kappenförmig, gelb- lich weissbunt	2,—	18	—
21.	" <i>cuprea</i> <i>Hrt.</i> , junges Blatt fast kupferfarbig	1,25	—	—
P. 13.	" <i>fastigiata</i> , (Q. fastig., Lam.), Pyramiden-E., 1—2½ m. h., M. 1,00 bis	5,—	9—40	*
P. 15.	" <i>cucullata</i> , <i>Hrt.</i> , Hohlblättrige Pyramiden-E.	2,—	—	—
105.	" <i>compressoides</i> <i>Hrt.</i> , dichtgedrängte Pyramiden bildend	2,—	18	—
P. 106.	" <i>viridis</i> , <i>Hrt.</i> , Grüne Pyramiden-E.	2,—	—	—
16.	" <i>pileifolia</i> , <i>Topf.</i> , Farnblättr. St-E., Laub hellgrün, stark zerschlitzt, zierlich	1,50	13	—

Ziergehölze.

No	Quercus.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weises Vorräthig
138.	pendula <i>fol. aureis</i> <i>Hrt.</i> , rein goldgelb	5.—	45	—
130.	" <i>fol. aureo</i> var. <i>Hrt.</i> , Blatt schön gelbbunt	1,50	—	—
26.	" <i>heterophylla</i> , <i>Loud.</i> , Ungleichblättr. St.-E	1,25	—	—
10.	" " <i>cucullata</i> , <i>A M.</i> , mit aufgetriebenen verschieden gestalteten Blättern	1,50	13	—
b. 129.	" " <i>fol. arg.</i> var., <i>Hrt.</i> , weissbunt	1,75	—	—
107.	" " <i>lyrata punctata</i> , <i>Hort. Gall.</i> , gefleckte lyraartige Hentzei, <i>Hrt.</i> , Hentze's St.-E.; eigenthümliche, gekräuselte Belaubung M. 1,25 bis	1,25	10	—
28.	" " "	2.—	10—18	—
b. 22.	" <i>maculata</i> , <i>Hrt.</i> , weiss gefleckt	1,50	13	—
109.	" <i>multicaulis</i> , <i>Bth. C.</i> , Vielstielige E.	1,50	13	—
132.	" <i>nigricans</i> , <i>Hrt.</i> , Laub röthlich braun M. 1,50 bis	3.—	13	—
131.	" <i>pallida</i> , <i>Hrt.</i> , Laub gelblich grün	1,25	—	—
29.	" <i>pectinata</i> , <i>Hrt.</i> , Kammlättr. E.; weit ausgezackt, s. schön M. 1,25 bis	2.—	13—18	—
	" " " Höchst.	2,50	—	—
T. 25.	" <i>pendula</i> , <i>Hrt.</i> , Trauer-E. M. 1,50 bis	2.—	—	—
T. 99.	" " <i>Dauvessii</i> , <i>Hrt.</i> , s. schöne Trauer-Eiche M. 1,50 bis	4.—	13	—
T. 110.	" " <i>nova</i> , <i>Hrt.</i> , Neue Trauer-E.; schön M. 1,50 bis	4.—	—	—
134.	" <i>rubicunda</i> , <i>Hrt.</i> , = <i>cuprea</i> , <i>Hrt.</i> , Laub röthlich	1,50	13	—
b. 23.	" <i>pulverulenta</i> , <i>Hrt.</i> , bestäubt weissbuntblättrig	1,50	—	—
111.	" <i>rubrinerva</i> , <i>Hrt.</i> , Rothnervige E	1,25	—	—
149.	" <i>scolopendrifolia</i> , <i>Arb. Musc.</i> , Hirschzungenbl. Stieleiche. Blätter am Rande gelblich gefärbt	1,25	—	—
31.	<i>Pseudo-Aegilops</i> , <i>Arb. Musc.</i> (= <i>Aegilops</i> <i>Hrt.</i>), Falsche Knoppereiche, sehr zierend	1,25	—	—
T. 32.	" <i>pendula</i> , <i>Arb. Musc.</i> (= <i>Cerris pendula</i> de Lapanouse, <i>Hrt.</i>), hängende falsche Knoppereiche	1,50	—	—
46.	<i>sessiliflora</i> <i>Afghanistanensis</i> , <i>Bth. C.</i> , glänzendblättrig	1,50	13	—
40.	" <i>Falkenbergensis</i> , <i>Bth. C.</i> , Falkenberg-E., grossblättrig	1,25	11	—
41.	" <i>Geltowiensis</i> <i>Hrt.</i> , schöne Form mit schmalen starkblasigen Blättern	1,50	13	—
43.	" <i>longifolia hybrida</i> , <i>A M.</i> , Langblättr. Bastard-E., sehr lang und schmalblättrig, hübsche Sorte	1,50	13	—
42.	" <i>Louetti</i> , <i>A M.</i> , Louett's E., starkwüchsig mit dunkelgrünen, glänzenden, lorbeerähnlichen Blättern, hübsch	1,25	—	—
136.	" <i>purpurea</i> <i>Hrt.</i> , Farbe der jungen Blätter schön bräunlich purpurroth	1,50	—	—
50.	<i>ventricosa</i> <i>Bth. C.</i> ,	1,25	—	—
b) Cerris, Cerr-Eiche. (Türkische oder Burgunder-E.) Blätter scharf gezähnt, Früchte im 2. Jahre reifend.				
113.	<i>Cerris</i> , <i>L.</i> , Cerr.-E., Burgunder-E. 1—2 m. hoch	—,75	6	—
115.	" <i>austriaca sempervirens</i> , <i>Hort.</i> , Eine sehr zu empfehlende immergrüne Eiche, die einzige die bei uns winterhart ist	3.—	25	—
56.	" <i>crispa</i> , <i>Hrt.</i> , Krausblättrige C.-E.	1,25	—	—
60.	" <i>Fulhamensis</i> , <i>Loud.</i> , C.-E. von Fulham	1,50	—	—
66.	<i>conferta</i> , <i>Kit.</i> , (<i>Qu. pannonica</i> , <i>Bth.</i>), Dichtfrüchtige E., sehr schöne grossblättrige Sorte M. 1,25 bis	2.—	11—18	—
137.	<i>Daimyo</i> , <i>Hrt.</i> , Kaiser E., neu aus Japan	2,50	22	—
64.	<i>macranthera</i> , <i>F et M.</i> , Grossbl. E., mit herrlichen dunkelgrünen Blättern; unter den grossblättrigen vielleicht die schönste M. 1,25 bis	2,50	11—22	—
	" " " Höchstämme	2,50	—	—
II. Eichen der neuen Welt (Nordamerika).				
69.	<i>alba</i> , <i>L.</i> , Weisse E., prächtig rothe Herbstfärbung	1,50	13	—
70.	" <i>elongata</i> <i>Hrt.</i> , orangerothe Herbstfärbung	1,50	—	—
118.	<i>ambigua</i> , <i>Willd.</i> , Zweifelhafte E	1,50	13	—
67.	<i>Ballota</i> <i>Desf.</i> , Früchte genüssbar	1,25	—	—
119.	<i>coccinea</i> , <i>Wang</i> , Scharlach E., Herbstfärbung roth	—,75	—	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrätig
Quercus.				
94.	imbricaria, Willd., Schuppenfrüchtige E. Dieselbe verdient durch das prächtig rothe Herbstcolorit der lorbeerartigen, theilweise etwas gelappten Blätter, eine allgemeine Verbreitung in den Park-Anlagen	1,50	—	—
77.	macrocarpa, Mehr., Grossfrüchtige E., mit auffallend grossen und schönen Blättern	—,75	7	*
78.	monticola, (= Castanea, Hrt.), Bergkastanien-Eiche, die Blätter ähneln sehr denen der Castanea vesca, Baum raschwüchsig und schön	1,50	13	—
92.	nigra, L., Schwarze E., bemerkenswerth durch die grossen grünen, auf der unteren Seite schön braunrothen, festen Blätter, die im Herbst dunkelroth sich färben	2,—	—	—
72.	olivaeformis, Mehr. fil., Olivenfrüchtige E.	1,—	8	—
73.	Hampteri, Hrt., mit grösseren Blättern als Nr. 72	1,50	13	—
79.	paludosa Hrt.	2,—	—	—
121.	palustris, Dur., Sumpf-E., gezacktblättrig	—,75	6	—
	Hochst.	2,—	—	—
75.	ramosa, Hth. C., Verzweigte E., zu der Gruppe der weissen Eichen gehörig	1,50	—	—
98.	repanda, Arb. Musc., schöne Belaubung	1,50	—	—
122.	rubra, L., Rothe E., Herbstfärbung roth	—,75	6	—
82.	tomentosa bicolor, Willd., Zweifarbig filzige E.	1,25	11	*
Rhamnus, L. Wegedorn, Kreuzdorn.				
1.	alpina, L., Alpen-Kreuzdorn	1,50	—	—
h. i. 3.	Billardi, Hrt.	1,—	—	—
4.	cathartica, L., Gemeiner Kreuzd., gut zu Hecken, VI.	—,25	2	*
h. i. 5.	chlorophora Hrt., hellgrün, schmalblättrig, halb immergrün	1,25	—	—
7.	Erythroxylon, Pall.	1,—	—	—
8.	Frangula, L., Faulbaum, Pulverholz, VI	—,25	2	*
9.	grandifolia, F. u. M. (Rh. Imeretina, Hrt.), Grossblättriger Weged., schön, in derselben Art wie Rh. alpina, aber grossblättriger	2,—	—	—
Rhodotypus, S. et Z.				
1.	kerrioides, S. et Z., kerrienähnlich mit weisser Blüthe	—,40	—	—
Rhus, L. Sumach (Essigbaum)				
8.	copallina, L., Kopal-S., colorirt hübsch roth im Herbst	—,60	—	—
12.	Cotinus, L. (Cotinus Coccycgea, Scop.), Perrückenstrauch, der Fruchtstand gleicht einer Perrücke, VI.	—,50	4	*
1.	glabra, L., Glatte S., V.	—,50	4	*
* 3.	" laciniata, Hrt., Geschlitzter gl. S. mit fusslangen, fein geschlitzten Blättern, von ausgezeichneter Wirkung als Einzelpflanze auf Rasen	—,75	6	—
7.	Osbeckii, D. C., schön grossblättrig	—,75	—	—
4.	typhina, Sorn., Virginischer S., V, die rothen Früchte sehr zierend	—,40	3	*
Ribes, L., Johannisbeere, Stachelbeere 12 Sorten à 1 St. 4 M.				
Die Alpen-Johannisbeeren zeichnen sich aus durch ihr frühes Ausgrünen, die Schön- u. Goldtrauben durch ihre Blüthen, die Ahlbeeren durch ihre kräftige Belaubung.				
1.	acerifolium Hrt., Ahornblättrige Goldtraube, VI.	—,25	2	*
2.	albidum, Hrt., Weissblühende Johannisb., VII	—,35	3	*
3.	alpinum L., Alpen-Joh., VII., sehr früh austreibend	—,30	2 1/2	18
22.	" praecox, Frühtreibende Alpen-Joh.	—,30	2 1/2	—
23.	" punilum aureum, Hrt., von compactem, zwergigen Wuchse mit goldgelben Blättern; neu!	—,50	4	—
32.	atropurpureum, C. A. Mey (= petraeum, Walff.) Rothblüh. Johannisb.	—,50	4	—
5.	aureum, Prsh., Aechte Goldtraube, VI, gelbblühend, Blätter im Herbst roth	—,25	2	*
6.	diacantha, Pall., Doppelstacheliche Alpen-J. VII.	—,30	2 1/2	*
4.	floridum, L'Hér., (= americanum, Mill.), Amerikanische Ahlbeere, VI, Blätter im Herbst rothbraun, hübsch!	—,30	2 1/2	*
7.	gingkaefolium, Hrt., Ginkoblättrige Goldtraube, VI	—,40	3	—
8.	Gordonianum, Lem., Gordon's Schöntraube, Blüthe orangegelb, schön, VI.	—,40	3 1/2	*
31.	Grossularia arboreum, (R. uva crispa arboreum), Baumartige Stachelb.	—,40	3 1/2	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrechnet
Rubus.				
10.	nigrum, L., Gemeine Ahlbeere. Schwarze Johannisb., VI.	—,20	1 1/2	*
11.	" heterophyllum, Hrt., Gezacktblättrige Ahlb., schön	—,40	3	*
b. 12.	" fol. arg. var., weissbunt marmorirt. VII.	—,40	3	—
b. 13.	" fol. aur. var., Goldbuntblättrige Ahlb.	—,40	3	*
14.	niveum, Lindl., Weissblühende Stachelb. VII.	—,40	—	—
16.	rotundifolium, Michx. (R. triflorum, Willd.), Rundblättr. Stachelb. VII.	—,40	3	—
17.	rubrum, L., Gemeine Joh., (s. auch unter Obst)	—,20	1 1/2	*
25.	" fol. aureo-marg., Gemeine, gelb-gerandete J., sehr hübsch	—,40	—	—
18.	sanguineum, Persh., Rothblühende Schöntraube, VII, VI., schön	—,40	3 1/2	—
26.	" carneum grandiflorum, fleischfarbig	—,50	4	—
36.	" fl. carneo pl. Hrt.	1,—	9	—
29.	" fl. pl., gefüllt blühend	—,60	5	—
19.	saxatile, Pall., Fels-Alpen-Joh., VII.	—,40	3 1/2	—
20.	setosum, Dougl., Borstigfrüchtige Stachelbeere	—,50	4	—
Robinia, L., Akazie (Robinie) 12 Sorten à 1 St. 10 M.				
Die Akazien nehmen mit sandigem Boden fürlieb u. empfehlen sich durch ihre grossen prächtigen Blüthentrauben u. zierliche Belaubung.				
* 5.	hispida, L., Borstige A., Rothblühende A., wächst mehr strauch- artig und blüht schon ganz jung, wie auch ihre folgende Abart M. 1 bis	1,50	9—13	—
* 9.	" macrophylla, Schrad., Grossblättr. b. A.	1,50	—	—
10.	Pseud-Acacia, L., Gemeine Akazie, (s. a. Allee-bäume u. Gehölzsämlinge)	—,40	3 1/2	*
11.	" amorphaeifolia, Lk., Unformblättrige gem. A.	—,75	—	—
12.	" augustifolia elegans, äusserst zierlich belaubt, schwach- wüchsiger als die gemeine A., neu! M. 1 bis	2,50	9	—
13.	" aurea, Gelbblättrige, sehr schön	1,50	—	—
14.	" Bessoniana, Hrt., Besson's Kugel-A., von üppigerem Wuchse als die gewöhnliche Kugel-A., aber mit lockerer Krone . .	—,75	6	—
42.	" rosea Berolinensis (Sp.) centifolienrosa mit sehr dichten Blüthentrauben, Blätter elliptisch ohne besondere Spitze, Blüthenstiele u. Zweige schön hellgrün	1,50	—	—
	Hochstämme	2,50	22	—
15.	" Camusetii, Hrt., Camuset's g. A. mit dunkeltem Laube M. 0,75 bis	1,50	6	—
16.	" crispa, D. C., Krausblättrige g. A., interessant M. 0,75 bis	1,25	6	—
17.	" cylindrica, Hrt., Walzenförmige g. A.	1,25	—	—
18.	" Decaisneana, Hrt., Decaisne's rothblühende A., ähnlich No. 3, etwas heller u. früher blühend	1,—	—	—
	Hochstämme	2,—	16	—
21.	" inermis, D. C., Kugel-Akazie Hochst. M. 1,75 bis	3,—	16—27	*
24.	" heterophylla, Hrt., (R. monophylla, Hrt.), sehr schön	1,25	—	—
41.	" pendulifolia, Hrt., Blätter herabhängend	1,—	—	—
44.	" rosea, Hort., schön rosablühend M. 1 bis	1,50	—	—
	Hochstämme	2,50	20	—
38.	" semperflorens, Hrt., im Frühherbst zum 2ten Mal und ganz vollblühend M. 1 bis	2,—	8—16	—
27.	" speciosa, Hrt., von ungemein kräftigem Wachsthum	1,—	—	—
36.	" umbraculifera latifolia, Hrt., Grossblättrige und sehr dunkel- laubige Kugel-A.	1,—	—	—
1.	viscosa, Vent. (R. glutinosa, Sims), Klebe-A., 2 mal blühend, hell- rosa M. 0,75 bis	1,50	6—13	—
3.	" bella rosea, Hrt., schön rosa	1,—	—	—
	Hochstämme	2,—	17	—
Rosa, L., Rose.				
multiflora , (de la Grifferaie), schöne starke Sträucher für Gehölzgruppen				
Die übrigen siehe Rosen-Sortiment Seite 42!				
Rubus, L., Himbeere, Brombeere , s. auch Obst.				
517.	arcticus, L., Nordische Himbeere, zwerghaft, mit lila-rosa Blüthen; die Früchte sollen wohlschmeckend sein u. im hohen Norden wie die unserer gem. Himbeere benutzt werden	—,50	4	—
512.	crataegifolius, Weissdornblättrige Brombeere. Ich bezog diese Brombeere aus dem Petersburger Bot. Garten, sie zeichnet sich durch ihre grossen, schön geformten Blätter aus . .	—,50	4	—
503.	flore albo	1,—	—	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
Rubus.				
513.	<i>fruticosus, fl. albo pl., Hrt.</i> , weiss gefüllt blühende Brombeere	—,50	4	—
514.	<i>fl. roseo pl., Hrt.</i> , gefüllt rosa	—,75	—	—
506.	<i>nepalensis, Schk.</i>	—,50	—	—
502.	<i>odoratus, L.</i> , Wohlriechende Himbeere, mit grossen lilafarb. Blüten	—,30	2	*
511.	<i>parvifolius, Hrt.</i> , Kleinblättrige Bromb., zur schnellen Ueberkleidung kahler Flächen wächst auch auf reinem Sande. Früchte bluthroth	—,50	4	—
505.	<i>spectabilis, Pers.</i> , Prachtige Himbeere, blüth schön purpurroth	—,40	—	—
Salix, L., Weide.				
25 Sorten à 3 St. 12 M., 25 Sorten à 1 St. 6 M., 50 Sorten à 1 St. 12 M.				
28.	<i>acuminata, Sm.</i> (= <i>Smithiana, Willd.</i> , <i>viminialis Caprea, Wimm.</i>), Blätter oft s. gr., oberseits schön dunkelgrün, unten grau-filzig, schön	—,40	3	—
29.	<i>lanceifolia, H. B. Vrat.</i>	—,40	3	—
91.	<i>acutifolia, Willd.</i>	—,40	3 1/2	—
11.	<i>alba argentea, Hrt.</i> (regalis, x. Htte.), Silber-W., Blätter silberfarben, schön!	—,30	2	*
32.	<i>Ammanniana, Willd.</i>	—,30	2	—
12.	<i>amygdalina discolor, Hrt.</i>	—,30	2	—
96.	<i>pallida, Hrt.</i> , gute Bindeweide	—,30	2	—
13.	<i>annularis, Hrt.</i> , (<i>pendula annul., C. Koch.</i>), Locken-W., s. auffallende Form	—,50	4	—
94.	<i>aquatica fol. arg. var., Hrt.</i> , schön weissbunt, neu!	—,50	4	—
34.	<i>argentea-aurita, Wimm.</i> , Gehörte Silberweide	—,40	3	—
36.	<i>austriaca, Host.</i> (purpurea Caprea hybr.)	—,40	3	*
82.	<i>Bataiuc, Hrt.</i> , s. starkwüchsig	—,30	2	*
37.	<i>bicolor, Ehrh.</i> , Zweifarbig W., Blätter oben glänzend, unten blau-grün	—,40	3	—
39.	<i>caprea fol. glabris, Hrt.</i>	—,40	3	—
T. 22.	<i>caprea pendula, Hrt.</i> , Trauer-Palm-W., breitblättrig, schöner Trauerbaum	2,50	18—22	—
1.	<i>caspica, Hrt.</i> (S. <i>pinifolia, Wendl.</i>) Kaspische W., gute Bindeweide	1000 St. 150 M.	—	—
41.	<i>cinerea L.</i> , Grau-W., Blätt. oben mattgrün, unterseits grau-weiss	—,30	2	*
42.	<i>acuminata, Hrt.</i> , Spitzblättr. Grau-W.	—,30	2	—
h. 23.	<i>tricolor, C. Koch.</i> (<i>caprea tricolor, Hrt.</i>), Dreifarbig Graue W., hübsch bunt	—,40	3	—
44.	<i>viminialis, Wimm.</i> , ähnlich No. 56	—,40	3	—
45.	<i>cotinifolia, Sm.</i> , mit eirundlichen Blättern	—,30	2	—
46.	<i>daphnoides, Vill.</i> , Reifweide mit blau gereiften Aesten u. Zweigen, schön	—,40	3	—
30.	<i>Aglaia, Hrt.</i> , grossblättriger als vorige	—,40	3	—
5.	<i>pommeranica, Hrt.</i> , vielleicht die starkwüchsigste Weide	—,40	3	*
47.	<i>dasyclados, Wimm.</i> , Langblättr. W., sehr raschwüchsig und schön	—,30	2	*
48.	<i>decipiens, Hrt.</i> , eine Form der Bruchweide, (S. <i>fragilis, L.</i>)	—,30	2	*
49.	<i>discolor, Hrt.</i>	—,40	3	—
50.	<i>Doniana, Sm.</i> , (= <i>purpurea-repens, Wimm.</i>), Don's W.	—,40	3	—
T. 6.	<i>elegantissima, C. Koch.</i> (<i>Sieboldii, Hrt.</i> = <i>babylonica femina, Hrt.</i>), Japanische Trauer-W., eine sehr schöne harte Art mit elegant hängenden Zweigen	—,30	2	*
51.	<i>Forbyana, Sm.</i> , Forby's W.	—,30	2	—
3.	<i>fusca, Hrt.</i> , Braune W., junges Holz schwarzbraun	—,30	2	—
52.	<i>grandifolia, Seringe.</i> (<i>appendiculata, Vill.</i>), Grossblättr. W.	—,30	2	—
53.	<i>hastata, Hrt.</i>	—,40	3	—
P. 7.	<i>Helix pyramidalis, C. Koch.</i> (<i>linearis, Hrt.</i> = <i>Josephinae, Hrt.</i> = <i>Eugenei, Hrt.</i>), Pyramiden-Bach-W., hübsch für Anlagen	—,30	2	*
54.	<i>heterophylla, Hrt.</i> , Verschiedenblättr. W.	—,30	2	—
55.	<i>hippophaefolia, Thuill.</i> , Sanddornblättr. W., junge Triebe glänzend-silberweiss behaart	—,30	2	—
85.	<i>undulata, C. Koch.</i> (= <i>undulata, Ehrh.</i>)	—,30	—	—
56.	<i>holosericea, Willd.</i> (<i>viminialis-cinerea, Wimm.</i>)	—,40	3	—
35.	<i>angustifolia, C. Koch.</i> (<i>auritaviminalis, Wimm.</i>), Schmalblättr. seidenglänzende W.	—,40	3	—
57.	<i>Hoppeana, Willd.</i> (<i>triandra Hoppeana, Hrt.</i>), Hoppe's W., eine Form der Mandelweide mit schmalen, unterseits sehr blaugrünen Blättern.	—,30	2	*

Ziergehölze.

No.	Salix.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
80.	<i>incana</i> , Schrank, (= <i>Elaeagnus</i> , Scop. =) <i>rosmarinifolia</i> , Genan, Schmalblättrige W.	—,30 2,50	2 1/2 13—22	* —
	Hochst. M. 1,50 bis	—,40	3	—
58.	<i>japonica</i> , Thunb., Japanische W.	—,30	2	*
4.	<i>jaspidea</i> , Hrt., Jaspisfarbige Reif-W., junges Holz dunkelgrün mit starkem weissen Reife, im Winter schön	—,30	2	—
59.	<i>Lambertiana</i> , Sm., Lamberts-W., Form der Bachweide (S. <i>Helix</i> L.)	—,30	2	—
62.	<i>Laweana</i> , Hrt., Law's W.	—,40	3	*
63.	<i>menthaefolia</i> , Host.	—,30	2	—
64.	<i>Meyeriana</i> , Hrt., Meyer's W.	—,30	2	—
65.	<i>mirabilis</i> , Host.	—,40	3	*
20.	<i>mollissima</i> , Ehrh., Weichblättr. W.	—,30	2	*
66.	<i>nigricans</i> , Sm. (= <i>spadicea</i> , Chois.), hübsch belaubt, mit stark ent- wickelten Nebenblättern	—,30	2	—
67.	<i>parvifolia</i> , Hrt., Kleinblättr. W.	—,30	2	—
24.	<i>pentandra</i> , L., Blätter gross, glänzend wie Lorbeer, schön!	—,30	2 1/2	—
93.	<i>Petzoldi</i> , Arb. Musc., Petzold's W.	—,40	3	—
68.	<i>Pontederana</i> , W. Koch, Breitblättr. Bachweide	—,30	2	*
70.	<i>praecox femina</i> , Hrt.	—,30	2	—
15.	<i>prunifolia</i> , Hrt., Pflaumenblättrige W., Holz bräunlich, buschig	—,30	2	—
16.	<i>purpurea</i> , L., Purpur-W., Binde-W.	—,30	2	*
T. 14.	<i>purpurea pendula</i> , C. Koch (<i>nigra pend.</i> , Hrt.), Trauerpurpur-W., feinzweigig, schön	—,30	2	*
	Hochstämme M. 1,50 bis	2,50	13—20	*
71.	<i>uralensis</i> , C. Koch (<i>uralensis</i> Hrt.), eine vorzügliche Bindew.	—,30	2	*
74.	<i>rigida</i> , Mühlb., mit stark entwickelten Nebenblättern, hangend, hübsch Hochst. 1,50 bis	—,30 2,25	2 13	* —
75.	<i>rosmarinifolia</i> , L., Rosmarin-W., schmalblättrig, zierlich	—,40	—	—
17.	<i>rubra</i> , Huds., Rothe W.	—,30	2	—
77.	<i>Russeliana</i> , Sm., Russel's W.	—,30	2	—
78.	<i>Sacramento</i> , Hrt.	—,40	3	—
79.	<i>salviaefolia</i> , Koch, Salbeiblättr. W., ähnlich <i>S. caprea</i> , Blatt länger .	—,40	3	*
80.	<i>sericea</i> , Hrt. (? = <i>glauca</i> , L.) niedrige graubelaubte schöne Zierweide Hochst. 1,50	—,30 1,50	2 —	* —
81.	<i>Seringeana</i> , Gaud., Seringe's W., Blendling von <i>S. caprea</i> u. <i>Elaeagnus</i> (<i>rosmarinifolia</i>)	—,30	2	—
83.	<i>stipularis</i> , Sm.	—,30	2	—
86.	<i>viburnoides</i> , Schleich., Schneeballblättr. W.	—,30	2	—
87.	<i>viminalis</i> , L., Korb-W. (1/2 M. 18, 1/10 M. 150)	—,30	2	*
88.	<i>caprea</i> , Wimm.	—,30	2	—
18.	<i>regalis</i> , Hrt.	—,30	2	*
19.	var. Reifenweide	—,30	2	—
8.	<i>vitellina</i> , L., (<i>alba vitellina</i> , C. Koch.), Dotter-W.; gelbzweigig, sehr zierend, gute Bindeweide	—,30	2	*
26.	<i>aurantiaca</i> , Hrt.	—,30	2	—
27.	<i>Britzensis</i> , Hrt. Brütz, s. <i>Neuheiten</i>	—,30	2	—
25.	<i>flava</i> , Hrt.	—,30	2	*
9.	<i>glauca</i> , Hrt. gall.	—,40	3	*
97.	<i>nova</i> , Hrt., ausgezeichnete Bindeweide, treibt lange, gerade Ruthen ohne Seitenzweige, s. starkwüchsig	—,40	3	*
10.	<i>purpurea</i> , Hrt.	—,30	2	—
Von obigen Weiden zeichnen sich besonders folgende aus, als:				
Zierweiden: No. 3. 4. 6. 7. 8. 11. 13. 14. 15. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 30. 45. 46. 47. 50. 60. 61. 62. 63. 63. 75. 78. 79. 80. 86. 89. 94.				
Bindeweiden: No. 1. 8. 10. 16. 18. 19. 20. 25. 26. 27. 28. 47. 49. 51. 56. 59. 71. 87. 97.				
Sambucus, L., Hollunder (Wilder Flieder)				
1.	<i>canadensis</i> , L., Kanadischer H., V. IV, sehr starkwüchsig	—,30	2	*
2.	<i>elegans</i> , Hrt., Zierender H.; V.	—,40	3	—
4.	<i>nigra</i> , L., Gemeiner H.	—,30	2	—

Ziergehölze.

No.			per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrätig
	Sambucus.				
14.	nigra	fl. pl., Hrt., Gefülltblühend, hübsch	—,40	3	*
b. 5.	"	fol. argenteo-marginatis, Weissrandiger H., hübsch, V., VI.	—,40	3	*
b. 11.	"	fol. luteis, Hrt., Gelbblättriger H., m. leuchtend gelben Blättern	—,40	3	*
5.	"	fr. albo, Hrt., weissfrüchtig	—,50	4	—
12.	"	Fontenaysii, Hrt., stark nach Levkojen duftende Blüthe	—,75	—	—
17.	"	heterophylla, Hrt. (cannabifolia), Hanfblättr. H., hübsch	—,40	3	*
6.	"	laciniata, Geschlitzter H., sehrzierend, V.	—,40	3	*
20.	"	fol. aureo-varieg., s. Neuheiten			
7.	"	linearis, Hrt., Linienblättriger H., eine eigenthümlich schöne Sorte, einzeln zu pflanzen	—,40	3	—
13.	"	monstrosa, Hrt., niedrige, sehr bizarre Form	—,50	4	—
b. 8.	"	pulverulenta, Hrt., Weiss marmorirt, hübsch, VII.	—,50	4	*
P. * 9.	"	pyramidalis, Hrt., Pyramiden-H., Wuchs streng pyramidal, Blätter gekräuselt und sehr dunkelgrün, auffallend, wenig bekannt	—,60	5	—
10.	"	rotundifolia, Sweet., rundblättriger H.	—,40	3	—
19.	"	semperflorans, Hrt., Gemeiner immerblühender H.	—,50	4	—
16.	Plantierensis, Sim.-Louis,	von kräftigster Vegetation, die in milden Wintern kaum unterbrochen wird	—,50	4	—
3.	racemosa, L.,	Trauben-H., blüht im Frühjahr, Früchte roth, sehr zierend, V.	—,40	3	*
21.	"	plumosa, s. Neuheiten.			
22.	serratifolia, s. Neuheiten.				
	Sophora, L., Sophore.				
* 1.	japonica, L.,	Japanische S.	—,60	—	—
T. * 2.	pendula, Hrt.,	Trauer-S. Hochstämme	4,—	—	—
	Sorbus, L., Eberesche.				
	a) Echte Ebereschen (Eusorbus).				
1.	americana, Willd., IV., V.,	mit korallenrothen Beeren M. 0,75 bis	2,50	—	—
36.	"	nana, Hort., Amerik. Zwerg-Eberesche	1,—	—	—
2.	aucuparia, L.,	Gemeine E. IV. 2 m. hoch	—,50	4	—
	"	Hochstämme, s. Alleeabäume.			
6.	"	Fifeana, Hrt., mit orangegelben Früchten . . M. 0,75 bis	2,—	6	—
35.	"	fol. luteis, s. Neuheiten			
30.	"	fr. luteo, Hrt., Gemeine gelbfrüchtige E.	—,75	6	—
T. 3.	"	pendula, Trauer-E. Höchst. M. 1,50 bis	3,—	18—22	—
T. b. 4.	"	fol var. Buntblättr. Trauer-E. . . . M. 1,50 bis	2,50	—	—
32.	"	saturejaefolia, Hrt., gelbfrüchtig	—,75	6	—
7.	domestica, L.,	Speierling, Früchte gross, essbar . . M. 0,75 bis	2,—	6	—
31.	macrantha, Hrt.,	grossblumig	—,75	6	—
8.	micrantha, Dum.,	Kleinblumige E., mit kleinen korallenrothen Beeren	—,75	—	—
	b) Mehlbirnen (Aria).				
10.	Aria (Crataeg.), L.,	Gemeine Mehlb., schön graugrün belaubt, IV., V. M. 0,60 bis	2,25	20	—
33.	"	lutescens, Arb. Musc., gelbliche Mehlb.	—,80	—	—
14.	"	quercoides, Hrt., Eichenblättrige Mehlb.	—,75	6	—
15.	"	tomentosa, Hrt., junge Blätter silberweiss . M. 0,75 bis	2,—	6—18	—
38.	flabellifolia, S. Schau,	fächerblättriger	1,—	—	—
39.	glabrata, Hort. bot. Vrat.,	glattblättrige	1,—	9	—
13.	hybrida, (s. intermedia, Pers. = Crat. fennica, Kalm.),	Bastard-Eb., von sehr schöner Belaubung und pyramidalem Wuchse, IV. M. 0,60 bis	2,50	5—22	*
11.	latifolia (Crat.), Lam., (Pirus latifolia, Hrt.),	Breitblättrige Mehlbirne M. 0,60 bis	1,—	5	—
17.	"	atrovirens, Bth. Cat., mit grossen auffallend dunkelgrünen Blättern	—,75	6	—
34.	majestica Hrt., a. Nepal;	sehr kräftig wachsend, grossblättrig. Ober- seite d. Bl. leuchtend grün, Unterseite weiss filzig . .	1,50	—	—
37.	Neullyi, Hrt.,		—,80	—	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
Sorbus.				
12.	obtusata (Crat.) <i>Spach</i> , Stumpfblättrige Mehlb.	—,75	6	—
19.	terminalis, <i>Hort. gall.</i> , Sehr schöne, eigenthümliche Belaubung, die ganz von Sorbus verschieden erscheint	1,—	—	—
c) Terminaria (Elzbeere).				
9.	terminalis, <i>Crtz.</i> , gemeine Elzbeere, schön roth	1,—	—	—
d) Aronien (Apfelbeeren, Schwarzbirnen).				
Sträucher, nicht hochwachsend, mit einfachen im Herbst sich roth färbenden Blättern.				
20.	arbutifolia (Mespil.) <i>L.</i> , (<i>Aronia pirifolia</i> , <i>Pers.</i> , <i>Amelanchier chinensis</i> , <i>Hrt.</i>)	—,50	—	—
22.	heterophylla (Azarolus), <i>Borkh.</i> (Sorb. spuria, <i>Pers.</i> , <i>Aronia sorbifolia</i> , <i>Spach.</i>)	—,75	—	—
23.	melanocarpa (Pirus) <i>Willd.</i> (<i>Aronia arbutifolia</i> , <i>Pers.</i>), Schwarzfrüchtige A.	2,—	—	—
	Spiraea , <i>L.</i> , Spierstrauch (<i>Spirae</i>) 20 Sorten à St. 6 M.	—,40	3 1/2	—
Die Farbe der Blüthen ist bei jeder einzeln angegeben. (w. = weiss, wl. = weisslich, r. = roth, ros. = rosa)				
a) Im Frühjahr blühend.				
wl. 34.	amurensis, <i>Hrt.</i> , Amur-Sp., VI.	—,40	3	—
wl. 36.	" vera , Neuer vom Amur; aus der Gruppe der opulifolia	—,50	4	—
w.* 26.	Cantonensis, <i>Lour.</i> (Sp. Reevesii, <i>Lamll.</i> , Sp. Humanni, <i>Hrt.</i>); VII, VIII	—,40	3	—
w. 35.	" fl. pl. , <i>Hrt.</i> , hübsch	—,40	3	—
wl. 27.	capitata, <i>Prsh.</i> (?), Kopfbüthiger Sp.	—,40	3	*
w. 6.	chamaedryfolia , <i>L.</i> , Gamanderblättriger Sp., Laub hellgrün, VII., IV.	—,30	2 1/2	*
w. 7.	confusa , <i>Rgl.</i> , Gemeiner Sp., VI.	—,25	1 1/2	*
w. 42.	hypericifolia, <i>L.</i> (= sibirica <i>Hrt.</i>), Johanniskrautblättriger Sp.	—,30	2 1/2	—
w. 15.	" thalictroides , <i>Pdb.</i> , die Blumen bedecken die Zweige der ganzen Länge nach, VII., VIII., sehr schön	—,30	2	*
w. 29.	laevigata , <i>L.</i> , Glattblättriger Sp., grossblättrig und graugrün	—,50	3 1/2	—
w. 19.	Nicoudiarti, <i>Bosse</i> , VII., schön	—,30	2 1/2	*
wl. 20.	opulifolia, <i>L.</i> , Schneeballblättriger Sp., V.	—,25	1 1/2	*
wl. 21.	" lutea , <i>Hrt.</i> , goldblättrig	—,30	2 1/2	*
wl. 53.	" nana , <i>Hrt.</i>	—,50	4	—
wl. 44.	sorbifolia , <i>L.</i> , Ebereschblättriger Sp.	—,40	3	—
w. 61.	prunifolia <i>S. et Z.</i> , Blüthen in Dolden, weiss, einfach	—,40	3 1/2	*
w. 23.	" pl. , <i>S. u. Z.</i> , Gefüllter pfäumenblättriger Sp., VI., sehr schön	—,40	3	*
w.* 32.	Thunbergi , <i>S. u. Z.</i> , feinblättrige hübsche Art, wird vielfach getrieben	—,30	2 1/2	*
w. 24.	tritobata , <i>L.</i> (Sp. aquilegiaefolia Van Houttei, <i>Hrt.</i>), Dreilappiger Sp., sehr schöner Vorstrauch, VII., VIII	—,40	3	*
w. 62.	ulmifolia, rüsterbl. <i>Sp.</i> , Blüthen weiss, in langgestielten länglichen Doldentrauben	—,30	2 1/2	—
b) Im Sommer blühend.				
wl. 1.	alba, <i>Dur.</i> , Weissler Sp., VI., VII.	—,30	2 1/2	*
wl. 2.	ariaefolia , <i>Sm.</i> , Mehlbirnblättriger Sp., V, Blüthen in grossen Rispen ausserordentlich schön	1,—	—	—
wl. 57.	aubifolia , <i>Hrt.</i> , in grossen Rispen ausserordentlich reichblühend; schön	—,40	3 1/2	*
r. 33.	bella coccinea, <i>Hrt.</i> , Rother schöner Spierstr.	—,40	3	—
ros. 3.	Bethlehemensis rubra, <i>H.</i> , VII.	—,25	1 1/2	*
r. 4.	Billardii , <i>Hrt.</i> , Billard's Sp.; schön roth, VI.	—,25	1 1/2	*
38.	Blumei, <i>g. Dou.</i> , Blume's Spiraea, die freudig hellgrünen Blattoberflächen bilden einen schönen Contrast zu den auf der Unterseite blaugrünen Blättern, über welche reiche Blüthendolden, in blendend weissen Blumen sich effectvoll erheben	—,30	2 1/2	—
r. 47.	californica, <i>Hrt.</i> , Kalifornischer Sp., ähnlich tomentosa, VII.	—,40	2	—
r. 5.	callosa , <i>Thunb.</i> , (Fortunei <i>Planch.</i>) Prächtiger Sp., VI., VII., junge Triebe roth, schön	—,25	1 1/2	*
w. 25.	" alba , <i>Hrt.</i> , den ganzen Sommer hindurch blühend, sehr gut für niedrige Einfassungen	—,25	1 1/2	*

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
Spiraea.				
r. 49.	<i>callosa atrosanguinea</i> , <i>Hrt.</i> , dunkelroth, sehr schön	—,30	2 1/2	*
ros. 48.	" <i>macrophylla</i> , <i>Hrt.</i> , viel grossblättriger als <i>callosa</i>	—,35	2 1/2	*
ros. 39.	" <i>superba</i> , <i>Hrt.</i> , sehr grossdoldig, hellrosa, anhaltend blühend	—,35	2 1/2	*
w.* 30.	<i>canescens</i> , <i>Don.</i> (Sp. <i>cuneifolia</i> , <i>Willd.</i> = <i>nepalensis</i> , <i>argentea</i> oder <i>nivea</i> , <i>Hrt.</i>), vom Himalaya	—,30	2 1/2	—
r. 41.	<i>Douglasii</i> , <i>Hook.</i> , Douglas' Sp.	—,40	3	—
r. 9.	" <i>Sanssouciana</i> , <i>C. Koch</i> (Sp. <i>Nobleana</i> , <i>Hook.</i>) VI., VII. reich- blühend	—,30	2	*
ros. 10.	" <i>pachystachys</i> , <i>Hrt.</i> , mit grossen Dolden, VIII VII	—,30	2	*
r. 11.	<i>eximia</i> , <i>Hrt.</i> , Ausgezeichneter Sp., VII	—,35	3	*
56.	<i>expansa</i> , <i>Willd.</i> , ausgebreitete Sp. (- <i>Spiraea Kamaonensis Hort.</i> Aus dem Himalayagebirge. Die mit rothen Blüthen besetzten 5—6' hohen Stengel geben der Pflanze ein eigenthümliches Aussehen	—,25	1 1/2	—
w. 31.	" <i>nivea alba</i> , <i>Hrt.</i> (= <i>nivea alba</i> = <i>nivea Hrt.</i>)	—,40	3	—
ros. 12.	<i>flexuosa</i> , <i>Hrt.</i> , mit hin- und hergewundenen Zweigen	—,35	3	—
wl. 13.	<i>Fontenaysi alba</i> , in grossen Rispen blühend, VI.	—,30	2 1/2	*
ros. 59.	" <i>rosea Hrt.</i>	—,40	3	*
ros. 14.	<i>Fortunei semperflorens</i> , <i>Hrt.</i> , sehr reichblühend, VII	—,30	2 1/2	*
ros. 52.	<i>Forstii</i> , <i>Hrt.</i> ähnl. <i>callosa superba</i> , aber noch grossblumiger	—,40	3	*
w. 46.	<i>grossulariaefolia</i> , <i>Hrt.</i> , Stachelbeerhlättriger Sp., ein ganz niedriger Strauch, zur Vorpflanzung geeignet	—,35	3	*
wl. 16.	<i>lanceolata</i> , <i>Borkh.</i> , Lanzettblättriger Sp.	—,35	3	—
wl. 17.	<i>latifolia Borkh.</i> (Sp. <i>Bethlehemensis alba</i> , <i>Hrt.</i>), in lockeren grossen Rispen blühend, VI., VII.	—,30	2 1/2	*
wl. 43.	<i>Lenneana</i> , <i>Hrt.</i> , <i>Lenné's</i> Sp., ähnlich der vorigen	—,30	2 1/2	—
wl.* 18.	<i>Lindleyana</i> , <i>Willd.</i> , <i>Lindley's</i> Sp., mit hellgrünen gefiederten Blättern schön	—,40	3	—
rs.* 22.	<i>pruinosa</i> , <i>A. M.</i> , Bereifter Sp., mit graugrüner kräftiger Belaubung. VI., VII.	—,30	2 1/2	*
ros. 54.	<i>Regeliana</i> , <i>Hrt.</i> ? = <i>Fortunei semperflorens</i>	—,30	2 1/2	*
ros. 55.	<i>syringaeiflora</i> , <i>Hrt.</i> , Abart von <i>Sp. callosa</i> , niedrig bleibend und sehr reichblühend	—,40	3 1/2	*
r. 45.	<i>tomentosa</i> , <i>L.</i> , Filziger Sp., Blätter graugrün, Blüthen schön roth, VII.	—,30	2 1/2	*
60.	<i>vaccinifolia</i> , <i>Hrt. non Don.</i> , Blüthen in kurzer Doldentraube	—,75	6	*
Staphylea, L., Pimpernuss.				
4.	<i>Bumalda</i> , von sehr feinem Wohlgeruch	1, —	—	—
3.	<i>colchica</i> , <i>Steud.</i> <i>Kolchische P.</i> , <i>Hoibrenkia formosa</i> . M. 0,30 bis	1,25	2 1/2	20
1.	<i>pinnata L.</i> , Gefiederte P., VI, Zweige grün M. 0,40 bis	—,60	3—5	*
2.	<i>trifolia, L.</i> , Dreiblättrige P.	—,50	—	—
Symphoricarpus, Juss., Peterstrauch (Schneebeere).				
1.	<i>montanus H. B. und K.</i> , Gebirgs-Schneebeere, niedriger als Nr. 4	—,35	3	—
2.	<i>orbiculatus, Mueh.</i> (S. <i>vulgaris</i> , <i>Mueh.</i>), Gemeiner Pet., VI, VII, ein sehr guter Deckstrauch	—,25	2	*
b. 3.	" <i>fol. var. Hrt.</i> , goldbunt gerandet, sehr zierlich, VII.	—,35	3	*
4.	<i>racemosus, Mueh.</i> , Schneebeere (Wachsbeere), sehr zierend durch seine weissen Früchte; VI.	—,20	2	*
Syringa, L., Flieder 12 Sorten à 1 St. 8 M.				
1.	<i>Josikaea</i> , <i>Jacq.</i> , Josika-F, höchst auffallende Form mit grossen lederartigen dunklen Blättern und dunkelblauen Blüthen, späthblühend, V.	—,60	5	*
2.	<i>oblata, Lindl.</i> , Rundblättriger Fl. aus China. Blüht am Frühesten	—,50	4	—
3.	<i>persica L.</i> , Persischer F., VII, VIII, helllila	—,40	3	*
4.	" <i>alba, Hrt.</i> , Weissler pers. F.	—,50	4	*
5.	" <i>laciniata, Mill.</i> , Geschlitzter pers. F., VIII, VII	—,50	4	*
6.	<i>Rothomagensis, Rott.</i> (S. <i>chinensis, Willd.</i>), Chinesischer F., VI, lila stark, 1 1/2 m. hoch	—,40	3	*
	"	—,60	5	*
7.	" <i>alba, H.</i> ; Weissler chin F., VI.	—,50	4	*
9.	" <i>Metensis, Hrt.</i> , grossblumiger als Nr. 7 Höchst	1,75	—	—
8.	" <i>rubra, Loud.</i> (S. <i>Saugeana, H.</i>), Rother chin. Fl. von allen Fliedern der rötheste, schön!	—,50	4	*
20.	<i>vulgaris, L.</i> , Gemeiner F., lila; V.	—,30	2 1/2	*
	" sehr stark, 2 m. hoch 1/2 M. 30, 1000 St. M. 250	—,50	3 1/2	*

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weiss vorhandig
	Syringa.			
21.	vulgaris alba, Weisses gem. F. V.	—,40	3	—
49.	" pyramidalis	—,75	6	—
50.	" Aline Moequeris, grosse Rispe, s. schön dunkelroth, vollblühend	1,—	—	—
23.	" Ambroise Verschaffelt, rosa, später weiss, grossdoldig	—,60	5	—
24.	" <i>amoena</i> grossblumig, Knospen purp.	—,60	5	—
68.	" <i>Andenken an Ludwig Späth, s. Neuheiten.</i>			
25.	" azurea pl., gefüllt, dunkelblau.	—,60	5	—
70.	" Béranger <i>Hrt.</i> , neu!	1,25	—	—
26.	" Camille de Rohan <i>Hrt.</i> , Rispe gross, Knospe rosa, Blüthe hellblau, gross	1,—	—	—
28.	" Croix de Brab., lilarosa, grossdoldig	—,60	5	—
29.	" Dr. Lindley, lilarosa, Knospe purpur-lila, s. schön!	—,60	5	—
30.	" Dr. Nobbe, helllila, früh, sehr voll, Rispe kurz	—,60	5	—
31.	" <i>Erkenholm</i> , blau, Knospe dunkel, Rispe lang, der blaueste!	—,60	5	—
32.	" Erzherzog Johann, hell-lila-rosa	—,60	5	—
66.	" flore pleno, Lemoinei	2,—	—	—
65.	" <i>Frau Bertha Dammann, siehe Neuheiten.</i>			
33.	" Géant des batailles, roth	—,60	5	—
52.	" <i>Gloire de Moulins</i> , Knospen lebhaft rosa, enormer Strauss	—,60	5	—
34.	" <i>Goliath</i> , neuere Sorte mit grosser Blüthendolde	—,60	5	—
71.	" <i>Heyderi, s. Neuheiten.</i>			
35.	" hybrida, dunkellila, Knospen sehr dunkel	—,60	5	—
36.	" Justii	—,60	5	—
39.	" lilarosa, grossdoldig	—,40	3	*
58.	" <i>Louis van Houtte</i> , s. grossdoldig, schön roth, neu!	1,50	—	—
37.	" Lovaniensis, Löwener Fl., blass rosa	—,60	5	*
62.	" Madame Briot	—,60	5	—
38.	" " Kreuter, purpur, stammt vom Marly-Fl. ab	—,60	5	—
61.	" <i>Moser</i> , weiss	1,—	9	—
59.	" <i>Marié Legraye</i> , (v. <i>Hrt.</i>), enorm grosse weisse Blüthen, sehr zu empfehlen	1,—	9	*
		Höchst.	2,—	18
60.	" <i>Martjensis, Hrt.</i> , Marly-Fl., purpur	—,60	5	—
40.	" <i>pallida</i> , Blasser Marly-Fl.; fleischfarbig rosa	—,60	5	—
41.	" nigricans, Schwärzlich. F., neu	—,60	5	—
54.	" Princesse Marie, sehr hell lila	—,60	5	—
72.	" <i>Regeli, s. Neuheiten.</i>			
43.	" rubra, beim Aufblühen purpur	—,50	4	*
57.	" <i>rubra insignis</i> , purpur	1,—	—	—
27.	" <i>major (Charles X.)</i> , purpur	—,50	4 1/2	*
45.	" <i>Trianoniana</i> , dunkel purpur	—,60	5	—
55.	" <i>Schneelawine</i> , weiss, dichter Strauss	—,60	5	*
48.	" Triomphe d'Orléans, Knospe purpurrosa, innen lilarosa	—,60	5	—
46.	" <i>Valetiana</i> , Knospen lebh. roth	—,60	5	*
47.	" <i>Versaillensis</i> , Versailler Fl., Knospen dunkelroth	—,60	5	—
	Hochstämme (1—1,60 m Stammhöhe) von den No 2—20. 39			
	1 27. 55. M. 1 bis	1,50	7—12	—
	" No. 24. 29. 52. 35. 47. . . . M. 1,25 bis	1,75	11—15	—
	" No. 65.	5,—	40	—
	" No. 68.	10,—	—	—
	Tamarix, L., Tamariske , Laub nadelartig, s. zierlich, zu Bouquets gut zu verwenden			
*7.	africana, <i>Hrt.</i> , Afrikanische T.	—,40	3	—
*2.	gallica, <i>Hrt.</i> , Laub graugrün	—,30	2 1/2	*
6.	japonica plumosa, <i>Hrt.</i> , Japanische T., sehr zierlich gebaut	—,50	—	—
*1.	tetrandra, <i>Pall.</i> (T. parviflora, D. C.), rosa blühend, schön V. (die härteste)	—,30	2 1/2	*
	Tecoma, Juss., Tecoma , (Bignonie)			
S * 1.	radicans (Bignonia) L., Wurzelnde T., s. schön blüh., für warme Wände	—,60	5	—
	Tilia, L., Linde (s. auch Allee-bäume), 12 Sorten à 1 St. M. 12.			
1.	alba, <i>Ait.</i> (T. americana pendula, <i>Hrt.</i>), Amerikanische Silber-L., Zweige etwas hängend, Blätter unterseits grauweiss, II., III M. 1,25 bis	5,—	11	—
T. 21.	alba <i>petiolaris</i> , <i>Hrt.</i> (= tomentosa pet., alba pendula, <i>Hrt.</i>), Trauer-Silberlinde M. 1,25 bis	8,—	11—60	—

Ziergehölze.

No.	Tilia.	per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
34.	<i>alba spectabilis</i> , <i>Hrt.</i> , sehr starkwüchsig	1.25	—	—
2.	<i>americana</i> , <i>L.</i> , Amerikanische Linde, acht! grossblättr., hellgrün, m. weisser Rinde, III., II. M. 1.25 bis	8,—	11—60	—
3.	„ <i>lariflora</i> , <i>Loud.</i> , Lockerblüthige amerik. L., ausserordent- lich grossblättrig. III. M. 1.50 bis	2.50	12	—
36.	„ Moltkei (<i>Späth</i>), die schnellwüchsigste unter den amerika- nischen Arten M. 1.25 bis	3.25	11—20	—
32.	„ <i>Rosenthalii</i> , <i>Rosenthal's</i> amerikanische grossblättrige . . .	1.75	—	—
4.	<i>begoniaefolia</i> , <i>Hrt.</i> , begenienblättrige L., pyramidal M. 1 bis	3.50	9—30	—
5.	<i>corallina</i> , <i>Hrt.</i> , Rothzweigige L.	1,—	—	—
6.	<i>euchlora</i> , <i>C. Koch.</i> , (<i>T. dasystyla</i> , <i>Loud.</i>), Krim-L., III., II. Wenn auch die Blätter dieser Linde nur mittelgross sind, so ist dieselbe dennoch die schönste ihres Geschlechts durch die dunkel- grüne Farbe ihrer sehr haltbaren Blätter und durch ihren kräftigen schlanken Wuchs M. 1 bis	4,—	9—35	*
24.	<i>filicifolia nova</i>	1.50	—	—
7.	<i>flavescens</i> , <i>A. Br.</i> , Gelbliche L. M. 1 bis	5,—	—	—
8.	<i>floribunda</i> , <i>A. Br.</i> , Reichblühende L. M. 1 bis	2.75	9—25	—
9.	<i>gigantea</i> , <i>Hrt.</i> , Riesige L., ähnlich macrophylla, s. grossbl. M. 1.25 bis	7,—	11	—
30.	<i>hybrida superba</i> , <i>Hrt.</i> , grossblättrig, dunkel belaubt M. 1.25 bis	7,—	11—50	—
11.	<i>longifolia dentata</i> , <i>Hrt.</i> , Gezähnte langblättrige L. M. 1.25 bis	3.50	11	—
12.	<i>macrophylla</i> , <i>Hrt. b. B.</i> , (<i>T. pubescens</i> , <i>Ait.</i>), III., Amerikanische grossblättr. L., sehr grossblättrig M. 1.25 bis	15,—	11	—
13.	<i>mississippiensis</i> , <i>Hrt.</i> , sehr grossblättrig	1.25	11	—
14.	<i>multiflora</i> , <i>Vent.</i> , Vielblumige L. M. 1.25 bis	3.50	—	—
16.	<i>platyphyllos</i> , <i>Scop.</i> , Gemeine grossblättrige L. oder Sommer L., 1½—2 m. h.	—75	6	*
	„ Höchstämme, siehe auch Alleeebäume.			
17.	„ <i>aurea</i> , <i>Hrt.</i> , Goldzweigige L.	1.25	11	—
25.	„ <i>asplenifolia</i> , <i>Hrt.</i> , Farnblättrige L., zierlich	1.50	—	—
35.	„ <i>pyramidalis obliqua</i>	1.25	11	—
19.	<i>tomentosa</i> , <i>Mueb.</i> (<i>T. alba</i> , <i>H. et K.</i> , <i>T. argentea</i> , <i>D. C.</i>), Ungarische Silber-L., weisser als „alba“ IV. M. 1 bis	4,—	9	—
20.	„ <i>nova</i> , <i>Hrt.</i> M. 1 bis	4,—	—	—
22.	<i>ulmifolia</i> , <i>Scop.</i> , Kleinblättrige L. (siehe auch Alleeebäume) 1½—2 m. h.	—75	6	—
27.	<i>vitifolia</i> , <i>Hrt.</i> , weinblättrige L.	1.50	—	—
29.	<i>vulgaris</i> , <i>Hayne</i> , (= <i>intermedia</i> , <i>D. C.</i>), Gemeine oder Zwischen-L., Aechte Holländische L. (oft wird als solche auch irrthüm- lich die Sommerlinde <i>T. platyphyllos</i> verbreitet) M. 0.75 bis	12,—	6—100	—
	Ulmus, L., Rüster (Ulme) 12 Sorten à 1 St. 10 M.			
28.	<i>americana</i> , <i>L.</i> , Aechte amerikanische R., m. hellgrünem Laube, in den meisten Baumschulen falsch! Starkwüchsig!	1,—	9	—
1.	<i>antarctica</i> , <i>Hrt.</i> , Zierliche R. IV.	1,—	9	—
b. 2.	„ <i>aurea</i> , <i>A. M.</i> , goldfarbig, sehr effectvoll	1.25	11	—
63.	<i>betulaefolia nigrescens</i> , <i>Hrt.</i> , siehe Neuheiten			
3.	<i>campestris</i> , <i>L.</i> , Feld-R., II (siehe auch Alleeebäume) 2 m. hoch	—50	4	—
39.	„ <i>Berardi</i> , <i>Hrt.</i> , diese Art zählt wohl mit ihrem feinen scharf gezähnten Laube zu den schönsten ihrer Gattung	1,—	9	—
63.	„ <i>betulaefolia nigrescens</i> , <i>Hrt.</i> , s. Neuheiten.			
4.	„ <i>cucullata</i> , <i>Hrt.</i> , Kappenförm. F.-R. Blätt. eigenthüml. kraus.	1,—	—	—
b. 5.	„ <i>fol. arg. marg.</i> , <i>Hrt.</i> , Weissrandige F.-R.; sehr schön im Halbschatten	1,—	8	—
b. 6.	„ <i>fol. arg. var.</i> , <i>Hrt.</i> , Weissbunte F.-R.; Blätter marmorirt	1,—	9	—
61.	„ <i>fol. rubris</i> , <i>Hrt.</i> , ähnlich purpurea aber kleinblättriger, neu!	1.25	10	*
b. 56.	„ <i>myrthifolia purpurea</i> , siehe Neuheiten.			
50.	„ <i>unbrucalifera</i> , <i>Hrt.</i> , siehe Neuheiten.			
b. 41.	„ <i>punctata</i> , <i>Hrt.</i> , stark weiss marmorirt	1,—	8	—
P. 42.	„ <i>pyramidalis</i> , <i>Hrt.</i> , Pyramiden F.-R. M. 1 bis	2,—	9	—
43.	„ <i>sarniensis</i> , <i>Loud.</i> (= <i>Wheatleyi</i> , <i>Hrt.</i>), rundblättrige etwas pyramidale Abart von <i>campestris</i> , dunkelgrün belaubt	1,—	9	—
29.	„ <i>viminalis</i> , <i>Loud.</i> , weidenbl. Rüster M. 1 bis	2,—	8	—
b. 51.	„ <i>marginata</i> , <i>Hrt.</i> , reich belaubt mit kleinen gelb- bunten zierlichen Blättern. Neu!	1,—	9	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
Ulmus.				
* 30.	chinensis, Pers. (= parvifolia, Jacq. = camp. chinensis, Loud.), feine scharf gezähnte freudig grüne Belaubung	1,—	—	—
64.	<i>corytifolia purpurea</i> , Hrt., siehe Neuheiten.			
38.	<i>effusa</i> , Willd. (U. laevis, Pall.), Bast-R., II. (s. auch Allee-bäume) 2 m. h.	—,50	4	*
31.	fulva, Mchx., langblättrig, gross und hell belaubt: ächt!	1,—	8	—
* 20.	gigantea (montana gigantea), Riesige R., sehr grossblättrig IV. M. 1 bis	2,—	9	—
21.	glabra Scampstoniensis, Loud., Glatte Scampston-R M. 1 bis	2,—	9	—
* 22.	" sibirica, Hrt., Glatte sibirische R., hellgrün	1,—	9	—
75.	Heyderii, siehe Neuheiten.			
T. 23.	<i>horizontalis</i> , Hrt., Wagerechte Trauer-R., schirmartig hängend, M. 1 bis	5,—	35	—
73.	latifolia, Hrt.	1,25	—	—
65.	<i>latifolia nigricans</i> , Hrt., s. Neuheiten.			
T. 8.	<i>microphylla pendula</i> , Hrt., Kleinblättrige Trauer-R. M. 1 bis	3,50	9	—
44.	modiolina, Hrt., (Tortillard der Franzosen), in Frankreich vorzugs- weise als Alleebaum verwandt M. 1 bis	2,50	8	—
12.	montana, Bauh. (= scabra, Mill. = corylifolia, Hrt. = americana, Hrt. = fulva, Hrt.), Grossblättrige oder schottische R.	—,60	5	—
	" Hochstämme siehe Allee-bäume.			
71.	<i>montana atropurpurea</i> , s. Neuheiten.			
14.	montana crispa, Loud., Schottische krause R., eigenthümlich V. M. 1 bis	2,50	8	—
P. 15.	" <i>fastigiata</i> , Loud. (U. <i>eroniensis</i> , Hrt.), Schott. Pyramiden-R. 1—2½ m. hoch M. 1 bis	2,50	8—20	*
13.	" <i>fastigiata</i> Dampieri, Hrt., Dampiers Pyramiden-Rüster, sehr schön pyramidal M. 1 bis	2,—	9	—
b. 55.	" " Dampieri Wredei. S. Neuheiten.			
P. 43.	" " glabra, Hrt., Glatte Pyramiden-R. M. 1 bis	2,50	9	—
54.	" <i>macrophylla</i> , Chaillon et Trefoux, von den grossblättrigen die starkwüchsigste Neu! M. 1 bis	2,50	9	—
45.	" <i>monstrosa</i> , Hrt., mit breiten Zweigen	1,—	9	—
47.	" <i>nigra</i> , Hrt., Blätter gross und sehr dunkelgrün M. 1 bis	2,50	9	—
T. 19.	" <i>pendula</i> , Hrt., Aechte T.-R., Zweige senkrecht hängend M. 1 bis	6,—	8—50	*
48.	" <i>serpentina</i> , Hrt., Zweige spiralförmig gewunden, theils herab- hängend M. 1 bis	2,—	9	—
b. 57.	" <i>tricolor</i> , Hrt., Dreifarbige	1,—	9	—
9.	<i>monumentalis</i> , Rz., Kugelförmige Feld-R., sehr schön! M. 1 bis	2,—	9	—
24.	<i>Pitteursii</i> , Hrt., Pitteur's R., m. grossen rundlichen Blättern, II, III, starkwüchsig M. 1 bis	4,—	8—18	—
25.	<i>purpurea</i> , Hrt., Purpur-R., Blätter bräunlich II. M. 1 bis	2,—	8—18	—
10.	<i>rugosa</i> , Hrt., Korkige Hänge-R M. 1 bis	2,50	8	—
72.	<i>scabra lutescens</i> , Hrt., Blätter schön gelb gefärbt, neu! M. 1,25 bis	2,50	10	—
11.	<i>suberosa alata</i> , Hrt., Geflügelte Kork-R., Rinde sehr korkig III. Hlb. und Hochst. M. 2 bis	4,—	—	—
70.	<i>tiliaefolia</i> , Hrt. Berol., Laub hell mit metallischem Reflex	1,—	9	—
26.	<i>triserrata</i> , Hrt., hübsch grossblättrig M. 1 bis	2,25	8	—
27.	<i>vegeta</i> , Loud., Starkwüchsige R., (Huntingdon-R.), grossblättrig, H., ausserordentlich starkwüchsig M. 1 bis	6,—	8—20	*
Viburnum, L., Schneeball (Sehlinge).				
10.	<i>bullatum</i> , Hrt., Blasiger S., niedrig	—,75	—	—
2.	<i>edule</i> , Prsh. Essbarer? S., VI., ähnlich No. 4	—,30	—	—
3.	<i>Lantana</i> , L., Wolliger Schneeb., V., Blätter gross, graugrün	—,40	3½	*
12.	" fol. aureo-margin	—,75	—	—
4.	<i>Opulus</i> , L., Gemeiner S. (Wilder S.), Blumen u. rothe Früchtezierend, V	—,30	2	*
5.	" <i>roseum</i> , L., (V. Op. sterile. Hrt.), Gefüllter S.	—,40	3½	30
	" 1½—2 m hohe Stämme. M. 1 bis	1,75	9—15	*
16.	<i>pirifolium</i> , Prsh.? Birnblättriger S.	—,50	—	—
13.	<i>plicatum</i> , Miqu., (= tomentosum, Thnb.)	—,75	6	*
7.	<i>prunifolium</i> , L., Pflaumenblättriger S.; schön belaubt. VI.	—,60	—	—
Vinca, L., Stungrün, (Immergrün).				
4.	<i>intermedia</i> fol. albo var., Blätter etwas grösser als die der folgenden Sorten, weiss marmorirt und gerandet	—,25	2	*

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorräthig
	Vinca.			
6.	minor fol. alb. var., weissbunt	—,25	—	—
2.	" fl. albo, weissblühend	—,25	2	—
1.	" fl. azureo, himmelblau	—,25	2	—
5.	" fl. azureo pl., blau gefüllt	—,50	—	—
3.	" fl. purpureo, pl., purp., gefüllt	—,30	2 1/2	*
	Virgilia s. Cladrastis.			
	Vitex.			
1.	Agnus castus, L., S., Europa Orient. Keuschbaum, Mönchspfeffer	—,75	6	—
5	Vitis, L., Wein. (Rebe). fast alle folgenden Sorten halten an einer Wand unsere Winter gut aus und eignen sich vor- züglich zur Bekleidung von Landhäusern, Lauben etc. (Siehe ferner die amerikanischen Weine unter Obst)			
48.	cordifolia, Mchx., Herzblättr. W., grossblättrig	—,60	5	—
520.	humulifolia, Hrt., ähnlich Regeliana, in allen Dimensionen kleiner	—,60	—	—
* 280.	Labrusca, L., Fuchswein der nördl. Vereinigten Staaten, unterseits stark filzig; hart und starkwüchsig	—,60	5	—
* 276.	odoratissima, Donn., Wohlriechender W., trägt keine Trauben. Die sehr fein und stark riechenden Blüten werden zur Be- reitung von Weinbowlen hochgeschätzt	—,75	6	*
* 49.	palmata, Fahl, Handförmiger W.	—,75	—	—
* 519.	Regeliana, Hrt., Blätter m. bräunlichem Anflug, junges Holz behaart	—,60	5	—
523.	riparia, Mchx., Uferwein, ähnlich odoratissima	—,60	5	—
278.	rupestris, Hrt., ähnlich No. 275, mehr gezackt	—,60	—	—
	Weigela, Thunb. (Dieruilla Mill.), Weigelia. 10 Sort à 1 St. 5 M. sehr schön blühende Sträucher von 1—2 m. Höhe, manche Sorten oft 2mal blühend			
6.	amabilis, Carr. (coracensis, Thunb.), Liebliche W., rosa, (Wuchs kräftig)	—,40	3 1/2	*
7.	" alba, Hrt., weiss, im Verblühen blass-rosa	—,60	5	*
40.	arborea Ed. André, Hrt., gr-blumig, purp., innen sammetig braun, neu!	—,75	6	—
29.	Augusta, Hrt.,	—,50	4	*
8.	Desboisii, Hrt., rosa, kräftig, reichblühend	—,50	4	*
8.	Grönwegenii, Hrt., dunkel rosa, gedrungener Wuchs	—,60	5	*
32.	hortensis gigantiflora, Hrt., sehr grossblumig	—,75	6	—
38.	" gratissima, Hrt., hell rosa, reichblühend	—,75	6	—
24.	" rubra fol. aureo-marg., Hrt., hell-rosa, s. schön	—,75	—	—
36.	" Lavalley, Hrt., dunkelpurpur	—,75	6	—
42.	" Pécheur fils, violettes weinroth	—,75	6	—
11.	hybrida, weiss mit dunkelrosa, im Verblühen dunkel	—,50	4	*
14.	intermedia, fast weiss, vollblühend	—,50	4	*
33.	Isoline, e. Htte, weiss in rosa übergehend	—,60	5	*
43.	Looymansii, aurea, Hrt., mit goldgelben Blättern	—,75	—	—
15.	Madame Couturier, Hrt., gelblich weiss in rosa übergehend	—,50	4	*
31.	" Lemoine, Hrt., hellrosa, dunkler werdend	—,50	4	*
16.	Monsieur Dauvesse, Hrt., fleischfarbene rosa	—,50	4	*
18.	rosea, Lindl., Rosenfarbige W., rosa, gedrungener Wuchs	—,40	3 1/2	*
28.	" multiflora, Hrt.,	—,60	5	—
b. 39.	Sieboldii fol. arg.-marg., gelblich gerandet	—,75	—	—
19.	Stelznerii, Hrt., dunkelroth, remontirt gewöhnlich	—,50	4	*
20.	Van Houttei, Hrt., rosa, kräftig	—,50	4	*
34.	venosa, Hrt., dunkelrosa mit weiss gestreift	—,60	5	*
21.	Verschaffeltii, Hrt., rosa, kräftig	—,50	4	*
12.	versicolor, S. et. Z. (= japonica, Thunb.), rosa in dunkel übergehend	—,50	4	*
5	Wistaria, Nutt. (Glycine).			
1.	magnifica, H. gull., mit hellblauen Blüten M. 1 bis	1,25	10	—
2.	chinensis, Sims., Chinesische W., eine prachtvolle Schlingpflanze mit langen blauen Blüthentrauben im Frühjahr, erinnert an ge- schützten Stellen nicht M. 1,25 bis	2, —	—	—
6.	" fl. pl. Hrt., Neu!	2,50	—	—
	Xanthoxylum fraxineum, Eschenblättriges Gelbholz. Ein mit Stacheln besetzter, decorativer Strauch aus Nord-Amerika, winterhart	1,50	13	—
	Xylosteum s. Lonicera Xylosteum.			

Nadelhölzer.

B. Nadelhölzer (Coniferae).

Meine Coniferen sind sämtlich mehrmals verpflanzt und werden mit Ballen versendet, was ein gutes Anwachsen sichert.

No.	Abies, L., Tanne, Fichte, Abietaceae.			per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrätig
a) Tanne (Edel- oder Weisstanne) Picea, Don.						
2.	balsamea (Mchx.)	Balsamtanne, 0,75—3 m. h.	M. 1,— bis	6,—	—	—
10.	Fraseri (Pinus) Pursh., Frasers Edeltanne,	0,40—0,90 m. h.	M. 1,— bis	3,—	9—25	*
		2,50—4,— m. h.	" 8,— "	30,—	—	—
5.	Nordmanniana (Pin.) Stev., Nordmann's Edel-T., eine ausgezeich- nete harte Art aus dem Kaukasus, die an Schönheit keiner Conifere nachsteht,	0,30—0,50 m. h.	M. 1,25 bis	2,50	10—22	*
		0,50—0,70 m. h.	" 2,50 "	4,50	22—42	—
		0,75—2,— m. h.	" 5,— "	25,—	45—240	—
		2,25—3,— m. h.	" 30,— "	100,—	—	—
6.	pectinata, Loud., Edeltanne,	0,20—0,40 m. h.	" —,40 "	—,60	3½—5	*
		0,50—0,90 m. h.	" 1,25 "	2,50	—	—
7.	Pinsapo, Boiss., Spanische Edeltanne, 0,20—0,30 m. h.	" 1,50 "	" 1,50 "	2,50	—	—
b) Fichte, Abies, Don.						
23.	alba, Mchx., (Pinus laxa, Ehrh.) Weiss-F.	0,40—0,50 m. h.	" —,60 "	—,80	5,—	*
		0,60—1,— m. h.	" —,80 "	1,—	7—9	*
		1,25—2,— m. h.	" 1,25 "	2,50	10—22	*
		2,25—3,— m. h.	" 3,— "	6,—	25—55	*
31.	coerulea, Forb., Bläuliche F.,	0,30—0,50 m. h.	" —,80 "	1,50	7—12	*
		0,60—1,— m. h.	" 1,75 "	2,50	16—22	—
		1,25—2,— m. h.	" 2,75 "	5,—	25—45	—
18.	concolor, Lindl., 0,20—0,25 m. h.	" 5,— "	" 5,— "	6,—	45,—	—
		—,30—0,50 m. h.	" 7,— "	15,—	—	—
41.	Douglasii, Lindl., Douglas-T.,	0,25—0 50 m. h.	" 1,— "	2,50	—	—
		0,60—1,— m. h.	" 3,— "	5,—	—	—
		1,25—2,— m. h.	" 6,— "	20,—	—	—
29.	Engelmanni, Par., hart u. sehr schön, 0,20—0,40 m. h.	" 1,— "	" 1,— "	3,—	—	—
22.	excelsa (Pin.) Lam. (Pinus Abies L.) Gemeine F., Rothtanne, die schönste einheimischen Arten, mehrmals verpflanzte m. guten Ballen,	0,45—0,55 m. h.	" 0,30—40 "	2½	*	
		0,60—0,75 m. h.	" 0,50—70 "	5,—	*	
		0,80—0,90 m. h.	" 0,80—90 "	7,—	*	
		1,00—1,75 m. h.	M. 1,25 bis	2,—	10—18	*
		2,00—3,50 m. h.	" 2,50 "	5,—	20—40	—
28.	" inverta (pendula) Trauer-F. mit hängenden Zweigen,	0,35—1,25 m. h.	M. 2,— "	6,—	—	—
37.	" pyramidalis, Hrt., pyramidal,	0,30—0,50 m. h.	" 1,50 "	2,50	—	—
		0,60—1,25 m. h.	" 3,— "	5,—	—	—
56.	" Remontii, Hrt., hübsche neue Zwergtanne,	0,25—0,50 m. h.	" 3,— "	5,—	—	—
73.	" viminalis, Göpp., Schlangenfichte aus den Böhm. Waldgebirge,	0,30—0,60 m. h.	M. 2,— bis	5,—	—	—
3.	lasiocarpa, Lindl., sehr schöne californ. Art, 0,50—1 m. h.	" 7,— "	" 7,— "	25,—	—	—
26.	Menziesii, Loud., Menzies F. (nicht No. 70),	0,30—0,50 m. h.	" 0,50 "	—,75	—	—
		0,60—1,— m. h.	" 0,80 "	1,50	—	—
		1,25—2,— m. h.	" 2,— "	5,—	—	—

Nadelhölzer.

No.			per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
Abies.					
24.	nigra, Desf. (Mariana, Mill.), Schwarz-T., dunkelbelaubt, niedriger als „excelsa“, setzt früh schon Fruchtzapfen an,				
	0,40—0,70 m. h.	M. 0,60 bis	1,25	—	—
	0,75—1,25 m. h.	„ 1,50	2,—	—	—
	1,50—2,50 m. h.	„ 2,50	5,—	—	—
58.	obovata, Ledeb., 0,40—0,50 m. h.	„ 2,50	3,50	—	—
25.	orientalis (Pin.), L., Orientalische Fichte, Zweige dünn, dicht gestellt sehr hüsch, 0,50—1 m. h.	M. 1,50 bis	2,50	—	—
	1,25—1,75 m. h.	„ 3,—	5,—	—	—
63.	Parryana glauca, 0,40—0,75 m. h.	„ 5,—	10,—	—	—
21.	rubra, Poir., Rother F., 0,50—1,50 m. h.	„ —,90	3,—	—	—
c. Hemlockstanne, Tsuga, Endl.					
40.	canadensis, Mchx., Kanadische H.,				
	0,25—0,50 m. h.	M. 0,75 bis	1,50	—	—
	1—2 m. h.	„ 2,50	5,—	—	—
Biota, Don., Morgenländischer Lebensbaum, Cupressaceae.					
4.	orientalis compacta, Hrt., (Thuja orientalis nana Hrt.), grasgrün von gedrungenem Wuchse,				
	0,40—0,50 m. h.	M. 2,— bis	3,—	18—27	—
*8.	elegantissima, Hrt., schöne goldfarbige, pyramidal wachsende Varietät, 0,20—0,40 m. hoch	M. 1,50 bis	3,—	12—27	—
1.	Cephalotaxus, S. et Z., drupacea ca. 0,50 m. hoch		3,—	—	—
Chamaecyparis, Spach., Lebensbaum-Cypresse, Cupressaceae.					
61.	Chamaecyparis dubia (Carr.) 0,15—0,20 m.		1,—	9,—	—
62.	Chamaecyparis dubia glauca, Hrt., (= Retinospora glaucescens Hochst.) 0,15—0,20 m. h.		1,—	9,—	—
60.	„ ericoides (Carr.), 0,15—0,20 m. hoch		1,50	13,—	—
1.	Lawsoniana, Parl., (Cupressus Lawsoniana, Mur.) Lawsons				
	Cypresse 0,30—0,50 m. h.	M. —,50 bis	1,—	4—9	—
	0,60—1 m. h.	„ 1,25	2,—	10—18	—
19.	„ argentea 0,40—0,80 m. h.	„ 2,—	6,—	—	—
22.	„ elegantissima, Hrt.,				
	0,20—0,50 m. h.	M. 1,25 bis	2,50	—	—
3.	„ erecta, Hrt., aufrechtstehende Varietät, eine der schönsten, 0,30—0,60 m. h.	M. 1,50 bis	3,—	12—28	—
35.	„ Fraseri, Hrt., neue hübsche Varietät, 3—4 j. V., 0,20—0,50 m. h.	M. 1,50 bis	3,—	18—28	—
36.	„ glauca, Hrt., schön blaugrün, 3—4 j. V., 0,25—0,75 m. h.	„ 2,—	4,—	16—38	—
23.	„ lutescens, Hrt., schön gelb gefärbt, 2—3 j. V., 0,20—0,30 m. h.	„ 1,50	2,—	12—18	—
55.	„ pyramidalis alba, 0,20—30 m. hoch	„ 1,50	2,50	12—22	—
28.	„ stricta coerulea, 0,40—0,50 m. h.	„ 2,50	3,50	—	—
24.	„ „ viridis, 0,35—0,60 m. h.	„ 3,—	5,—	27—45	—
8.	Nutkaensis, Spach., Nutka Cypresse (Thujopsis dolobrata),				
	0,30—0,60 m. h.	„ 1,—	2,50	9—22	—
	1,25—1,50 m. h.	„ 4,—	5,—	—	—
29.	„ compacta, sehr gedrängter Wuchs, 0,40—0,50 m. h.	„ 3,—	4,—	—	—
21.	„ fol. varieg., Hrt., bunte, Nutka-Cypr., 0,20—0,50 m. h.	„ 1,—	2,50	9—23	—
9.	„ glauca, Hrt., schön blaugrün, 0,30—0,60 m. h., 3—4 j. Veredl.	„ 2,—	4,—	19—38	*
	0,60—1,— m. h.	„ 5,—	8,—	—	—
11.	pisifera, S. et Z., Erbsenfrüchtige Cypresse, schön und hart, 0,25—0,75 m. h.	M. 1,—	2 1/2	8—22	*
	0,80—1,50 m. h.	„ 3,—	5,—	28—45	*
12.	„ aurea, Hrt., acht! Goldgelbe Varietät der C. pisifera, 0,20—0,40 m. h.	M. 2,—	4,—	18—37	—
44.	„ filifera, Hrt., fadenförmige hängende Zweige, 0,20—0,50 m. h.	„ 1,—	2,—	—	—
	0,80—1,— m. h.	„ 5,—	10,—	—	—

Nadelhölzer.

No.		per Stück M.	in Stück M.	hundert- weise verrätlich
Chamaecyparis.				
13.	<i>pisifera</i> <i>plumosa</i> , <i>Feitch.</i> , (<i>Retinospora pisifera plumosa</i>), schöne Pfl., 0,20—0,40 m. h. " 1, — "	2 1/2	8—22	*
	0,75—1, — m. h. " 4, — "	8, —	—	—
18.	" " <i>aurea</i> , gelbbunte, reizende Varietät, 0,30—0,50 m. h. " 1,50 "	3, —	—	—
	0,60—0,80 m. h. " 3,50 "	5, —	—	—
15.	<i>squarrosa</i> , Nadelbl., <i>Cypr.</i> , 0,20—0,40 m. h. " 0,75 "	1,50	—	—
Ephedra, L., Meerträubel. Gnetaceae.				
1.	<i>vulgaris</i> , <i>Rich.</i> (= <i>E. distachya</i> und <i>monostachya</i> , <i>L.</i> , Gemeines Meer- träubel, strauchartig, 0,40—0,50 m. h. M. 1,50 bis	2, —	—	—
Ginkgo, L., Ginkgo (Salisburia) Taxaceae.				
1.	<i>biloba</i> , <i>L.</i> , Zweilappiger G., 0,40—0,60 m. h. " 1, — "	2, —	8—18	—
	1,25—1,50 m. h. " 3, — "	5, —	—	—
Juniperus, L., Wachholder, Sadebaum, Cupressaceae.				
1.	<i>Bermudiana</i> , <i>L.</i> , Bermuda's-W., 0,50—0,80 m. h. M. 0,75 "	1,50	—	—
11.	<i>chinensis</i> , <i>L.</i> , chinesischer Sadeb., 0,25—0,75 m. h. " 1, — "	2,50	—	—
13.	" <i>mascula</i> , <i>Hrt.</i> , 0,30—0,60 m. h. " 1, — "	2 1/2	—	—
2.	<i>communis</i> , <i>L.</i> , Gemeiner W., 0,20—0,75 m. h. " 0,40 "	2, —	—	—
12.	" <i>hibernica</i> , 1,00—1,50 m. h. " 4, — "	7, —	37—65	—
24.	<i>japonica</i> , <i>Carr.</i> , dicht bezweigter, horizontal wachsend Strauch, schöne Pflanzen, 0,20—0,50 m. h. M. 1,50 bis	3, —	—	—
23.	<i>prostrata</i> , <i>Pers.</i> , niederliegender, W., 0,30 m. h. 1,75 "	4, —	15—37	—
5.	<i>Sabina</i> , <i>L.</i> , Gemeiner Sadeb., 0,5—1 m. breite schöne Pflanzen, M. 0,75 bis	4, —	6—37	*
10.	" <i>fol. var.</i> , <i>Loud.</i> , hübsche bunte Varietät, 0,20—0,40 m. h. 1,50 "	4, —	—	—
3.	" <i>tamariscifolia</i> , <i>Hrt.</i> , feiner und blaugrüner als <i>Sabina</i> , 0,30—1, — breit M. 1, — bis	3, —	9—28	—
6.	<i>virginiana</i> , <i>L.</i> , Virginischer Sadeb. (Rothe Ceder), 0,30—0,50 m. h. " 0,40 "	— 30	3—5	—
	0,60—0,90 m. h. " 0,75 "	1, —	6—9	—
	schöne Pyramiden, 1—3 m. h. " 1,25 "	6, —	10—50	—
9.	" <i>glauca</i> , <i>Hrt.</i> , hübsch blaugrün, 0,25—0,60 m. h. " 1, — "	2 1/2	—	—
26.	" <i>pendula</i> , <i>viridis</i> , <i>Hrt.</i> , lebhaft grün, von hängendem Wuchse, 0,50—1,25 m. h. M. 2, — bis	5, —	—	—
16.	" <i>Schottii</i> , <i>Hrt.</i> , 0,30—0,75 m. h. " 1, — "	3, —	9—28	—
8.	" <i>tripartita</i> , <i>Hrt.</i> (<i>Sab. var. repens</i> <i>Nutt.</i>); hellgrüne Belaubung, 0,25—1, — m. h. " 1, — "	3,50	—	—
Larix, L., Laerche; Abietaceae				
Bäume mit abfallenden Nadeln und kleinen aufrechten Zapfen.				
2.	<i>europaea</i> , <i>D. C.</i> (<i>L. decidua</i> , <i>Mill.</i>) Gemeine Laerche; schöne hohe Pflanzen, 1 1/2—5 1/2 m. h. M. 1, — bis	6, —	9—50	—
9.	<i>glauca pendula</i> , 0,40—0,75 m. h. " 4, — "	8, —	30—70	—
5.	<i>microcarpa</i> , <i>Wob.</i> , Kleinfrüchtige canad. L., 0,40—0,50 m. h. " 2, — "	— 75	6, —	—
6.	<i>Pseudo-Larix Kaempferi</i> , <i>Fort.</i> , Chinesische Laerche 0,30—0,75 m. h. M. 4, — "	8, —	18—40	—
Libocedrus, Torr. Cupressaceae				
1.	<i>decurrens</i> , <i>Forr.</i> (<i>Thuja gigant. Hort non Nutt.</i> ; <i>Heyderia decurrens</i> <i>Koch</i>) Kalifornischer L., 0,30—0,60 m. h. M. 1, — bis	2, —	9—18	*
	0,75—1,50 m. h. " 2,50 "	5, —	20—45	*
Pinus, L., Kiefer (Foehre) Abietaceae				
1.	<i>austriaca</i> , <i>Hoss.</i> , Oestreichische K. (Schwarzföhre), 0,75—1, — m. h. " 1, — "	2, —	9—18	—
	1,25—2,50 m. h. " 2,50 "	4, —	20—35	—
15.	<i>calabrica</i> , <i>Hrt.</i> (<i>P. corsicana</i> <i>Hrt.</i>) 0,25—1 m. hoch " 1, — "	3 1/2	9—30	—
2.	<i>Cembra</i> , <i>L.</i> , Zübel K. (Arve) sehr kraus und schön 0,50—0,45 m. h. " 0,75 "	1,25	7—11	—
	0,50—0,75 m. h. " 1,50 "	4, —	13—35	—
25.	<i>Jefreyi</i> , <i>Murr.</i> , Kalifornien, schön blaugrün gefärbt, 0,20—0,30 m. h. " 2, — "	3, —	18—28	—

Nadelhölzer.

Nr.			per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise verrätig
Pinus.					
10.	Laricio (-Pin. Pinaster <i>Pin.</i>), <i>Poir.</i> , Corsische Schwarzkiefer,				
	0,40—0,75 m. h.	M. 2,—	3,—	—	—
26.	Massoniana, <i>S. et Z.</i> (China und Japan 0,20—0,50 m. h.)	" 2,—	5,—	18—45	—
4.	montana, <i>Mill.</i> (Pinus Mughus <i>Seep.</i>) Knieholz-Kiefer				
	0,30—0,50 m. h.	" 0,75	1,75	6—15	*
	0,60—1,— m. h.	" 2,25	4,—	20—37	*
16.	Pallasiana, <i>Lamb.</i> (P. pontica <i>C. Koch.</i>), 0,50—0,75 m. h.	" 2,—	2 1/2	—	—
	0,80—1,25 m. h.	" 3,—	6,—	—	—
6.	Strobus, <i>L.</i> Weymouth-K. hoher Baum mit langen dünnen, blaugrünen				
	Nadeln, 0,50—0,75 m. h.	" 0,80	1,—	7—9	—
	1,00—2,— m. h.	" 1,25	2,—	10—18	—
	3,00—4,— m. h.	" 3,—	5,—	27—47	—
3.	excelsa, <i>Wall.</i> , Nepals Weymouthskiefer (Pinus Strobus excelsa <i>Hrt.</i>)				
	sehr hübsch blaugrün und feinnadlig				
	0,30—0,60 m. h.	M. 1,50 bis	2 1/2	—	—
	0,70—1,— m. h.	M. 3,—	4,—	—	—
Retinospora siehe Chamaecyparis und Thuja.					
Taxus L. Eibe; Taxaceae.					
1.	adpressa, <i>Gord.</i> ; Japan 0,20—0,40 m. h.	M. 1,50	2 1/2	—	—
	0,60—0,75 m. h.	" 3,50	5,—	—	—
2.	baccata, <i>L.</i> , Gemeine Eibe 0,40—0,60 m. h.	" 0,75	1,—	6—9	*
	0,65—0,90 m. h.	" 1,25	2,—	10—18	*
	Schöne Pyramiden 1,00 2,— m. h.	" 3,—	12,—	27—100	*
b. 3.	elegantissima, <i>Hrt.</i> , Gelbbunte E. 0,20—0,50 m. h.	" 1,25	3,50	10—32	—
4.	erecta, <i>Hrt.</i> , Aufrechte E. 0,20—0,50 m. h.	" 0,75	3,—	6—28	*
	0,60—1,— m. h.	" 3,50	5,—	—	—
b. 22.	fol. alb. varieg. siehe Neuheiten				
13.	gracilis pendula, m. zierlich hängenden Zweigen,				
	0,30—0,50 m. h.	" 3,—	5,—	—	—
5.	hibernica, <i>Hook.</i> , (Tax. baccata fastigiata). Irländische Eibe,				
	0,20—0,60 m. h.	M. 2,— bis	4,—	—	—
	0,75—2,— m. h.	" 5,—	25,—	—	—
7.	fol. var. <i>Hrt.</i> 0,20—0,30 m. h.	" 1,50	2,50	—	—
23.	pyramidalis 0,40—0,60 m. h.	" 1,—	2,—	9—18	—
	0,75—1 m. h.	" 2,50	3,50	—	—
10.	Washingtoni, <i>Hrt.</i> , Washingtons E. 0,20—0,50 m. h.	" 1,50	2 1/2	12—22	—
8.	canadensis, <i>Willd.</i> , Canadische E. 0,40—0,60 m. h.	M. 1,50	2,—	—	—
6.	aurea <i>Hrt.</i> gelbbunt, 0,20—0,50 m. h.	" 1,—	3,—	9—27	—
b. 9.	Dovastonii, <i>Loud.</i> , dunkelgrün, 0,20—0,40 m. h.	" 1,25	1,75	10—15	*
	0,50—0,75 m. h.	" 2,—	3,—	18—27	—
Thuja L., Lebensbaum (Abendländischer L.) Cupressaceae					
21.	gigantea glauca <i>Hrt.</i> , Riesiger L. mit graugrüner Belaubung				
	siehe Libocedrus.				
6.	Menziesii, <i>Dougl.</i> (-Lobbi <i>Hrt.</i>) 0,50—1,— m. h.	" 1,25 bis	3,—	10—27	—
11.	plicata, <i>Don.</i> , Breitzweigiger L. aus Nordamerika				
	0,20—0,40 m. h.	" 1,— bis	2,—	9—18	*
7.	occidentalis L., Abendländischer L., 0,60—0,90 m. h.	" 0,60	1,—	5—9	*
	1,00—3,— m. h. schöne volle Pyramiden	" 1,50	8,—	13—75	—
17.	argenta, <i>Hrt.</i> 0,30—0,75 m. h.	" 1,25	2,50	10—22	—
18.	Boothii <i>Hrt.</i> 0,20—0,50 m. h.	" 1,25	2,—	10—18	—
	0,60—1,— m. h.	" 2,50	5,—	—	—
14.	cancasica, <i>Hort.</i> , kaukasischer L. (sibirica <i>Hrt.</i>)				
	0,30—0,80 m. h.	" 0,75	2,50	5—22	—
15.	cristata, <i>Hrt.</i> , kammförmig sehr hübsch				
	0,20—0,75 m. h.	" 0,75	1,75	—	—
	1,00—1,75 m. h.	" 2,—	4,—	—	—
2.	Ellwangeriana, <i>Hort.</i> , (Th.-Tom-Pouce <i>Hrt.</i>) schöne breite				
	Pflanzen 0,20—0,50 m. h.	" 0,75	1 1/2	6—12	*
	0,60—1,— m. h.	" 2,—	4,—	18—37	—
19.	globosa, <i>Hrt.</i> , von gedrängtem kugelrundem Wuchse,				
	0,40—0,75 cm. h.	M. 1,50 bis	3,—	13—27	—
4.	Hoveyi, <i>Hrt.</i> , Zweige breit u. gedrängt,				
	0,50—0,75 m. h.	" 1,50	3,—	13—27	—

Nadelhölzer. Gehölze für Parkanlagen. Alleebäume

No.			per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorrätig
Thuja.					
8.	<i>occidentalis</i> pendula, Hrt., 0,20—0,50 m. h.	1,—	2,—	9—18	—
28.	„ <i>recurvata</i> , Hrt., 0,30—0,40 m. h.	1,25	1,50	10—12	—
16.	„ <i>Standishii</i> , Carr. (<i>Thujopsis</i> <i>Standishii</i> <i>Gertl.</i>), 0,20—0,40 m. h.	1,—	4,—	—	—
9.	„ <i>Vervaeana</i> , Belaubung gelbl. grün, 0,20—0,40 m. h.	1,—	1,25	9—10	—
	„ „ 0,50—1,— m. h.	1,50	3,—	—	—
10.	„ <i>Wareana</i> , der härteste aller Lebensbäume, von ge- drungenem Wuchse, 0,25—0,50 m. h.	0,75	1,—	6—9	*
	„ „ 0,60—1,— m. h.	1,25	2 1/2	—	—
	„ „ 1,25—2,— m. h., ganz starke Pyramiden	4,—	8,—	37—75	—
Thujopsis.					
1.	<i>dolabrata</i> , S. et Z., Japanischer L., 0,20—0,50 m. h.	1,—	2 1/2	9—22	*
	„ „ 0,60—0,80 m. h.	3,—	7,—	—	—
2.	„ <i>fol. var.</i> , 0,20—0,30 m. h.	2,—	3,—	—	—

Gehölze für Parkanlagen.

Nach meiner Wahl.

	M.
100 Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten, 0,50—1,50 m. h.	6—12
100 Gewöhnliche Vorsträucher in 10—15 Sorten mit Namen, 0,50—1,50 m. h.	15—20
100 Feinere Vorsträucher in 15—20 Sorten, mit Namen	25—40
100 Gewöhnliche Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3 m. h.	30
100 Besonders starke oder feine Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3 m. h.	40—50
100 Schönblühende Ziersträucher in allen Grössen (zur Anlage kleiner Gärten) in etwa 15—20 Sorten mit Namen, je nach der Güte	25—50
100 „ und schönblättrige Ziersträucher in 100 Sorten	45
100 „ Ziersträucher in 50 Sorten	40
50 „ „ 25 „	20
100 Schmuckbäume (Solitäräume) in 50 Sorten, kräftige Hoch-, Halbstämme und Pyramiden	M. 100 bis 150
50 „ in 25 Sorten und kräftigen Exemplaren	M. 10 bis 75
100 Gewöhnliche und harte Coniferen zu Gruppen	75

Starke Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks sind zu Hunderttausenden vorrätig. Bei Abnahme von grösseren Posten treten Preisermässigungen ein.

Alleebäume.

Unter 25 Stück werden zum Hundertpreise nicht abgegeben.

Der Stammumfang ist 1 Meter über der Erde gemessen.

8 cm. Umfang ungefähr = 1 Zoll Durchmesser, 12 cm. Umfang ungefähr = 1 1/4", 16 cm. Umfang
ungefähr = 2" Durchmesser u. s. w.

	Stamm- umfang etw.	per 1 Stück M.	per 100 Stück M.
Ahorn, Amerikan. Silber.		7—9	1,10
Acer dasycarpum.		10—12	1,75
„ „		13—15	2,50
„ „			22,5

Alleebäume.

			Stamm- umfang cm	per 1 Stück M.	per 100 Stück M.
Ahorn Kalifornischer (eschenblättr.)	californicum		7-9	1.—	80
"	"	"	10-12	1.50	120
"	"	"	13-15	2.25	200
Sehr schöner, hellgrün belaubter und ausserordentlich starkwüchsiger Baum, der selbst noch auf geringem Sandboden recht gut gedeiht. Er verdient nicht nur als Alleebaum, sondern auch als Waldbaum die häufigste Anpflanzung.					
Ahorn, Eschenblättriger, Violetter.	Acer Negundo violaceum.		7-9	1.—	80
"	"	"	10-12	1.50	120
"	"	"	13-15	2.25	200
Diese Varietät, von der alles über den Kalifornischen Ahorn Gesagte gilt, zeichnet sich vor letzterem durch noch üppigeres Wachstum aus.					
Ahorn, Eschenblättriger, Weiss-	Acer Negundo fol. argenteo-var. m.				
bunter.	starken Kronen M. 1.25 bis		—	2.50	100-200
Per 1000 Stück M. 1000—1570.					
" Spitzblättriger	platanoides		7-9	1.10	90
"	"	"	10-12	1.75	150
"	"	"	13-16	2-2 ³ / ₄	—
Schwedler's Blut-	Schwedlerii		7-9	1.50	130
"	"	"	10-12	2.—	180
Per 1000 Stück M. 1200—1700.					
" Weiss-	Pseudoplatanus		7-9	1.10	90
"	"	"	10-12	1.75	150
"	"	"	13-18	2-3 ¹ / ₂	—
" Purpurbältriger	fol. purpureis		7-9	1.50	130
"	"	"	10-12	2.—	180
"	"	"	13-15	2.75	—
"	"	"	16-18	3.50	—
diverse veredelte Sorten					
"	"	"	—	2-2 ¹ / ₂	—
Akazie, Gemeine	Robinia Pseudacacia		13-15	1.75	—
"	"	"	16-20	2.25	—
" Kugel-	inermis		—	1 ³ / ₄ - 3	—
Birke, Gemeine Weiss-	Betula alba		8-10	—80	70
"	"	"	11-13	1.—	90
"	"	"	14-16	1 ¹ / ₂ - 1 ³ / ₄	125
" Purpurbältrige	" purpurea		—	1 ¹ / ₂ - 3	110-270
Eberesche, Gemeine	Sorbus aucuparia		7-9	1.—	80
"	"	"	10-12	1.50	125
"	"	"	13-15	2.—	—
" Bastard	hybrida		7-9	1.50	—
"	"	"	10-12	2.—	—
" Mehlbirne.	Aria		9-12	2.—	—
Eiche, Sommer- oder Stiel-	Quercus Robur (pedunculata).		7-9	1.—	90
"	"	"	10-12	1.50	130
"	"	"	13-15	2.25	—
"	"	"	16-18	2.75	—
"	"	"	19-24	3-4	—
Erlc, Roth-	Alnus glutinosa		8-10	—75	—
"	"	"	11-13	1.10	—
"	"	"	14-20	1 ¹ / ₂ - 2	—
"	"	"	21-34	2 ¹ / ₄ - 3	—
" Weiss-	incana		12-14	1.10	—
"	"	"	20-30	2 ¹ / ₄	—
"	"	"	30-40	3.—	—
Esche, Gemeine	Fraxinus , excelsior		7-9	—80	70
Per 1000 Stück M. 600.					
" Amerikanische weisse grblättr.	alba (pubescens)		10-12	1.20	100
"	"	"	13-15	1.80	160
"	"	"	16-19	2 ¹ / ₄ - 3	220
"	"	"	20-27	4-6	—
" Kugel-	polemonifolia		7-11	2.—	180
Sehr schön für nördliches Klima, als Ersatz für Kugelakazie.					
" Mandschurische	mandschurica		7-9	1.25	—
"	"	"	10-12	1.50	—

Alleebäume. Trauerbäume.

		Stamm- umfang ctm.	per 1 Stück M.	per 100 Stück M.
Rüster, Feld-	Ulmus campestris	20-35	3-9	—
Kugel-	umbraculifera	12-15	3-5	210-350
		16-19	6-8	—
Dreispitzige	triserrata	8-11	2.25	—
Flatter	effusa	7-9	1.—	80
		10-12	1.75	140
		13-16	2-2½	—
pr. 1000 St. 700 M. Die beste Rüster für armen Boden, zugleich die schönste in Bezug auf Kronenbildung.				
Grossblättrig	Ulmus montana (scabra)	7-9	1.—	80
		10-12	1.75	150
		13-20	2-3	—
	macrophylla	7-9	1.75	—
		10-15	2-3	—
Pitteurs	Pitteursii (veredelt)	9-10	2.—	—
		11-13	2.50	—
Huntingdon	vegeta (vered.) s. starkw. u. schön	7-9	2.—	150
		10-12	2.75	250
		13-15	3.—	—
diverse andere veredelte Sorten				
Wallnuss, Schwarze amerikan.	Juglans nigra	7-9	1.25	100
		10-12	2.—	150
		13-15	2½-4½	—
		20-30	5-8	—

Trauerbäume.

		per Stück M.	10 Stück M	hundert- weise vorräthig
Acer dasycarpum pendulum , siehe <i>Neuheiten</i> .				
Betula , tristis , Hänge- Birke	Hochst. M. 1.75 bis	2.50	15-22	—
" laciniata , Geschlitzblättr. B.	Hochst. M. 1.75 bis	2.50	16-23	—
" pendula elegans Youngii ,	niedrig und hochst. M. 0.75 bis	3.—	7-18	—
Caragana arborescens pendula , Gewöhnliche Trauer- Karagane , bis über 2 m. hohe sehr schöne	Hochst. M. 1.75 bis	2.50	18-22	150
" schwächere	M. 1.25 bis	1.50	11-13	100
" Chamlagu , Chinesische Tr.-K.	Hochst.	1.50	13	—
" pygmaea arenaria (gracilis) , Feinzweigige Tr.-K.	Hochst. M. 1.25 bis	2.—	10-18	—
Carpinus Betulus pendula , Trauer- Hainbuche , niedr. und Hochst. M. 1.— bis		2.—	9-18	—
Crataegus Oxyacantha pendula , Trauerdorn	Hochst.	1.50	13	—
" Oxyacantha pendula fl. rosea , Rosa blühender Trauerdorn	Hochst.	1.50	13	—
" salicifolia , mit schirmförmiger Krone	Hochst.	1.50	—	—
Fagus sylvatica pendula , Trauer-Rothbuche	schöne Hochst.	5.—	—	—
Fraxinus excelsior pendula , Trauer-Esche	M. 1.50 bis	2.—	13-18	120
" lentiscifolia pendula , ganz stark	M. 2.50 bis	4.—	22-35	200
" lentiscifolia pendula , Feinblättrige schöne Trauer-E.	2.50 bis	4.—	—	—
Ligustrum vulgare pendulum	Hochst.	1.50	—	—
Pirus floribunda , Rothblühender Pracht- Apfel		1.50	13	—
" prunifolia pendula ,	M. 1.50 bis	2.—	13-18	—
" salicifolia pendula , <i>Hochst.</i>		1.50	13	—
Planera repens , <i>Hrt.</i> , Kriechende Planere		2.—	18	—
Prunus Avium pendula , Trauer-Herz- Kirsche	starke Hochst.	1.75	15	—
" fruticosa pendula , Hängende Zwergweichsel, starke Hochst. M. 1.75 bis		2.25	15	—
" Cerasus semperiflorens , Allerheiligenkirsche, starke Hochst. M. 1.75 bis		2.25	15	—
" virginiana pendula , Hängende virginische Traubenkirsche	Hochst.	2.—	15	—
Quercus pedunculata pendula Danvessel / Trauer- Eiche , schöne Hochst.				
" nova	M. 2.50 bis	4.—	20-35	—
Rosa scandens , Trauer- Rose , diverse Sorten	Hochst. M. 2.50 bis	4.—	—	—
Salix purpurea pendula (nigra pendula)				
" caprea pendula	{ Trauer- Weide	M. 1.50 bis	2.50	13-20
" rigida				
Sophora japonica pendula		4.—	—	—
Sorbus aucuparia pendula Trauer- Eberesche	M. 1.50 bis	3.—	18-22	—
" fol. var.	1.50	2.50	—	—

Trauerbäume. Schlingsträucher. Gehölze zu Hecken und Lauben.

		per Stück M.	10 Stück M.	hundert- weise vorhandig
Tilia alba petiolaris, Trauer-Silber-Linde; schöne Stämme . . .	M. 2,50 bis	8,—	22—60	*
Ulmus horizontalis, Wagerechte Trauer-Rüster, mit flacher schirmförmiger Krone . . .	M. 2,50 bis	5,—	—	—
" montana pendula, Trauer-Rüster, sehr schöne Stämme . . .	" 1,50 "	6,—	18—50	*
" microphylla pendula	" 2,— "	3,50	—	—

Schlingsträucher.

Actinidia polygama		1,—	9	*
Akebia quinata		—,75	6½	*
Ampelopsis quinquefolia, Wilder Wein extra stark 2—3 Meter lang 5—7 Ranken		—,75	6	*
" quinquefolia, stark über 1½ m. lang		—,50	4	*
" " schwächere ca 1 m. lang		—,30	2½	*
" hirsuta, Grossblättr. wilder Wein	M. 0,40 bis	—,75	5—6	*
" hederacea, Aechter Kletter		—,60	5	*
Aristolochia Sipho	M. 1,— bis	2,—	9—18	*
Celastrus scandens, Baummörder, stark		1,—	9	80
Clematis graveons, hellgelb, starkwüchsig		1,—	9	80
" orientalis, L. Morgenländische Waldrebe, Blüht von Juli—Sept. gelb, oft rötlich, feine blau-grüne Belaubung, sehr starkwüchsig		1,—	9	—
" Vitalba, Weisse Waldrebe		—,60	5	—
" Viticella, Blaue	M. 0,50 bis	—,75	4—6	*
" grossblumige im Rummel stark		1,—	9	—
Die einzelnen Sorten siehe im Sortiment der Ziergehölze Seite 59.				
Lonicera Caprifolium, mehrere Sorten (siehe Sortiment)	M. 0,60 bis	1,—	5—9	*
Menispermum canadense, Kanadischer Mondsame		—,60	5	—
Periploca graeca, Griechische Schlinge		—,50	4	—
Rosa (siehe die Kletterrosen im Sortiment)	M. 0,50 bis	—,75	4½—7	*
Rubus parvifolius, Rothfrucht, Brombeere		—,50	4	—
" fruticosus fl. albo pl. Gefüllte weisse		—,50	4	—
Tecoma radicans (Bignonia)		—,60	5	—
Vitis odoratissima, Clinton u. andere amerikanische Sorten (siehe Sortiment)		—,75	6	*
Wistaria chinensis, Glycine	M. 1,25 bis	2,—	11—18	—

Gehölze zu Hecken und Lauben.

		Alter.	Höhe in Metern.	per 1 m St. M.	1000 St. M.	10000 St. M.
Berberis aquifolium	Mahonie, z. Anlage feiner niedriger immergrüner Zierhecken zu empfehlen	1	—	2,50	20	150
" "	" "	2	—	3,50	30	—
Berberis vulgaris	Berberitze gemeine	1	0,10—0,15	1,—	8	—
" "	" "	2	0,20—0,35	2,—	—	—
" "	" "	3	0,40—0,55	3,—	—	—
" "	" "	4	0,60—0,80	6,—	—	—
" "	atropurpureum	1	—	1,50	13	110
" "	Sowohl für Schutz- als auch für Zierhecken sehr geeignet.	2	—	3,—	25	—
" "	" "	3	—	4,50	40	—
" "	" "	4	—	7,—	—	—
Buxus suffruticosa, zu niedrigen Einfassungen, per laufendes Meter		—	—	—,75	—	—
" "	per 100	—	—	60,—	—	—
Caragana arborescens	Karagane	2	0,75—1,00	4,—	—	—
Carpinus Betulus	Weissbuche (Hainbuche)	1	0,15—0,25	1,—	7	60
" "	" " verpfl.	2	0,30—0,50	2,50	20	180
" "	" " " "	3	0,60—0,80	3,—	25	200
" "	" " " "	4	0,90—1,20	3,50	30	250
Cornus mascula	Kornelkirsche	1	0,15—0,30	3,—	27	—
" "	" " verpfl.	2	0,50—0,75	4,50	40	—
" "	" " " "	3	0,90—1,25	6,—	—	—

Gehölze zu Hecken und Lauben. Obstwildlinge zum Veredeln.

	Alter	Höhe in Metern	per 100 St. M.	1000 St. M	10000 St. M.
Crataegus Oxyacantha, Weissdorn					
Vorrath 500,000 Stück.					
III. Qualität, ca. 8—11 mm. Umfang über der Wurzel	—	—	1,—	6	55
II. „ 15—20 „ „ „ „ „ verpfl.	—	—	1,50	18	120
I. „ 21—30 „ „ „ „ „ „	—	—	2,—	18	160
Cydonia japonica.	Quitte, japanische	1	0.15—0.25	5,—	45 —
„ „ „ „ „ „	„ „	2	0.30—0.40	7.50	67 —
„ „ „ „ „ „	„ buschige Sträucher	—	0.30—0.50	30,—	250 —
„ „ „ „ „ „	„ „	—	0.60—0.95	45,—	400 —
„ vulgaris „ „ „ „ „	gewöhnliche „ Steckl.	1	0.40—0.60	4,—	35 —
„ „ „ „ „ „	„ buschige Sträucher	—	0.60—0.90	15,—	120 —
Gleditschia triacanthos	Gleditschie, für hohe Hecken				
	mehr zu empfehlen als Akazien,				
	da sie weniger durch Fröste leiden	—	—	—	—
„ „ „ „ „ „	verpfl.	2	0.40—0.70	2,—	15 —
„ „ „ „ „ „	„	3	0.80—1.00	3,—	20 —
„ „ „ „ „ „	„	4	1.10—1.75	4,—	30 —
Ligustrum vulgare	Liguster „ Steckl.	1	0.20—0.30	2.50	22 200
„ „ „ „ „ „	verpfl.	2	0.35—0.50	4,—	35 —
„ „ „ „ „ „	„	3	0.60—0.80	6,—	55 —
Robinia Pseudacacia	Akazie II. Qual	1	0.15—0.30	—50	2 18
„ „ „ „ „ „	I. „	1	0.40—0.60	1,—	6 50
„ „ „ „ „ „	verpfl.	2	0.75—1.25	1.50	9 —
Spiraea, diverse Sorten	(zu Zierhecken) buschige Sträucher	—	0.60—1.50	12,—	100 —
Symphoricarpus racemosus	Schneebeere „ Steckl.	1	0.40—0.60	4,—	— —
„ „ „ „ „ „	„	—	1.00—1.25	15,—	120 —
Syringa vulgaris	Flieder, gemeiner	1	—	2,—	18 150
Ulmus campestris u. effusa	Rüster (zu Lauben)	—	1.50—2.50	30,—	— —

Obstwildlinge zum Veredeln.

- I. Qualität sogleich veredlungsfähig (Copulirstärke).
- II. „ im nächsten Sommer veredlungsfähig.
- III. „ zum Verpflanzen.

Apfelwildlinge, Vorrath ca. 1½ Million		verpflanzte	I. Qual.	3,50	30	280
"	"	"	II.	2,50	20	180
"	"	"	III.	1.—	7	60
Birnwildlinge		"	I.	6.—	55	500
"	"	"	II.	4.—	35	310
"	"	"	III.	1,20	10	90
Kirschen, Süß-		"	I.	4,50	40	350
"	"	"	II.	3.—	25	200
"	"	"	III.	1,20	10	90
"	Sauer-	"	I.	4,50	40	—
"	"	"	"	—	—	—
"	Weichsel- (Mahaleb)	"	I.	2,50	22	200
"	"	"	II.	2,50	22	200
Pflaumen, Damascener und St. Julien		"	I.	7.—	60	—
"	"	"	II.	5.—	45	400
"	Mirobalanen (Kirschpfl., Pr. cerasifera, Pr. divaricata)	"	I.	2,50	20	180
"	sehr gute Unterlage für Aprikosen und für Pflaumen.					
"	(Kirschpfl.	"	II.	2.—	15	130
"	Schlehen (Pr. spinosa)	"	I.	3,50	30	—
"	"	"	II.	2.—	17	—

Obstwildlinge zum Veredeln. Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

		Preis pro		
		100 M.	1000 M.	10000 M.
Pflaumen.	Zwetschen (<i>Prun. domestica</i>)	3.50	30	270
"	"	2.—	17	150
"	"	1.—	8	70
Johannisapfel	oder <i>Paradies-</i>	7.50	—	—
Splittapfel	oder <i>Doucin</i>	6.—	50	—
Quitten	"	6.—	50	—
"	"	4.—	35	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

Alle Sämlinge sind in Folge der für diese Cultur ganz besonders günstigen Bodenverhältnisse vorzüglich gut bewurzelt und verhältnissmässig sehr stark.

Zum Hundertpreise werden nicht unter 25 Stück, zum Tausendpreise nicht unter 500 abgegeben.

Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verboten ist.

a) Laubhölzer.

		Alter in Jahren	Preis pro		
			100 M.	1000 M.	10000 M.
Acer	<i>campestre</i> , Feld-Ahorn	1	1.—	90	—
"	<i>Monspessulanum</i>	3	12.—	—	—
"	<i>Negundo</i> , Eschenblättriger Ah.	1	—,80	7	—
"	"	2	1,20	10	80
"	"	3	2.—	15	—
"	Prachtpflanzen	4	3.—	24	—
Acer	<i>Negundo californicum</i> ; wunderbar schnellwüchsiger Allee- baum, auch als Waldbaum zu empfehlen.				
"	"	1	2.—	18	—
"	Prachtpflanzen	1	4.—	36	—
"	"	2	6.—	54	—
"	"	3	8.—	70	—
"	<i>violaceum</i>	2	6.—	54	—
"	"	3	8.—	70	—
"	<i>platanoides</i> , Spitz-Ah.	1	1.—	9	—
"	"	2	2.—	—	—
"	"	3	2,50	22	—
"	<i>Pseudoplatanus</i> , weisser Ah.	1	1.—	6	—
"	"	2	1,50	12	—
"	"	3	2,50	17	150
"	"	4	3,50	27	—
"	<i>erythrocarpum</i>	1	6.—	50	—
"	"	2	8.—	—	—
"	"	3	10.—	—	—
"	<i>fol. purpureis</i>	1	4.—	—	—
"	"	3	8.—	—	—
"	"	4	10.—	—	—
"	<i>rubrum</i>	1—2	10.—	—	—
"	<i>spicatum</i>	1	8.—	—	—
"	<i>tataricum</i>	1	5.—	—	—
"	"	2—3	9.—	—	—
Aesculus	<i>glabra</i>	2—3	8.—	—	—
"	<i>Hippocastanum</i> Ross-Kastanie	1	1.—	8	—
"	"	2	2.—	16	—
"	"	3	3.—	27	—
"	"	4	4.—	—	—
Alnus	<i>cordata</i> (<i>Betula</i>)	1	3.—	25	200

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

		Alter in Jahren	Preis pro		
			100 M.	1000 M.	10000 M.
Alnus glutinosa, Roth-Erle		1	1,—	8	70
50	50	2	2,—	18	150
50	50	3	3,—	25	—
50	50	4	4 1/2	—	—
50	50	1	1,—	8	70
50	50	2	2 1/2	—	—
Amorpha fruticosa		1	1,—	8	—
50	50	2	2,—	—	—
Ampelopsis quinquefolia		1	4,—	35	—
Amygdalus amara		1	8,—	—	—
50	50	2	10,—	—	—
Berberis Aquifolium, Mahonie		1	2 1/2	20	150
50	50	2	3 1/2	30	250
50	50	1	1,—	8	—
50	50	2	2,—	—	—
50	50	3	3,—	—	—
50	50	4	6,—	—	—
50	50	1	1,50	13	110
50	50	2	3,—	25	—
50	50	3	4,50	40	—
50	50	4	6,—	—	—
50	50	1	7,—	—	—
50	50	1	6,—	—	—
50	50	1	10,—	—	—
50	50	1	7,—	—	—
Betula alba, Gemeine Birke		1	1,—	8	70
50	50	2	1,50	13	—
50	50	3	2 1/2	20	—
50	50	1	3,—	—	—
50	50	1	4,—	35	—
50	50	2-3	6,—	—	—
50	50	1	4,—	35	—
50	50	2-3	7,—	—	—
50	50	1	3,—	25	—
Broussonetia papyrifera		1	4,—	—	—
Buxus myrtifolia		1	15,—	130	—
50	50	1	10,—	90	—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch		1	10,—	—	—
50	50	1	10,—	—	—
Caragana arborescens, Erbsebaum		1	2,—	18	150
50	50	2	3,—	—	—
50	50	3	4 1/3	—	—
Carpinus Betulus, Weissbuche (Hainbuche); siehe Heckeupflanzen.		1	8,—	—	—
Carya alba, Hickory		2	12,—	—	—
50	50	1	8,—	—	—
50	50	2-3	10,—	—	—
50	50	1	8,—	70	—
50	50	2	12,—	—	—
50	50	2-3	10,—	—	—
50	50	1	8,—	70	—
50	50	2-3	12,—	—	—
Catalpa Bungei		1	8,—	70	—
50	50	2-3	12,—	—	—
50	50	1	6,—	50	—
speciosa. Neue Catalpa von hervorragender Schönheit in Bezug auf Grösse der Blüten und pyramiden Wuchs des Baumes. Sie soll bei uns härter sein als die andern Arten, ausserordentlich reich blühen und schön riechen. Das Holz wird sehr hoch geschätzt.		1	10,—	90	—
50	50	2	15,—	—	—
50	50	2	3,50	—	—
50	50	3	5,—	—	—
Ceanothus americanus, Säckelblume		1	2,—	16	—
50	50	2	3,50	—	—
50	50	3	4,50	—	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

			Alter in Jahren	Preis pro		
				100 M.	1000 M.	10000 M.
Celastrus	scandens, <i>Baummörder</i>		1	6,—	50	—
"	"	verpfl.	2	8,—	—	—
"	"	"	3	10,—	—	—
Celtis	occidentalis, Zürgelbaum		1	5,—	45	—
Cephalantus	occidentalis, Kopfbume		1	3,—	25	—
Cercis	Siliquastrum <i>Judaslinde</i>		2	5,—	—	—
"	"	"	3	7,—	—	—
"	canadensis	"	3	10,—	—	—
Clematis	Waldrebe		—	—	—	—
"	fusca		1	6,—	50	—
"	"	"	2	8,—	—	—
"	Hendersoni		1	3,—	—	—
"	integrifolia, Ungetheiltblättr. <i>Waldrebe</i>		1	2,—	15	—
"	"	"	2	3,—	—	—
"	virginiana		1	5,—	40	—
"	"	"	2	7,—	—	—
Colutea	arborescens, <i>Blasenstrauch</i>		1	1,—	8	70
"	"	verpfl.	2	2 1/4	20	—
"	"	"	3	3 1/2	—	—
"	istria		1	3,—	—	—
"	orientalis		1	2,—	18	—
"	"	"	2—3	4,—	—	—
Cornus	alba Weisser <i>Hartriegel</i>		1	1,50	10	—
"	Amomum		1	4,—	30	—
"	"	verpfl.	2	5,—	—	—
"	mascula, <i>Kornelkirsche</i>	verpfl.	2	4,50	40	—
"	"	"	3	6,—	50	—
"	sanguinea		1	2 1/4	20	—
"	"	verpfl.	2	4,—	—	—
"	sibirica Sibirischer Hartriegel, <i>ächt</i>	Ableger	1	15,—	130	—
"	"	"	2	10,—	—	—
Coronilla	Emerus		1	5,—	—	—
Corylus	Avellana, Haselnuss		1	3,—	—	—
"	"	verpfl.	2	4,—	—	—
"	"	"	3	5,—	—	—
"	atropurpurea	Senker	1	12,—	100	—
"	"	verpfl.	2	20,—	180	—
Cotoneaster	lucida		1	6,—	—	—
"	nigra		2	5,—	—	—
"	Pyracantha Lalandi		1	7,—	—	—
"	Simondsii		1	6,—	—	—
Crataegus	Azarolus	verpfl.	3—4	15,—	—	—
"	coccinea, Scharlach-Dorn, für den Norden zu Hecken		1	4,—	35	—
"	"	"	2	5,—	—	—
"	"	"	3—4	7,—	—	—
"	Crus galli, Hahnsporndorn		1	4,—	35	—
"	"	"	2	5,—	45	—
"	"	"	3	6,—	—	—
"	ovalifolia	verpfl.	3	8,—	70	—
"	"	"	4	10,—	—	—
"	Fontanesiana		2	8,—	—	—
"	glandulosa		1	4,—	30	—
"	nigra		2—3	6,—	—	—
"	Oxyacantha, <i>Weissdorn</i> . Siehe Heckenpflanzen.					
"	prunifolia		1	4,—	—	—
"	sanguinea, Blutdorn, bes. f. d. nördl. Russland zu Hecken geeignet		2	6,—	50	—
"	"	"	3	8,—	—	—
Cydonia	japonica, Japanische <i>Quitte</i>		1	5,—	45	—
"	"	"	2	7,50	67	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

			Alter in Jahren	Preis pro		
				100 M.	1000 M.	10000 M.
Cydonia	japonica		3	10,—	90	—
"	vulgaris, Gemeine Apfel-Q.	Steckl.	1	4,—	35	—
Cytisus	hirsutus, Behaarter <i>Gaisklee</i>		1	2,50	—	—
"	"		2	4,—	—	—
"	elongatus		1	3,—	25	—
Deutzia	crenata	Steckl.	1	4,—	35	—
"	" fl. pl.	"	1	4,—	35	—
"	Fortunei	"	1	4,—	35	—
"	crenata „Pride of Rochester“	"	1	12,—	—	—
"	" purpurata	"	2	8,—	70	—
"	gracilis	"	1	6,—	50	—
Diervilla	canadensis	stark	1	10 1/2	90	—
Eleagnus	angustifolia		1	5,—	45	—
"	orientalis		1	8,—	—	—
Evonymus	europaea, <i>Spindelbaum</i> (Pfaffenbüchchen)		1	1,—	8	—
"	"	verpfl.	2	2,—	15	—
"	"		3	3,—	20	—
"	radicans viridis	Steckl.	2	12,—	—	—
"	" fol. arg. var.	"	1	10,—	90	—
Fagus	sylvatica, <i>Rothbuche</i>		2	2,—	18	—
"	"		3	3,—	27	200
"	"	verpfl.	4	4 1/2	40	—
Fontanesia	californica		1	10,—	—	—
"	filariaefolia		1	8,—	—	—
"	phillyreoides	Steckl.	1	8,—	70	—
"	"		2	12,—	—	—
Forsythia	suspensa	Steckl.	1	8,—	—	—
"	viridissima		1	8,—	—	—
Fraxinus	alba	0,25—0,35 m. h.	1	4,—	—	—
"	"	0,50—0,75 m. h.	2	5,—	40	—
"	"	0,80—1,10 m. h.	3	6,—	50	—
"	"	1,20—1,60 m. h.	4	7,—	60	—
"	americana weisse <i>Esche</i>		1	4,—	36	—
"	"		2—3	6,—	—	—
"	excelsior, Gemeine E.	0,10—0,20 m. h.	1	1,—	5	45
"	"	0,25—0,35 m. h. verpfl.	2	1,50	12	—
"	"	"	3	2 1/2	20	190
"	"	"	4	3 1/2	—	—
"	oregona		1	6,—	—	—
"	"	verpfl.	2—3	9,—	—	—
"	sambucifolia (nigra)		2	7,—	—	—
"	viridis, Grüne Esche.		2	4,—	—	—
Gleditschia	horrida		1	4,—	—	—
"	ferox	verpfl.	2	7,—	—	—
"	inermis		2	5,—	—	—
"	"		3	7,—	—	—
"	sinensis		1	4,—	—	—
"	triacanthos, Dreistachelige <i>Gleditschie</i>	0,40—0,70 m. h.	2	2,—	15	—
"	"	0,80—1,— m. h. verpfl.	3	3,—	20	190
"	"	1,10—1,50 " "	4	4,—	30	—
Hamamelis	virginica		1	20,—	—	—
Hibiscus	syriacus, <i>Eibisch</i> , syrischer		1	4,—	30	—
Hypericum	elatum		2—3	5,—	—	—
"	patulum		1	5,—	—	—
Juglans	nigra, Schwarze W.		1	4,—	30	—
"	"	verpfl.	2—3	7,—	—	—
"	"		2	6,—	—	—
"	"		3	8,—	—	—
"	regia		1	8,—	—	—
Kerria	japonica (Corechorus) fl. pl.	Steckl.	2	10,—	80	—
Koelreuteria	paniculata		1	3,—	27	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

		Alter in Jahren	Preis pro		
			100 M.	1000 M.	10000 M.
Koelreuteria	paniculata	verpfl.	2	4,50	—
Laburum	vulgare, Gemeiner <i>Goldregen</i>	1	1,—	8	70
		2	2,—	18	—
Ligustrum	amurense, <i>Liguster</i> vom Amur	Steckl.	1	8,—	70
	atrovirens	1	8,—	—	—
	vulgare, Gemeiner L.	Steckl.	1	2,50	22
		verpfl.	2	4,—	35
	fol. var., buntblättrig	Steckl.	1	6,—	50
	italicum	1	6,—	—	—
	ovalifolium	1	8,—	70	—
		verpfl.	2	12,—	—
	vulgare pyramidale (compactum)	1	6,—	—	—
Liriodendron	Tulipifera, <i>Tulpenbaum</i>	1	6,—	54	—
		2	10,—	—	—
Lonicera	brachypoda fol. aur. reticulatis	2	15,—	—	—
	hispida, Rauhe <i>Heckenkirsche</i>	1	3,—	25	—
	Ledebouri	1	6,—	50	—
	tatarica	1	5,—	40	—
	alba grandiflora	1	6,—	—	—
		2	10,—	—	—
	fl. rubro	2	10,—	—	—
	gracilis	2	10,—	—	—
	Xylosteum	1	6,—	—	—
Lycium	europaeum macrocarpum	1	6,—	—	—
	ruthenicum	1	6,—	—	—
Maclura	aurantiaca, <i>Osagenorange</i>	1	8,—	—	—
Morus	alba, Weiße <i>Maulbeere</i>	1	2,—	18	—
	nigra, Schwarze M	1	2,—	18	—
		3—4	4,—	—	—
	rubra, Rother M.	2	3,50	—	—
Myricaria	germanica	1	6,—	—	—
		2	8,—	—	—
	dahurica	1	8,—	—	—
		2	10,—	—	—
Phellodendron	amurense	Steckl.	1	25,—	225
Philadelphus	Columbianus	1	6,—	50	—
	cordatus, Herzblättriger <i>Jasmin</i>	Steckl.	1	3,—	—
	coronarius	1	5,—	40	—
	fl. pl. gefällt	Steckl.	1	7,—	—
	fol. anreis	1	12,—	100	—
	nanus	2	8,—	70	—
	salicifol.	2	10,—	—	—
	Zeiheri	1	5,—	40	—
	dianthiflorus pl.	Steckl.	2	10,—	90
	floribundus (pubescens), Reichblühender J.	1	3,—	25	—
		2	4,50	—	—
	Godolokeri (Dentzia)	1	8,—	—	—
	Gordonianus	Steckl.	1	3,—	25
	grandiflorus	1	5,—	—	—
	speciosissimus	verpfl.	2	8,—	—
	latifolius	Steckl.	1	3,—	25
	laxus	1	6,—	—	—
	nivalis spectabilis pl.	1	5,—	—	—
	pendulifolius	2	8,—	—	—
	primulaeflorus pl.	Steckl.	2	10,—	—
	pubescens Souvenir de Billard	1	8,—	—	—
	Yokohamae	1	8,—	—	—
Pirus	baccata Beeren- <i>Apfel</i>	1	3,—	—	—
		2	4,—	35	—
		3	5,—	45	—
	cerasifera	1	3,—	—	—
		2	5,—	—	—
	oblonga	1	3,—	—	—

— 99 —

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

	Alter in Jahren	Preis pro		
		100 M.	1000 M.	100 00 M.
Pirus <i>baccata oblonga</i>	2	5,—	—	—
<i>floribunda</i>	1	4,—	—	—
<i>Kaïdo</i>	1	3,—	—	—
"	2	4,—	35	—
"	3	5,—	—	—
"	3	5,—	—	—
Platanus <i>orientalis</i> , <i>Platane</i>	1	5,—	45	—
"	2	8,—	—	—
"	2	7,—	—	—
Populus <i>alba nivea</i> , Silber- <i>Pappel</i> , ächt	2	6,—	—	—
<i>balsamifera macrophylla</i>	2	5,—	45	—
<i>canadensis</i>	1	1,—	90	—
" <i>aurea</i>	2	8,—	—	—
<i>candicans</i>	2	5,—	—	—
<i>fastigiata</i> , Pyramiden-P.	2	5,—	—	—
<i>hybrida</i> <i>Berolinensis</i> , Berliner Lorbeer-P.	2	5,—	—	—
<i>laurifolia</i> , Lorbeer-P.	1—2	4,—	—	—
<i>Simonii</i>	1	8,—	—	—
"	2	2,—	—	—
Potentilla <i>floribunda</i>	1	13,—	25	—
<i>fruticosa</i>	1	3,—	—	—
"	2—3	6,—	—	—
Prunus <i>cerasifera</i> (<i>Myrobalana</i>) Kirschpflaume, siehe Obstwildlinge.	1	10,—	—	—
<i>japonica</i> (<i>sincensis</i>) <i>alba</i> pl.	2	15,—	—	—
"	1	10,—	—	—
" <i>rosea</i> pl.	1	10,—	—	—
<i>Mahaleb</i> , Weichsel, siehe Obstwildlinge.	1	2 1/2	20	—
<i>Padus Traubenkirsche</i>	2	4,—	—	—
"	4	7,—	—	—
"	3	5,—	—	—
"	1	3,—	—	—
<i>serotina</i> , mit lorbeerartigen Blättern, sehr schön!	2	4,50	40	—
"	3	6,—	—	—
<i>virginiana</i>	1	2 1/2	—	—
"	2	4,—	30	—
"	3	5,—	40	—
"	4	6,—	50	—
Ptelea <i>trifoliata</i> , <i>Lederbaum</i>	1	1 1/2	18	—
"	2	2 1/2	20	—
"	3	3,50	30	—
Pterocarya <i>laevigata</i>	2	20,—	—	—
Quercus <i>coccinea</i> Scharlach-E.	1	4,—	—	—
"	2	7,—	—	—
<i>ilicifolia</i>	2	9,—	—	—
<i>palustris</i> , Sumpf-E.	1	3,—	—	—
"	2	5,—	45	—
<i>rubra</i>	1	3,—	—	—
" <i>Rothe E.</i>	2	5,50	—	—
"	3	8,—	70	—
"	4	12,—	110	—
<i>pedunculata</i> (<i>Robur</i>), Gemeine Stiel-eiche (<i>Sommer-E.</i>)	2	2,—	18	—
"	3	3,50	30	—
Robur , <i>fastigiata</i> (<i>pyramidalis</i>), Pyramiden-E.	1	18,—	—	—
" <i>var. virgiliana</i>	2	10,—	90	—
"	3	15,—	—	—
<i>tinctoria</i>	1	12,—	—	—
"	2	16,—	—	—
"	3	20,—	—	—
Rhamus <i>cathartica</i> , <i>Kreuzdorn</i>	1	1,50	12	—
"	2	2,—	—	—
"	3	3 1/2	—	—
<i>Frangula</i> , <i>Faulbaum</i>	2	1,50	—	—
"	3	2,—	18	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

	Alter in Jahren	Preise pro		
		100 M.	1000 M.	10000 M.
Rhamus Fragula	4	3,—	20	—
Rhus Cotinus	1	8,—	—	—
glabra	1	6,—	—	—
typhina	1	5,—	40	—
"	2	6,—	—	—
"	3	9,—	—	—
toxicodendron	2	6,—	—	—
venenata	1	10,—	—	—
Ribes albidum. Weissblühende <i>Johannisbeere</i>	1	4,—	—	—
alpinum Bester Schattenstrauch	4	8,—	75	650
"	2	5,—	45	—
"	3	6,—	50	450
aureum	1	4 1/2	35	300
" acerifolium	1	5,—	40	300
"	2	8,—	70	600
Diacantha	1	6,—	—	—
floridum (americanum)	1	5,—	—	—
"	2	6,—	50	—
Gordonianum	1	6,—	50	—
"	2	9,—	80	—
nigrum fol. aur. var.	1	6,—	—	—
"	2	8,—	—	—
" heterophyllum, geschlitzblättrig	1	6,—	—	—
"	2	10,—	—	—
sanguineum	2	10,—	90	—
" carneum grandiflorum	1	6,—	—	—
"	2	10,—	—	—
setosum	1	6,—	—	—
Robinia Pseudacacia, <i>Akazie</i> , siehe Heckenpflanzen.				
Rosa canina, Hunds- <i>Rose</i>	1	1.25	10	90
"	2	2.50	20	185
cinnamomea, Zimmetrose	2	7,—	—	—
fraxinifolia	2	6,—	50	450
"	3	9,—	80	—
rubrifolia	2	6,—	50	—
"	3	9,—	80	—
villosa, Grossfrüchtige Hagebutte	1	6,—	—	—
Salix alba argentea (regalis), Silber- <i>Weide</i>	1	4,—	—	—
"	2	6,—	—	—
Amaniana	1	5,—	—	—
amygdalina discolor	1	3,—	—	—
austriaca	2	4,—	—	—
Bataviae	1	3 1/2	—	—
caspica (pruinosa) Kaspische Weide	1	2,—	—	—
"	2	3,—	—	—
"	3	4,—	35	—
"	4	6,—	—	—
dasycladus	1	3,—	—	—
decipiens	1	3,—	—	—
Doniana	1	4,—	—	—
elegantissima, Japanische Trauerw.	1	3,—	27	—
"	2	4,—	35	—
Helix pyramidalis, Pyramiden-Bach-W.	1	3,—	25	—
heterophylla	1	4,—	—	—
holosericea angustifolia	1	4,—	—	—
Hoppeana	1	3,—	—	—
japonica	1	4,—	—	—
"	2	6,—	—	—
laspidea	1	3,—	25	—
"	2	4,—	—	—
incana (=Elaeagnus)	1	4,—	—	—
"	2	5,—	—	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

		Alter in Jahren	Preis pro		
			100 M.	1000 M.	10000 M.
Salix	Lambertiana		1	4,—	—
	laurina		1	4,—	—
	Laweana		1	4,—	—
	menthaefolia		1	5,—	—
	Meyeriana		1	5,—	—
	mirabilis		1	4,—	—
	mollissima		1	3,—	—
	parvifolia		1	4,—	—
	Perzoldii		1	4,—	—
	pommeranica, sehr starkwüchsig	2	5,—	—	—
	Pontederana	1	6,—	—	—
	praecox	1	4,—	—	—
	purpurea	1	3,—	—	—
	pendula	1	3,—	—	—
	uralensis	2	4,—	—	—
	rigida	1	3,—	—	—
	rubra	2	4,—	—	—
	Russelliana	1	5,—	—	—
	Sacramento	1	3,—	—	—
	salviaefolia	1	3,—	—	—
	Seringeana	1	4,—	—	—
	stipularis	1	3,—	—	—
	viminalis	1	3,—	—	—
	caprea	1	3,—	—	—
	regalis	1	3,—	—	—
	vitellina, Dotter-W.	1	4,—	—	—
	acuminata	2	2,—	18	—
	lanceifolia	1	4,—	—	—
	Britzensis , Rothe Dotter-W. (s. Neuheiten)	1	3,—	18	—
	flava	2	7,—	60	—
	glauc	1	12,—	—	—
	nova	1	3,—	—	—
	purpurea	2	3,—	—	—
	purpurea	1	4,—	70	—
	purpurea	2	5,—	45	—
	purpurea	2	8,—	70	—
Sambucus	canadensis, Kanadischer Hollunder	1	3,—	—	—
	elegans	2	3,—	—	—
	nigra	1	4,—	—	—
	fol. argenteo-marg., weissrandiger H.	2	12,—	—	—
	fol. luteis	1	3,—	—	—
	fl. pl.	2	6,—	—	—
	heterophylla	1	8,—	50	—
	laciniata	2	8,—	70	—
	pulverulenta	1	8,—	50	—
	racemosa	2	6,—	—	—
	plumosa	2	8,—	70	—
	racemosa	1	8,—	—	—
	racemosa	2	2,—	18	170
	racemosa	1	10,—	—	—
Sophora	japonica	1	6,—	—	—
Sorbus	Aria	1	6,—	—	—
	aucuparia, Gemeine Eberesche	1	1,80	—	—
	aucuparia	2	3,—	27	—
	aucuparia	3	4,—	—	—
	aucuparia	4	6,—	—	—
	Fifeana	1	6,—	—	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

		Alter in Jahren	Preis pro		
			100 M.	1000 M.	10000 M.
Sorbus	<i>domestica</i> Spierling	1	8,—	—	—
"	<i>hybrida</i> (<i>intermedia</i> od. <i>fennica</i>), Schwedische Axelbeere	1	6,—	—	—
Spiraea	<i>alba</i> , Weisser <i>Spierstrauch</i>	2	3,—	27	—
"	"	3	5,—	—	—
"	<i>aubifolia</i>	2	6,—	50	—
"	<i>bella coccinea</i>	1	7,—	—	—
"	<i>callosa</i> (Fortunei)	1	—,80	5	—
"	" <i>atrosanguinea</i>	1	10,—	—	—
"	" <i>Foxii</i>	1	7,—	—	—
"	"	2	10,—	—	—
"	" <i>macrophylla</i>	1	7,—	—	—
"	" <i>superba</i>	1	6,—	—	—
"	"	2	8,—	—	—
"	<i>canescens</i> (<i>nepalensis</i>)	1	5,—	—	—
"	"	2	7,—	—	—
"	<i>cantonensis</i>	1	5,—	—	—
"	<i>Douglasii</i>	1	6,—	—	—
"	<i>eximia</i>	1	6,—	—	—
"	<i>expansa</i>	1	5,—	—	—
"	" <i>nivea</i>	1	6,50	—	—
"	<i>hypericifolia</i>	1	5,—	40	—
"	"	2	8,—	—	—
"	"	1	6,—	—	—
"	<i>lanceolata</i>	1	1,50	13	—
"	<i>opulifolia</i>	2-3	4,—	—	—
"	" <i>lutea</i>	1	6,—	50	—
"	<i>prunifolia</i>	1	6,—	—	—
"	<i>sorbifolia</i>	1	2,—	18	—
"	"	2-3	4,—	—	—
"	<i>Thunbergii</i>	1	7,—	65	—
"	"	2	10,—	—	—
"	<i>vaccinifolia</i>	1	6,—	—	—
Staphylea	<i>colchica</i> , Kolchische <i>Pimpernuss</i> (<i>Hoibrenkia formosa</i>).				
	Sehr gut zum Frühtreiben in Töpfen geeigneter schönblühender				
	Strauch	1	15,—	130	1200
"	<i>colchica</i> stark, 0,60-1,— m. h., Steckl.	2	25,—	200	1900
"	<i>pinnata</i>	1	5,—	40	—
"	"	2	8,—	70	—
"	"	3	10,—	90	—
Symphoricarpus	<i>orbiculatus</i> (<i>vulgaris</i>)	1	4,—	—	—
"	"	2	6,—	50	—
"	" <i>fol. aureo</i> var.	1	6,—	—	—
"	"	2	9,—	—	—
"	<i>racemosus</i> , <i>Schneebeere</i>	1	4,—	35	—
"	"	2	6,—	—	—
Syringa	<i>Josikaea</i>	2	10,—	—	—
"	<i>persica</i> , Persischer <i>Flieder-</i>	2	10,—	—	—
"	" <i>alba</i>	2	10,—	—	—
"	<i>Rothomagensis</i>	1	8,—	—	—
"	"	2	10,—	90	850
"	" <i>alba</i>	2	10,—	—	—
"	" <i>rubra</i> (<i>Saugeana</i>)	1	8,—	75	—
"	<i>vulgaris</i> , Gemeiner Flieder	1	2,—	18	150
Tamarix	<i>africana</i> , Afrikanische <i>Tamariske</i>	1	3,50	—	—
"	<i>gallica</i>	1	3,—	25	—
"	"	2	6,—	—	—
"	<i>tetrandra</i> (<i>parviflora</i>)	1	2,—	15	—
"	"	2	4,—	30	—
Tecoma	<i>radicans</i>	1	10,—	—	—
Tilia	<i>americana</i>	1	12,—	—	—
"	"	2	15,—	130	—

b) Nadelhölzer.

Späth's Baumsehule bei Rixdorf-Berlin.

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen. Spargelpflanzen.

	Alter in Jahren	Preise pro		
		100 M	1000 M	10000 M
Abis , Nordmanniana	verpfl.	4	15,—	130 —
.. orientalis	1	3,—	25 —	—
.. nana	Steckl.	1	20,—	—
.. pectinata, Weisstanne	verpfl.	2	2,—	18 —
.. rubra	1	5,—	40 —	—
.. Schrenkiana	verpfl.	3	15,—	—
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsonii (Chamaec. Boursierii)	1	3,—	25	200
.. erecta	2	8,—	—	—
.. pisifera	1	15,—	140 —	—
.. pisifera filifera	Steckl.	1	15,—	—
Juniperus communis <i>Wachholder</i>	1	3,—	—	—
.. Sabina	2	5,—	—	—
.. virginiana	1	15,—	130 —	—
..	2	20,—	—	—
..	1	3,—	—	—
Larix europaea Lärche	verpfl.	2	5,—	—
..	1	1,—	9 —	—
Pinus contorta	1	5,—	40 —	—
.. excelsa, Hohe <i>Kiefer</i>	verpfl.	1	5,—	45 —
..	2	10,—	90 —	—
.. insignis	1	6,—	—	—
.. Laricio	1	2,—	18 —	—
.. austriaca	1	3,—	25 —	—
.. montana	verpfl.	2	4,—	35 —
..	3	10,—	90 —	—
.. Pinaster	1	3,—	25 —	—
..	2	5,—	—	—
.. rigida	verpfl.	1	2,50	20 —
.. Strobis, Weymouth-K.	verpfl.	2	2,50	20 —
..	3	4,—	35 —	—
.. sylvestris, <i>Gemeine Kiefer (Föhre)</i>	1	—,60	2	18
..	2	1,—	8 —	—
..	verpfl.	3	2,—	15 —
.. Taeda	1	3 1/2	—	—
Taxodium distichum	1	8,—	—	—
Taxus baccata, <i>Eibe</i>	1	5,—	40 —	—
..	verpfl.	2	6,—	50 450
..	3	8,—	70	650
.. elegantissima	verpfl.	2	20,—	—
.. erecta	1	5,—	—	—
..	verpfl.	3	12,—	—
.. canadensis	2	8,—	—	—
.. Dovastoni	4	25,—	—	—
.. Menziesii (Lobbii)	1	4,—	30 —	—
Thuja occidentalis, Abendländischer <i>Lebensbaum</i>	1	1,—	6	50
..	2	2,—	12	100
..	verpfl.	3	3,—	200

Spargelpflanzen.

		100 M	1000 M	10000 M
Riesen-Spargel (Vorrath ca. 300,000 St.)	I. Qual.	1,50	14	—
.. .. .	II.	1,25	11	110
.. .. .	III.	1,—	8	60
Connover's Colossal (Vorrath über 150,000) sehr starke Stiele	I.	2,50	22	—
.. .. .	II.	1,75	16	140
.. .. .	III.	1,25	11	100
Früher von Argenteuil (Vorrath über 100,000)	I.	3,—	25	—
.. .. .	II.	2,—	18	—
.. .. .	III.	1,50	12	110

Diverse Pflanzen und Zwiebeln. Pflanzen zum Treiben.

Diverse Pflanzen und Zwiebeln.		1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Asarum europaeum <i>Haselwurz</i>		—,10	0,75	—
Aselepias <i>syriaca</i> , hübsche grossbl. Staude mit graulila Blüten		—,30	2 1/2	—
Bocconia <i>cordata</i> , sehr hübsche grossblättrige Einzelpflanze auf Rasen, mit grossen weissen Blütenrispen. Eine völlig harte Staude		—,30	2 1/2	—
Chionodoxa <i>Luciliae</i> , mit niedlichen blauen Blumen, neu		—,70	1 1/2	15
Hibiscus <i>palustris</i> , mit grossen, malvenartigen Blumen		—,75	6	—
Hyacinthus <i>candicans</i> . Die im August erscheinenden Blumenstiele erreichen eine Höhe von mehr als 1 Meter und sind mit 30–50 schneeweissen Glocken garnirt. Die Zwiebel braucht erst im Frühjahr gelegt zu werden (in guten Gartenboden)	I. Qualität 1000 St. 125 M.	—,20	1 1/4	15
	II. " 1000 St. 80 M.	—,15	1 1/4	10
	(noch blühbare Zwiebeln) III. " 1000 St. 40 M.	—,10	3/4	5
Iris <i>caucasica major</i> , gr. gelb		—,50	—	—
" <i>foetida</i> fol. var. mit weissgestreiften Blättern		—,30	2 1/2	22
" <i>iberica</i>		—,30	—	—
" <i>pumila</i>		—,50	—	—
" <i>reticulata</i> , die beste zierlichste Freiland-Species		—,75	—	—
Ixiolirion <i>tataricum</i>		—,75	—	—
Paeonia <i>herbacea</i> , Krantartige Päonie in schönem Rummel		—,35	3	25
	1 Sortiment in 10 Sorten à 1 Stück 4 M.			
	" 10 " 2 " 7 M.			
" <i>tenuifolia</i> pl., Gefüllte feinblättrige dunkelroth blühende Päonie; eine Staude, die einzeln auf Rasenplätzen in der Nähe des Weges, oder am Rande niedriger Strauchpartien jedem Besucher des Gartens sogleich angenehm in die Augen fällt		—,75	6 1/2	60
Phlox <i>decussata</i> „ <i>Boule de feu</i> “, eine herrlich roth blühende Staude		—,30	2 1/2	20
" <i>alba</i> , rein weiss, niedrig		—,50	4	—
" schöner Rummel		—,25	2	—
Poligonum <i>Sieboldii</i>		—,20	1 1/2	—
Rhabarber (<i>Rheum barbatum</i> , <i>R. giganteum</i> , <i>R. Victoria</i>); die zubereiteten Blattstiele geben ein vorzügliches dem Apfelmuss ähnliches Compot. Starke Pflanzen		—,25	2	15
Spiraea <i>palmata elegans</i> , neu		—,75	6 1/2	—
" <i>Ulmaria</i> fl. pl., gefüllt weiss		—,40	2 1/2	20
" <i>venusta rosea</i> , die schönste der Stauden-Spiraeen mit grossen, rosenrothen Blütenstände; <i>neu!</i>		—,75	6	—

Pflanzen zum Treiben.

Maiblumenkeime,

stärkste blühbare, versende ich von Mitte October bis Ende November jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Sand-Boden kultivirten Keime ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse

	I. Qual netto	100 M.	1000 M.
Deutzia <i>gracilis</i>	I. Qual	4	36
" <i>crenata</i> fl. pl.	II. " "	20	—
	I. " "	10	—
	II. " "	30	250
Lonicera <i>fuchsoides</i>	I. " "	18	150
Prunus <i>japonica</i> (<i>sinensis</i>) <i>alba</i> pl., veredelt	I. " "	50	—
" wurzeläccht	I. " "	35	—
" <i>tritoba</i>	I. " "	25	—
Spiraea <i>callosa alba</i>	II. " "	15	—
" <i>japonica</i> (<i>Hottelii</i>)	I. " "	40	—
	II. " "	15	—
Staphylea <i>colchica</i> , starke Sträucher	I. " "	9	—
" 2–3jähr. verpflanzte	I. " "	18	—
" 1 " "	II. " "	12	—
	I. " "	75	—
	II. " "	25	200
	I. " "	15	130

Diverse Artikel.

		100 M.	1000 M.
Syringa persica	I. Qual.	40	—
" <i>Rothomagensis</i> (sineusis)	I "	40	—
" " <i>alba</i>	I "	40	—
" " <i>rubra</i> (Saugeana)	I "	40	—
" obige 4 Sorten	II "	30	—
" <i>vulgaris</i> Charles X.	2—3 jährige Veredlungen	45	—
" " " "	"	30	—

Pflanzen zum Treiben in Töpfen.		10 St.	100 St.
		M.	M.
Deutzia gracilis		4 1/2	40
Prunus japonica (sineusis) <i>alba</i> pl.		6	50
" <i>triloba</i>		6	50
"	Hochstämme mit mehrj. Kronen ca 1 1/2 m. Höhe	15	—
Ribes sanguineum		6	—
Staphylea colchica		6	50
Syringa Rothomagensis rubra (Saugeana)		7 1/2	60

Diverse Artikel.

Späth'sche Pfropfpfannen, äusserst practisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses . . . p. Stück 6 M.

Verzinkten Eisendraht für Schnurbäumchen u. Spaliere p. K. 1 M., 10 K. 8 M. (1 Kilo hiervon giebt ca. 50 Meter.)

Drahtspanner . . . p. St. 50 Pf. u. 20 Pf., p. 10 St. 4,50 M. u. 1,75 M.

Schlüssel zu den Drahtspannern . . . p. St. 40 Pf.

Englische Gartenmesser aus der Saynor'schen Fabrik, deren Inhaber sich speciell mit der Anfertigung von Garten-Werkzeugen beschäftigen und anerkanntermassen das Vorzüglichste auf diesem Gebiete leisten.

a) Hippen, Klingen vom feinsten Stahl, meist Hirschhorn-Griff, in 12 verschiedenen Grössen und Formen . . . p. St. 2,30—3,80 M.

b) Oculir- u. Copulir-Messer, ebenfalls bester Stahl, meist Elfenbein-Griff, in 8 verschiedenen Grössen u. Formen p. St. 2,30—4,00 M.

Verzinkten Etikettendraht . . . p. Kilo 3 M.

Holz-Etiketten zum Anbinden, frisch gestrichen und mit Draht versehen . . . p. 100 St. 1,25 M., p. 1000 St. 10 M.

Radig'sche wetterbeständige Etiketten, oval mit blauem Blechrande, sehr elegant, oval 75 mm. lang, 55 mm. breit . . . p. 100 St. 8 M.

" **Etikettentinte** pro Fläschchen, zu mehr als 1000 Stück reichend . . . à 0,75 M.


" **Etikettenlack** . . . à Fläschchen 0,75 M.

Zink-Etiketten, chemisch präparirt, 80 mm. lang, 24 mm. breit, mit Draht versehen . . . p. 100 St. 3 M., p. 1000 St. 27,50 M.

Etikettentinte, unauslöschliche, für Zink-Etiketten . . . à Fläschchen 0,75 M.

Baumwachs, warmflüssiges, in hiesiger Baumschule benutzte Composition . . . p. Kilo 2 M.

Raffiabast, Japanischer . . . p. Kilo 3 M.



Späth'sche Pfropfpfanne.

Das Verzeichniss über

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus, Lilien etc.

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumen-zwiebeln findet von **Mitte August bis Ende October statt.**

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten, meine Blumenzweibelfelder (welche ca. 1 1/2 Hektar umfassen) in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt.

Baumschule bei Rixdorf-Berlin, im September 1884.






L. Späth.

Späth's Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite.		Seite.
Neuheiten des Etablissements	2	Johannisbeeren	37
Neue und sehr wenig verbreitete Ziergehölze	4	Himbeeren	38
Edelreiser	5	Brombeeren	38
Veredelte Obstbäume	5	Erdbeeren	39
Aepfel	5	Rosen	42
Birnen	14	Ziergehölze, Sortimente, Laubhölzer	49
Kirschen	23	„ Nadelhölzer (Coniferen)	84
Pflaumen	26	Gehölze für Parkanlagen	88
Pfirsiche	31	Alleebäume	88
Aprikosen	32	Trauerbäume	91
Mandeln	33	Schlingsträucher	92
Wallnüsse	33	Gehölze zu Hecken und Lauben	92
Haselnüsse	33	Obstwildlinge zum Veredeln	93
Mispeln	34	Gehölzsämlinge und junge Pflanzen	94
Quitten	34	Spargelpflanzen	104
Hagebutten	34	Diverse Pflanzen und Zwiebeln	105
Weinreben	34	Pflanzen zum Treiben	105
Stachelbeeren	36	Diverse Artikel	106





Für die Besucher meiner bei Rixdorf-Berlin belegenen, jetzt über 125 Hektar umfassenden Baumschule, bemerke ich, dass der Weg dahin von Berlin durch Rixdorf vom Kriegerdenkmale (Granitsäule) links die Berliner Strasse entlang führt. (Bis zur Baumschule gepflasterte Strasse). Man fährt von Berlin per Droschke bis zur Baumschule in einer halben Stunde. Ausserdem kann man um dahin zu kommen folgende Verbindungen benutzen:

Stadtring-Züge (Südring).

Bahnhof	Morgens	Abds.
<i>Friedrichstrasse</i> Abg.	5 ¹⁴ 6 ²⁴ stündl. bis 9 ²⁴	
<i>Börse</i>	5 ¹⁷ 6 ²⁷ „ „ 9 ²⁷	
<i>Alexander-Platz</i>	5 ²⁰ 6 ³⁰ „ „ 9 ³⁰	
<i>Jannowitz-Brücke</i>	5 ²⁴ 6 ³³ „ „ 9 ³³	
<i>Schlesischer Bahnhof</i>	5 ³⁷ 6 ⁴⁷ „ „ 9 ³⁷	
<i>Warschauer Brücke</i>	5 ⁴⁰ 6 ⁵⁰ „ „ 9 ⁴⁰	
<i>Stralau-Rummelsburg</i>	5 ⁴³ 6 ⁵³ „ „ 9 ⁴³	
<i>Treptow</i>	5 ⁴⁶ 6 ⁵⁶ „ „ 9 ⁴⁶	
<i>Rixdorf</i> Ank.	5 ⁵⁰ 6 ⁵⁰ „ „ 9 ⁵⁰	

Rückfahrt von Rixdorf in derselben Richtung vice versa:
Abgang 5²³ Morgens stündlich bis 9⁵⁸ Abends.

Bahnhof	Morgens	Abds.
<i>Potsd. Bahnhof</i> Abg.	5 ⁵ 6 ³⁹ stündl. bis 10 ³⁹	
<i>Schöneberg</i>	5 ¹⁰ 6 ⁴⁵ „ „ 10 ⁴⁵	
<i>Tempelhof</i>	5 ¹⁶ 6 ⁵¹ „ „ 10 ⁵¹	
<i>Rixdorf</i> Ank.	5 ²² 6 ⁵⁷ „ „ 10 ⁵⁷	

Rückf. von Rixdorf in derselben Richtung vice versa:
Abgang 5⁵² Morgens stündlich bis 9⁵² Abends.

Berlin-Görlitzer Eisenbahn. (Sommer-Fahrplan.)

														Classe
		1-IV.	II-III.	II-III.	II-III.	II-III.	II-III.	1-IV.	II-III.	II-III.	II-III.	II-III.	II-III.	Abends
<i>Berlin, Görlitz. Bahnh.</i>	Abg.	5 ¹⁰	7 ⁵	8 ⁰	10 ³⁵	12 ³⁰	1 ³⁰	2 ³⁵	3 ³⁰	4 ³⁰	6 ³⁰	8 ²⁰	11 ¹⁵	
<i>Kanne</i>	"	—	7 ¹⁹	—	10 ⁴⁹	—	1 ⁴⁴	—	—	4 ⁴⁴	—	8 ³⁴	11 ²⁹	
<i>Johannisthal-Nieder-Schönweide</i>	Ank.	5 ²⁰	7 ²⁰	8 ¹⁰	10 ⁵⁰	12 ⁴⁰	1 ⁴⁵	2 ⁴⁵	3 ³⁵	4 ⁴⁵	6 ⁴⁰	8 ³⁵	11 ³⁰	
<hr/>														
														Classe
		II-III.	1-IV.	II-III.	II-III.	II-III.	II-III.	II-III.	II-III.	II-III.	II-III.	II-III.	II-III.	Abends
<i>Johannisthal-Nieder-Schönweide</i>	Abg.	6 ²⁵	7 ³⁵	8 ²⁰	10 ⁵	12 ⁵	2 ⁴⁰	3 ⁴⁵	5 ⁵⁰	6 ⁵⁰	8 ⁵⁰	10 ³⁵		
<i>Kanne</i>	"	6 ²⁵	—	8 ²¹	—	12 ⁶	—	3 ⁴⁶	—	6 ⁵¹	—	—		
<i>Berlin, Görlitzer Bahnhof</i>	Ank.	6 ⁴⁰	7 ⁴⁵	8 ³⁵	10 ¹⁶	12 ²⁰	2 ⁵⁰	4 ⁰	6 ⁴	7 ⁵	9 ⁰	10 ⁵⁰		

An Sonn- und Feiertagen halten die Züge in Kanne nicht!

Von Kanne führt die Kanne-Rixdorfer Chaussee fast direct nach der Baumschule; man erreicht dieselbe zu Fuss von Kanne in 15, von Johannisthal-Nieder-Schönweide in 20 und von Neuer Krug (vide unten) in 20 Minuten.

Pferde-Eisenbahn.

1) Linie: Dönhoff-Platz-Hallesches Thor-Rixdorf.

von 7 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends in Zwischenräumen von je 12 Minuten.

2) Linie: Spittelmarkt-Köpnickerstrasse-Treptow.

1. Mai — 31. October: Morgens 7 Uhr, 8, 8⁴⁰, 9²⁰, 10, 10⁴⁰, 11²⁰, Mittags 12, 12⁴⁰, 1²⁰, 2—10 Uhr Abends in Zwischenräumen von je 20 Minuten. — *Sonntags Extra-Wagen.*

1. November — 30. April: von Morgens 8 Uhr bis Abends 10 Uhr in Zwischenräumen von je 40 Minuten.

Dampfer-Verbindung.

Berlin, Jannowitzbrücke-Köpnickerstr. 8a.—Neuer Krug (bei Johannisthal-Nieder-Schönweide).

	Herbst						Frühjahr						Sommer																								
	vom 22. Sept.—31. October						vom 1. April—14. Mai						vom 15. Mai—21. September.																								
<i>Berlin, Jannowitzbrücke</i> Abg.	8 ⁰	10 ⁰	12 ¹⁵	2 ⁰	4 ⁰	6 ⁰	8 ⁰	10 ⁰	12 ¹⁵	2 ⁰	4 ⁰	6 ⁰	—	8 ⁰	10 ⁰	12 ¹⁵	2 ⁰	3 ⁰	4 ⁰	5 ⁰	6 ⁰	7 ⁰	vom 1. Juni—31. August.	8 ⁰													
do. Köpnickerstr. 8a.	8 ¹⁰	10 ¹⁰	12 ²⁵	2 ¹⁰	4 ¹⁰	6 ¹⁰	8 ¹⁰	10 ¹⁰	12 ²⁵	2 ¹⁰	4 ¹⁰	6 ¹⁰	6	8 ¹⁰	10 ¹⁰	12 ²⁵	2 ¹⁰	3 ¹⁰	4 ¹⁰	5 ¹⁰	6 ¹⁰	7 ¹⁰		8 ¹⁰													
<i>Neuer Krug</i> Ank.	8 ⁴⁰	10 ⁴⁰	1 ¹⁵	2 ⁴⁰	4 ⁴⁰	6 ⁴⁰	8 ⁴⁰	10 ⁴⁰	1 ¹⁵	2 ⁴⁰	4 ⁴⁰	6 ⁴⁰	6 ³⁰	8 ⁴⁰	10 ⁴⁰	1 ¹⁵	2 ⁴⁰	3 ⁴⁰	4 ⁴⁰	5 ⁴⁰	6 ⁴⁰	7 ⁴⁰		8 ⁴⁰													
Vorm.													Nachm.			Ab.			Vorm.			Nachm.			Ab.			Vormittag			Nachmittag			Abend			
<i>Neuer Krug</i> Abg.	7 ⁴⁴	10 ⁴	12 ¹⁹	2 ²⁹	4 ²⁹	6 ²⁹	7 ⁴⁴	10 ⁴	12 ¹⁹	2 ²⁹	4 ²⁹	6 ²⁹	6 ³⁰	7 ⁴⁴	10 ⁴	12 ¹⁹	2 ²⁹	4 ²⁹	5 ²⁹	6 ²⁹	7 ²⁹	8 ²⁹	vom 1. Sept.—31. August.	9 ³⁰													
<i>Berlin, Köpnickerstr. 8a.</i> Ank.	8 ²⁴	10 ⁴⁴	12 ³⁹	3 ⁹	4 ³⁹	6 ³⁹	8 ²⁴	10 ⁴⁴	12 ³⁹	3 ⁹	4 ³⁹	6 ³⁹	7 ¹⁹	8 ²⁴	10 ⁴⁴	12 ³⁹	3 ⁹	4 ³⁹	5 ³⁹	6 ³⁹	7 ³⁹	8 ³⁹		10 ¹⁰													
do. Jannowitzbrücke	8 ³⁵	10 ⁵⁵	1 ¹⁰	3 ⁵⁰	5 ¹⁰	7 ¹⁰	8 ³⁵	10 ⁵⁵	1 ¹⁰	3 ⁵⁰	5 ¹⁰	7 ¹⁰	7 ³⁰	8 ³⁵	10 ⁵⁵	1 ¹⁰	3 ⁵⁰	5 ¹⁰	6 ¹⁰	7 ¹⁰	8 ¹⁰	9 ²⁰		10 ³⁰													

